

ПОЛНЫЙ РУССКИЙ

221-120

1898-22

иллюстрированный

58

7516

СЛОВАРЬ-ТРАВНИКЪ

И

ЦВѢТНИКЪ

XV-28

СОСТАВЛЕННЫЙ

новѣйшимъ ботаническимъ и медицинскимъ сочиненіямъ

врач. Е. Н. Залѣсовой и О. В. Петровской

Томъ II

Ж—Н

съ 129 иллюстраціями и 42 рисунками въ краскахъ



С.-Петербургъ.

Книжный складъ «Родины», Лиговская ул., соб. д., № 114.

1899.

Довозлено цензурою. С.-Петербургъ, 28 ноября 1891

Ср. 159117



Вн-93-3432
4

Графическое заведение «Родины» (А. А. Каспари)
Лиговская ул., собств. домъ, № 114.

Въ ветеринарной медицинѣ жизненное дерево употребляется снаружи въ порошокъ для присыпки на раны, или-же ввидѣ примочекъ, для чего изъ него дѣлають спиртную настойку.

Въ встеринарной гомеопатіи растение это также часто употребляется снаружи для обмываній нечистыхъ гноящихся бородавокъ собакамъ, лошадямъ и овцамъ; также его употребляютъ при тришперѣ у собакъ.

Жиловникъ, см. Окопникъ лекарственный (*Symphytum officinale* L.).

Жилокость, см. Окопникъ лекарственный (*Symphytum officinale* L.).

Жиломость, см. Жимолость обыкновенная (*Lonicera Xylosteum* L.).

Жиломуста, см. Жимолость обыкновенная (*Lonicera Xylosteum* L.).

Жиломустина, см. Жимолость обыкнов. (*Lonicera Xylosteum* L.).

Жиломустникъ, см. Жимолость обыкновенная (*Lonicera Xylosteum* L.).

Жиломустовина, см. Жимолость обыкновенная (*Lonicera Xylosteum* L.).

Жиломять, см. Волчье лыко, волчьи ягоды (*Daphne Mezereum* L.).

Жилость, см. Жимолость обыкновенная (*Lonicera Xylosteum* L.).

Жимерица, см. Чемерица бѣлая (*Veratrum album* L.).

Жимлюсникъ, см. Жимолость татарская (*Lonicera tatarica* L.).

Жимolistка, см. Жимолость обыкновенная (*Lonicera Xylosteum* L.).

Жимолодь, см. Вирючина обыкновенная (*Ligustrum vulgare* L.).

Жимолостка, см. Жимолость обыкновенная (*Lonicera Xylosteum* L.).

Жимолость, см. Жимолость обыкновенная (*Lonicera Xylosteum* L.).

Жимолость америнанская бѣлая, см. Снѣжная ягода (*Symphoricarpos racemosus* Mich.).

Жимолость благовонная, см. Жимолость душистая (*Lonicera Caprifolium* L.).

Жимолость бѣлая, см. Жимолость обыкновенная (*Lonicera Xylosteum* L.).

Жимолость волшебная, см. Жимолость обыкновенная (*Lonicera Xylosteum* L.).

Жимолость вьющаяся (*Lonicera Periclymenum* L.). Фармацевтическое названіе *Caprifolium germanicum*. Козій языкъ, Жимолость жирная, Перевертень или Повой благовонный, Папороть душистая, Каприфоль дикая. Кустарникъ съ вьющимися вѣтвями изъ семейства «жимолостныхъ» (*Caprifoliaceae* Juss.), распространенный въ западной и средней Европѣ на опушкѣ лѣсовъ и между кустарниками, высоко (до 4½ арш.) взбирающійся на деревья. Листья супротивные, округло-яйцевидные, верхніе сидячіе, но не сросшіеся между собой. Душистые красноватые или зеленовато-бѣлые цвѣты собраны верхушечными головками. Чашечка 5-тизубчатая, вѣнчикъ неправильный съ

длинной трубкой и двугубым и 5-тираздѣльнымъ отгибомъ. Тычинокъ 5, прикрѣпленныхъ къ трубкѣ вѣнчика. Завязь нижняя 2—5-тигнѣздная, столбикъ съ головчатымъ рыльцемъ. Плодъ—2-хъ и 3-хгнѣздная красная ягода. Цвѣтетъ лѣтомъ. Разводится въ садахъ. (Рис. 77).

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ жимолости прежде было довольно обширно, теперь она употребляется только въ народной медицинѣ.

Свѣжіе толченныя листья и выжатый сокъ жимолости прикладываютъ къ нечистымъ язвамъ и линаямъ. Отваромъ листьевъ полощаты ротъ и горло при краснотѣ въ горлѣ и боли при глотаніи. Легкимъ-же отваромъ жимолости обмываютъ глаза, при краснотѣ глазъ и слезотеченіи. Для отвара берутъ 2 драхмы (4 грамма) сушеныхъ листьевъ или маленькую щепотку сушеныхъ цвѣтовъ и заливаютъ стаканомъ кипятка. Свѣжія ягоды жимолости могутъ вызвать рвоту и поносъ.

Жимолость глухая, см. Бересклетъ бородавчатый (*Evonymus verrucosus* L.).

Жимолость душистая, каприфоль (*Lonicera Caprifolium* L.). Фармацевтическое названіе *Caprifolium italicum*. Жимолость благовонная, Жимолость козья, Козій дыстухъ (Малор.), Повой воинскій, Повой благовонный, Шевръ-Фейль (съ франц.). Кустарникъ изъ семейства «жимолостныхъ» (*Caprifoliaceae* Juss.), распространенный въ южной Европѣ, съ вьющимися вѣтвями. Листья округло-овальные, снизу голубоватые, верхніе—сросшіеся попарно своими основаніями. Цвѣты красноватые или желтовато-бѣлые, душистые, скученные головкою на концѣ вѣточки. Чашечка 5-тизубчатая, вѣнчикъ трубчатый, съ длинною тонкой трубкой, кверху расширенный съ почти двугубымъ 5-ти раздѣльнымъ отгибомъ. Тычинокъ 5, прикрѣпленныхъ къ трубкѣ вѣнчика; завязь—нижняя 2—3-хъ гнѣздная; столбикъ простой, съ головчатымъ рыльцемъ. Плодъ 2—3-хгнѣздная красная ягода, съ нѣсколькими сѣменами въ гнѣздахъ. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта. Разводится у насъ въ садахъ. (Табл. XVII, фиг. 97.)

Жимолость жирная, см. Жимолость вьющаяся (*Lonicera Periclymenum* L.).

Жимолость козья, см. Жимолость душистая, каприфоль (*Lonicera Caprifolium* L.).

Жимолость козья, см. Медуница (*Spiraea ulmaria* L.).

Жимолость костяная, см. Жимолость обыкновенная (*Lonicera Xylosteum* L.).

Жимолость обыкновенная (*Lonicera Xylosteum* L.). Гружмель (Бѣл.), Гроздь песій, Древокость, Жимолость (въ большей части Россіи), Жимолость волшебная, бѣлая, костяная, Жимолостка (Вятск.), Жимолость (Тв., Смол.), Жиломуста (Пск.), Жиломустина (Новг., Пск., Твер.), Жиломустникъ (Твер.), Жаломустникъ, Жиломустовина (Пск.), Жиломустина (Пет.), Жимолось (Сарат.), Жилость (Влад.), Жимолость, Жимолоска, Попряслочникъ, Сухое дерево (Гродн.), Волчьи ягоды (Яросл., Пет., Кал.), Сисошникъ

(плоды—соски), Никол. Свидзина (Гродн.), Калина (Костр.). Невысокій (вышиною 1½, рѣже до 4 арш.) очень вѣтвистый кустарникъ съ яйцевидными или овальными черешковыми листьями, изъ семейства «жимолостныхъ» (*Caprifoliaceae* Juss.), распространенный въ Европѣ, въ Европейской Россіи, исключая южныхъ губерній, на Кавказѣ и въ Сибири. Молодые побѣги, листья, цвѣтоножки и вѣнчикъ покрыты пушкомъ. Желтоватобѣлые лишенные запаха цвѣты сидятъ по два на концахъ пазушныхъ цвѣтоножекъ. Чашечка 5-тизубчатая, вѣнчикъ трубчатый, кверху расширенный съ почти двугубымъ, 5-тираздѣльнымъ отгибомъ; трубочка его короче отгиба и снабжена вышуклиною при основаніи. Тычинокъ 5, прикрѣпленныхъ къ трубочкѣ вѣнчика; столбикъ простой, съ голевчатымъ рыльцемъ. Завязь нижняя 2—3-хгнѣздная, гнѣздо завязи съ нѣсколькими сѣмяпочками. Плодь 2—3-хгнѣздная попарно-сросшіяся, только при самомъ основаніи, красныя ягоды. Цвѣтетъ въ маѣ и въ іюнѣ. Растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками. Твердая, какъ кость, древесина идетъ на трости, чубуки, кнотовища и т. п. Овцы очень любятъ листья. (Рис. 78.)

Жимолость татарская (*Lonicera tatarica* L.). Татарскія вишни, Жимолость, Жимолостка, Жимлюсникъ, Нѣмка (Горн.). Высокій кустарникъ изъ семейства «жимолостныхъ» (*Caprifoliaceae* Juss.), распространенный вдоль Волги до Урала и въ Сибири. Отъ жимолости обыкновенной (*Lonicera Xylosteum* L., см. выше) отличается отсутствіемъ волосковъ и овальными, слегка сердцевидными листьями. Цвѣты бѣлые или розовые, ягоды оранжевыя, попарно сросшіяся. Часто разводится въ садахъ.

Жимолость черная, см. Бересклетъ бородавчатый (*Evonymus verrucosus* L.).

Жимолось, см. Жимолость обыкновенная (*Lonicera Xylosteum* L.).

Жинзентъ китайскій (*Panax Ginseng* Meyer.). Растеніе родомъ изъ Татаріи, Сѣвернаго Китая и Японіи. Въ Китаѣ считается универсальнымъ цѣлебнымъ средствомъ отъ всехъ болѣзней.

Жинзиверъ, см. Просвирникъ лѣсной (*Malva silvestris* L.).

Жинзиверъ большой, см. Просвирникъ курчавый (*Malva crispa* L.).

Жиравина, см. Клюква болотная (*Oxycoccus palustris* Pers.).

Жиравинина, см. Клюква болотная (*Oxycoccus palustris* Pers.).

Жиравины, см. Клюква болотная (*Oxycoccus palustris* Pers.).

Жирная трава масляная, см. Жирянка обыкновенная (*Pinguicula vulgaris* L.).

Жирнолистка, см. Жирянка обыкновенная (*Pinguicula vulgaris* L.).

Жирный корень, см. Окопникъ лекарственный (*Symphytum officinale* L.).

Жировины, см. Клюква болотная (*Oxycoccus palustris* Pers.).

Жируха, см. Крессъ-салатъ (*Lepidium sativum* L.).

Жируха, см. Майникъ двулистный (*Maianthemum bifolium* L.).

Жирянка обыкновенная (*Pinguicula vulgaris* L.). Глинистая трава, Жирянка (Двиг.), Жирнашетка, Жирная трава масляная, Занкель, Лучная трава, Сальникъ, Фіалка горная. Многолѣтняя болотная трава, изъ семейства «пузырчатковыхъ» (*Lentibulariaceae* Rich.), распространенное въ Европѣ, въ сѣв. и зап. Россіи и въ Сибири, съ розеткой прикорневыхъ листьевъ, цвѣточными стрѣлками, несущими по одному цвѣтку. Листья продолговатые или эллиптическіе (овальные), немного мясистые и покрытые сверху клейкими железками. Какъ только какое-нибудь мелкое насекомое случайно попадаетъ на верхнюю поверхность листа, оно пристаетъ къ липкому соку, железки начинаютъ выдѣлять кислую жидкость, въ которой мягкія части насекомого начинаютъ разлагаться, а продукты разложения всасываются листомъ, являясь такимъ образомъ пищей для растенія. Цвѣты фіолетовые съ шиловидной шпорой, длина которой вдвое меньше длины цвѣтка. Чашечка 5-тираздѣльная почти двугубая; вѣнчикъ съ раскрытымъ зѣвомъ, 2-хлопастной, болѣе короткой верхней губой и болѣе длинною 3-хлопастною нижней губой. Тычинокъ 2, прикрѣпленныхъ къ основанію вѣнчика къ передней его сторонѣ, пестикъ съ одногнѣздной завязью, содержащей толстый сѣмяносецъ, и съ короткимъ столбикомъ, несущимъ 2-хлопастное рыльце. Плодъ — многосѣмянная, 2-хстворчатая яйцевидная и прямостоячая коробочка. Сѣмена мелкія, безбѣлковые. Цвѣтетъ въ маѣ и юнѣ. Растетъ на болотахъ. (Рис. 79.)

Житаръ, см. Ячмень обыкновенный (*Hordeum vulgare* L.).

Житвица, см. Райграссъ англійскій, Плевель многолѣтній (*Lolium perenne* L.).

Житвицъ, см. Пырей ползучій (*Triticum repens* L.).

Житецъ, см. Пырей ползучій (*Triticum repens* L.).

Житецъ, см. Костеръ (*Bromus* L.).

Житецъ, см. Костеръ мягкій (*Bromus mollis* L.).

Житникъ, см. Ячмень обыкновенный (*Hordeum vulgare* L.).

Житница, см. Бѣлокрыльникъ болотный (*Calla palustris* L.).

Житница, см. Аржанецъ Вемеровъ, Тимофеевка степная (*Phleum Boeheimeri* Nab.).

Житнякъ, см. Костеръ ржаной (*Bromus secalinus* L.).

Жито, см. Ячмень обыкновенный (*Hordeum vulgare* L.).

Жито, см. Рожь обыкновенная (*Secale cereale* L.).

Жито, см. Пшеница обыкновенная (*Triticum vulgare* Vill.).

Жито скукучье, см. Кукушкинъ ленъ (*Polytrichum commune* L.).

Житовникъ, см. Канарейникъ тростниковый (*Phalaris arundinacea* L.).

Житожолдь, см. Вьюнокъ полевой (*Convolvulus arvensis* L.).

Жманъ, см. Кошачья лапка (*Helychrisum arenarium* Dc.).

Жминда, см. Амарантъ обыкн., Щирей (*Amaranthus Blitum* L.).

Жминда, см. Жминда лозная (*Blitum virgatum* L.).

Жминда лозная (*Blitum virgatum* L.). Боровикъ, Бурачки (Херс.)

Бросовая трава, Жминда, Зминда, Краснодавень (Курск.), По-

левая малина (Черн.), Ратафія (около Маринск. колон. Сарат. губ.), Сорочьи ягоды (Ворон.), Сурочьи (отъ сурокъ) ягоды (Сар.), Волчьи ягоды. Однолѣтнее травянистое растеніе, изъ семейства «солончаковыхъ» (*Chenopodiaceae* Vent.), распространенное въ средней и южной Россіи и въ Туркестанѣ. Стебель выпш. отъ 3—12 вершк. Листья супротивные, коротко-черешковые, продолговато-треугольные, концевидные, по краямъ съ длинными острыми зубцами. Ярko-красные цвѣты собраны клубочками въ углахъ листьевъ. Околоцвѣтникъ травянистый 5-тираздѣльный; тычинокъ 5; завязь одногнѣздная съ 1 яичкомъ. столбиковъ 2—3. Плодъ—сѣмянка, заключенъ въ околоцвѣтникъ, походить на ягоду. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ на сорныхъ мѣстахъ. (Рис. 80.)

Жовины, см. Ежевика обыкновенная (*Rubus fruticosus* L.).

Жовинникъ, см. Ежевика обыкновенная (*Rubus fruticosus* L.).

Жовникъ, см. Частуха обыкновенная (*Alisma Plantago* L.).

Жовня, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).

Жовта горячка, см. Цминъ (*Helichrysum arenarium* Dc.).

Жовтенька кошка, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).

Жовтець, см. Ослиникъ двулѣтній (*Oenothera biennis* L.).

Жовтило, см. Пулавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).

Жовтило, см. Серпуха вѣнценосная (*Serratula coronata* L.).

Жовтило, см. Кермекъ татарскій (*Statice tatarica* L.).

Жовтобрюхъ, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).

Жовтобрюшникъ, см. Лютикъ ѣдкій (*Ranunculus acris* L.).

Жовточница, см. Селезеночникъ очереднолистный (*Chrysosplenium alternifolium* L.).

Жовтяница, см. Селезеночникъ очереднолистный (*Chrysosplenium alternifolium* L.).

Жолга, см. Рдестъ плавающий, водяная капуста (*Potamogeton natans* L.).

Жолга плавучая, см. Рдестъ плавающий, водяная капуста (*Potamogeton natans* L.).

Жолдь, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).

Жолнеры, см. Ослиникъ двулѣтній (*Oenothera biennis* L.).

Жолтяница, см. Цминъ (*Helichrysum arenarium* Dc.).

Жолуницъ, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

Жолуничный корень, см. Горлецъ, раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).

Жонкиль дикій, см. Косатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Жостеръ, см. Крушина слабительная (*Rhamnus cathartica* L.).

Жостеръ, см. Крушина слабительная (*Rhamnus cathartica* L.).

Жостикъ, см. Крушина слабительная (*Rhamnus cathartica* L.).

Жостилъ, см. Крушина слабительная (*Rhamnus cathartica* L.).

Жостиръ, см. Крушина слабительная (*Rhamnus cathartica* L.).

Жостіръ, см. Крушина слабительная (*Rhamnus cathartica* L.).

Жугастро, см. Кленъ полевой (*Acer campestre* L.).

Жуковы головки, см. Черноголовникъ крохоблюбовый (*Poterium sanguisorba* L.).

- Жура, см. Зюзникъ европейскій (*Lycopus europaeus* L.).
 Журава, см. Клюква болотная (*Oxycoccus palustris* Pers.).
 Журавельникъ, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).
 Журавлина, см. Клюква болотная (*Oxycoccus palustris* Pers.).
 Журавлины, см. Клюква болотная (*Oxycoccus palustris* Pers.).
 Журавинникъ, см. Чина лѣсная (*Lathyrus silvestris* L.).
 Журавиха, см. Чина луговая (*Lathyrus pratensis* L.).
 Журавка, см. Чина луговая (*Lathyrus pratensis* L.).
 Журавка, см. Звѣздчатка большая (*Stellaria Holostea* L.).
 Журавленникъ, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).
 Журавлина, см. Клюква болотная (*Oxycoccus palustris* Pers.).
 Журавлина, см. Вика (*Vicia sativa* L.).
 Журавлинникъ, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).
 Журавлинникъ омеговый, см. Аистникъ цикутный (*Erodium cicutarium* L.).
 Журавлиное сѣмя, см. Воробейникъ лекарственный (*Lithospermum officinale* L.).
 Журавлины, см. Клюква болотная (*Oxycoccus palustris* L.).
 Журавлинъ горошекъ, см. Чина луговая (*Lathyrus pratensis* L.).
 Журавлиные стручки, см. Чина луговая (*Lathyrus pratensis* L.).
 Журавлиные стручки, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).
 Журавлиные стручья, см. Девясилъ иволестный (*Inula salicina* L.).
 Журавлиныя ягоды, см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.).
 Журавникъ, см. Подмаренникъ мягкій (*Galium Mollugo* L.).
 Журавникъ, см. Горошекъ мышиный (*Vicia cracca* L.).
 Журанъ, см. Медунца (*Spiraea ulmaria* L.).
 Журахвина, см. Клюква болотная (*Oxycoccus palustris* Pers.).
 Журинъ, см. Земляные орѣшки (*Spiraea filipendula* L.).
 Журовина, см. Клюква болотная (*Oxycoccus palustris* Pers.).
 Журовинникъ, см. Клюква болотная (*Oxycoccus palustris* Pers.).
 Журодонникъ, см. Медунца (*Spiraea ulmaria* L.).
 Жывокисть, см. Окопникъ лекарственный (*Symphytum officinale* L.).
 Жывокисть, см. Чернокорень обыкновенный (*Cynoglossum officinale* L.).
 Жывокисть водяной, см. Окопникъ лекарственный (*Symphytum officinale* L.).
 Жывокисть, см. Окопникъ лекарственный (*Symphytum officinale* L.).
 Жыжуха, см. Крапива жгучая или мелкая (*Urtica urens* L.).

3.

- Забируха, см. Пастушья сумка (*Capsella bursa pastoris* Moench.).
 Забируха, см. Повелика клеверная (*Cuscuta Epithimum* Sm.).
 Забируха, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).
 Забируха, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).
 Заболоточникъ, см. Девясиль британскій (*Inula britanica* L.).
 Заборная трава, см. Подмаренникъ сѣверный (*Galium boreale* L.).
 Заборная трава, см. Гравилатъ водяной (*Geum rivale* L.).
 Заборная трава, см. Торица полевая (*Spergula arvensis* L.).
 Забудекъ, см. Чернобыльникъ обыкновенный (*Artemisia vulgaris* L.).
 Забудка, см. Чернобыльникъ обыкновенный (*Artemisia vulgaris* L.).
 Забудки, см. Чернобыльникъ обыкновенный (*Artemisia vulgaris* L.).
 Забудьки, см. Чернобыльникъ обыкновенный (*Artemisia vulgaris* L.).
 Завалецъ, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).
 Завальная трава, см. Вербейникъ обыкновенный (*Lysimachia vulgaris* L.).
 Завилецъ, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).
 Завилецъ, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).
 Завилецъ американскій, см. Орѣхъ земляной американскій (*Arachis hypogaea* L.).
 Завилецъ земляной или подземный, см. Орѣхъ земляной американскій (*Arachis hypogaea* L.).
 Завитки, см. Репяшокъ обыкновенный (*Agrimonia eupatorium* L.).
 Завитки, см. Перелѣска трехлопастная (*Anemone hepatica* L.).
 Завязникъ, см. Лапчатка-узикъ (*Potentilla Tormentilla* Schrenk.).
 Завязникъ стоячій, см. Лапчатка-узикъ (*Potentilla Tormentilla* Schrenk.).
 Завязный корень, см. Лапчатка-узикъ (*Potentilla Tormentilla* Schrenk.).
 Завязный корень, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).
 Завязный корень, см. Горлецъ раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).
 Завязный корень, см. Фіалка ночная (*Patanthera bifolia* Rich.).
 Завязный корень, см. Кукушкины слезки (*Orchis maculata* L.).
 Завязный корень, см. Ввтреница лютиковая (*Anemone ranunculoides* L.).
 Загадка, см. Мелколепестникъ ѣдкій (*Erigeron acris* L.).
 Загибъ, см. Ленъ дикий (*Linaria vulgaris* Mill.).
 Заговорная трава, см. Гравилатъ водяной (*Geum rivale* L.).
 Загозья рожь, см. Кукушкинъ ленъ (*Polytrichum commune* L.).

- Задержникъ**, см. Блошница проносная (*Pulicaria disenterica* L.).
- Задержка**, см. Лопушникъ большой (*Lappa major* Gärtn.).
- Заенче зелле**, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).
- Зажмурникъ**, см. Авранъ лекарственный (*Gratiola officinalis* L.).
- Заича кровь**, см. Звѣробой обыкновен. (*Hypericum perforat.* L.).
- Закуска Петрова**, см. Пазникъ крапчатый (*Achyrophorus maculatus* Scop.).
- Залевъ**, см. Собачья петрушка (*Aethusa Cynaplum* L.).
- Залегуина**, см. Орѣхъ лѣсной (*Corylus Avellana* L.).
- Зализнякъ черный**, см. Плакунъ трава (*Lythrum Salicaria* L.).
- Зализнякъ червоний**, см. Плакунъ трава (*Lythrum Salicaria* L.).
- Залучникъ**, см. Дурнишникъ вонючій (*Xanthium strumarium* L.).
- Залѣсъ трава**, см. Живучка мохнатая (*Ajuga genevensis* L.).
- Замашка**, см. Конопля полевная или обыкновенная (*Cannabis sativa* L.).
- Замошказъ**, см. Кульбаба осенняя (*Leontodon autumnalis* L.).
- Занихеллія болотная** (*Zanichellia palustris* L.). Трава изъ семейства «наядовыхъ» (*Najadaceae*), распространенная въ Европѣ, въ западной, средней и южной Россіи. Стебель нитевидный, ползучій. Листья большею частью супротивные, ярко-зеленые, узко-линейные, длиною отъ $\frac{1}{2}$ —1 вершка. Цвѣты однодомные: тычиночные—безъ околоцвѣтника съ 1 тычинкой; а пестичные—съ колокольчатымъ околоцвѣтникомъ и 4 плодниками. Цвѣтеть во второй половинѣ лѣта; растетъ въ стоячихъ и медленно текущихъ водахъ. (Рис. 81.)
- Занникъ**, см. Запникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa* L.).
- Зановатъ** см. Дрокъ красильный (*Genista tinctoria* L.).
- Зановатъ**, см. Аютины глаза (*Viola tricolor* L.).
- Зановецъ**, см. Дрокъ красильный (*Genista tinctoria* L.).
- Зановитъ**, см. Дрокъ красильный (*Genista tinctoria* L.).
- Зановица**, см. Дрокъ красильный (*Genista tinctoria* L.).
- Занозка**, см. Ярутка полевая (*Thlaspi arvense* L.).
- Занозка плавучая**, см. Манникъ обыкновенный (*Glyceria Puitans* R. Br.).
- Запникъ**, см. Запникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa* L.).
- Запникъ клубненосный** (*Phlomis tuberosa* L.). Бабка (Курск.), Спящая бабка (Хар., Екат.), Братъ съ сестрой (Вор.), Буквица (Уф.), Волчье ухо (Тавр.), Жабья трава, Жерновцы (Алт.), Желуховая плеть (Уф.), Зячья трава, Залъ, Залья трава, Запникъ, Занникъ, Крапива глухая (Херс.), Земляной картофель, Земляная картошка (Сиб.), Лапушникъ (Уф.), Лихорадочный корень (Приарг. кр.), Лошадиный кочетокъ (Ворон.), Медовая трава (Курск.), Медовикъ (южн. Рос.), Медовникъ (Екат.), Медуншникъ полевой (Вор.), Медоука, Медовка (Екат.), Младенческая трава (Вор.), Нечуй-вѣтеръ (Екат.), Паровица (Уф.), Христовый посошокъ (Киш.), Посошокъ узловатый, Примочная

(Тульск.). Цуновикъ, Пустостволая трава, Ранная (Кал.), Утиная трава, Церковникъ (Уф.), Чертополохъ (Пенз.), Чильчажная трава, Чужеварникъ. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное въ южной и средней Европѣ, южной и средней Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ и въ Сибири, съ длинными веревчатыми корнями, съ шарообразными утолщеніями; стебель высокій, простой или вѣтвистый, голый; листья снизу пушистые, рѣже, почти сѣровато-войлочные; нижніе—съ длинными черешками, треугольно-сердцевидные, городчатые; стеблевые—яйцевидно-ланцетные, при основаніи сердцевидные; верхушечные—ланцетные, сидячіе, съ тупымъ, клинообразнымъ основаніемъ, городчато-пильчатые, нижніе изъ нихъ превышаютъ цвѣтки; послѣдніе въ многочисленныхъ, многоцвѣтковыхъ кольцахъ, собранныхъ при основаніи листьевъ, снабжены линейно-шило-видными прицвѣтниками, немного превышающими чашечку, и усажены оттопыренными, болѣе или менѣе жесткими волосками; чашечка голая, трубчатая съ 10-ю жилками и столькими-же складками между ними, съ 5-ю широкими выемчатыми зубцами, несущими въ выемкѣ длинную нитевидную отогнутую ость, втрое короче чашечки. Вѣнчикъ розовый, вдвое превышающій чашечку, снабженъ внутри волосатымъ кольцомъ. Верхняя губа спереди зубчатая, длинно-рѣсничатая, ввидѣ плеча, сжатого съ боковъ; нижняя губа трехлопастная; средняя лопасть немного длиннѣе и шире боковыхъ; тычинокъ 4; изъ нихъ наружныя длиннѣе среднихъ, сближенныхъ близъ основанія линейными придатками; пыльники попарно сближены надъ верхней губой, съ расходящимися гнѣздами. Завязь 4-лопастная, 4-гнѣздная, съ одной сѣмяпочкой въ каждомъ гнѣздѣ и съ поднестичнымъ дискомъ при основаніи, столбикъ срединный съ двулопастнымъ рыльцемъ. Плодъ распадается на 4 трехгранныхъ, на верхушкѣ тупыхъ и пушистыхъ, орѣшка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на холмахъ и въ степяхъ.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОПУЛЯЦИЯ. Растение употребляется въ народной медицинѣ. Корень толкутъ въ порошокъ и присыпаютъ на раны. Траву сушатъ и завариваютъ, какъ чай, и принимаютъ отъ лихорадки и отъ грижи. Маленькимъ дѣтямъ отваръ травы даютъ отъ судорогъ. Въ степныхъ губерніяхъ корни сушатъ, пекутъ ихъ, затѣмъ варятъ на молокѣ. Сваренные такимъ образомъ корни пріятны на вкусъ и имѣютъ видъ обыкновенной молочной баши. Казаки употребляютъ отваръ сушеныхъ корней отъ поноса.

Заплеть, см. Лапчатка-узикъ (*Potentilla Tormentilla* L.).

Записа, см. Пасленъ сладко-горькій (*Solanum dulcamara* L.).

Заплиха, см. Пасленъ сладко-горькій (*Solanum dulcamara* L.).

Запольникъ, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).

Запонки, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Запонки, см. Просвириникъ обыкновенный (*Malva rotundifolia* L.).

Запонки, см. Купальница европейская (*Trollius europaeus* L.).

Запаноукъ, см. Лилія водяная (*Nymphaea alba* L.).

Запъ, см. Запникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa* L.).

Запя трава, см. Запникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa* L.).

Запя-трава, см. Пахучка обыкновенная (*Calamintha Clinopodium* Benth.).

Зараза, см. Заразиха красноватая (*Orobancha rubens* L.).

Зараза, см. Лютикъ ѣдкій (*Ranunculus acer* L.).

Зараза-трава, см. Петровъ крестъ (*Lathraea Squamaria* L.).

Заразиха, см. Заразиха красноватая (*Orobancha rubens* L.).

Заразиха, см. Волчокъ (*Orobancha ramosa* sin. *Phelipaea ramosa* C. A. Mey.).

Заразиха красноватая (*Orobancha rubens* L.). Вѣтвь Гжева, Гусья вика, Грохоядъ, Гнѣздо птичье, Гнѣздо трава, Зараза, Заразиха (Дв.), Солнцевъ корень, Коровье имя (Вол., Под.), Незелень, Стебель Гусья трава. Трава, лишенная зелени и паразитирующая на корняхъ люцерны и многихъ другихъ мотыльковыхъ растений; принадлежитъ къ семейству «заразиховыхъ» (*Orobanchaceae*), распространена въ южной и юго-западной Россіи. Стебель вышиною 4—6 вершк. мясистый, голый, буровато-красный съ ланцетными, чередными, чешуйчатыми листьями; цвѣты собраны верхушечнымъ колосомъ, отъ 1½—2½ вершк. Чашечка 4-хлопастная, съ широкими яйцевидными неравно 2-хнадрѣзными чашелистниками. Внѣшнѣ трубочато-колокольчатый, двугубый, желтоватый или буровато-красный съ прямой спинкой, верхняя губа шиловидно-покатая, двулочастная. Тычинокъ 4; нити ихъ отъ основанія до середины густо-мохнатые; завязь верхняя, одногнѣздная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—коробочка съ многочисленными очень мелкими сѣменами. Цвѣтетъ въ маѣ и юнѣ.

Зарница, см. Колокольчикъ круглолистный (*Campanula rotundifolia* L.).

Заросликъ, см. Луговой чай (*Lysimachia Nummularia* L.).

Заруза, см. Лютикъ ползучій (*Ranunculus repens* L.).

Заруха, см. Лютикъ ползучій (*Ranunculus repens* L.).

Заря, см. Горичникъ болотный (*Peucedanum palustre* Moench.).

Заря лѣсная, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Заспица, см. Медунца (*Spiraea ulmaria* L.).

Засплина, см. Василѣстникъ голубковый (*Thalictrum aquilegifolium* L.).

Засплиса, см. Василѣстникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).

Засплиха, см. Василѣстникъ голубковый (*Thalictrum aquilegifolium* L.).

Заспица, см. Василѣстникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).

Застиръ, см. Крушина слабительная (*Rhamnus cathartica* L.).

Застѣлъ Христовъ, см. Колокольчикъ жестковолосый (*Campanula cervicaria* L.).

- Застѣпъ Христовъ, см. Горечавка крупная (*Gentiana Pneumonanthe* L.).
- Засцыха, см. Ерникъ обыкновенный (*Empetrum nigrum* L.).
- Затяжная трава, см. Василекъ перистый (*Thalictrum Scabiosa* L.).
- Заушница, см. Вшивица болотная (*Pedicularis palustris* L.).
- Зашорникъ, см. Анютины глазки (*Viola tricolor* L.).
- Заяцъ, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).
- Заяча капуста, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).
- Заяча кровь, см. Майникъ двулист. (*Majanthemum bifol.* L.).
- Заяча разсада, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).
- Заяча кривця, см. Клеверъ краснѣющій или красный коло-
совидный (*Trifolium rubens* L.).
- Заячій горохъ, см. Дрокъ красильный (*Genista tinctoria* L.).
- Заячій горохъ, см. Эспарсеть кормовой (*Onobrychis sativa* Lam.).
- Заячій козелецъ, см. Латукъ дикій или салатъ дикій (*Lactuca Scariola* L.).
- Заячій клеверъ желтый, см. Язвенникъ обыкновенный (*Anthyllis Vulneraria* L.).
- Заячій корень, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).
- Заячій кривецъ, см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).
- Заячій ленъ, см. Кукушкинъ ленъ (*Polytrichum commune* L.).
- Заячій листъ, см. Синеголовникъ плосколистный (*Eryngium planum* L.).
- Заячій макъ, см. Горичѣвъ весенній (*Adonis vernalis* L.).
- Заячій овесъ, см. Костеръ ржаной (*Bromus secalinus* L.).
- Заячій очитокъ, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).
- Заячій пухъ, см. Пушица обыкновенная (*Eryophorum polystachium* L.).
- Заячій пухъ, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).
- Заячій салатъ, см. Румянка лекарственная (*Anchusa officinalis* L.).
- Заячій салатъ, см. Чистякъ (*Festuca ranunculoides* Moench.).
- Заячій салатъ, см. Осотъ огородный (*Sonchus oleraceus* L.).
- Заячій хлѣбъ, см. Трюфель (*Tuber Mich.*).
- Заячій хмель, см. Вязель разноцвѣтный (*Coronilla varia* L.).
- Заячій чеснокъ, см. Лукъ угластый (*Allium anbullosum* L.).
- Заячій щавель, } см. Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.).
- Заячій щавухъ, }
- Заячья буквица, см. Луговой чай (*Lysimachia Nummularia* L.).
- Заячья капуста, см. Манжетка обыкнов. (*Alchemilla vulgaris* L.).
- Заячья капуста, см. Арника горная (*Arnica montanum* L.).
- Заячья капуста, см. Володушка золотистая (*Buplerum aureum* Fisch.).
- Заячья капуста, см. Чертополохъ огородный (*Cirsium oleraceum* All.).

Заячья капуста, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).
 Заячья капуста, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).
 Заячья капуста, см. Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.).
 Заячья капуста, см. Шавель малый (*Rumex acetosella* L.).
 Заячья капуста, см. Хлопушка (*Silene inflata* Smith.).
 Заячья капуста, см. Осотъ огородный (*Sonchus oleraceus* L.).
 Заячья капуста, см. Осотъ полевой (*Sonchus arvensis* L.).
 Заячья капуста, см. Полевой лепокъ (*Turritis glabra* L.).
 Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.). Фармацевтическое название *Telephium s. Crassula major, s. Fabaria, s. Fabra crassa* (Kadix et herba). Бобовая трава, Божій цвѣтъ (Могил.), Бобъ громовой, Воронье сало, Воронье масло тр., Гадунъ (Полт.), Живая трава, Забруха (Вятск.), Заяць, Заячья трава (Хар., Курская), Заяча капуста (Малор.), Заячья капустка (Омск.), Заячий очитокъ, Заяча разсада (Малор.), Котовикъ (Вят.), Котовы м...ки (Вят., Арх.), Котовы яйца (Вят.), Молодило, Молодило сайгачье, Мыльникъ (Вор.) Очитокъ, Очипокъ, Пчельникъ (Херс.), Дикій роиникъ (Подол., съ полск.), Сайгачья капуста, Сайгачій молодиль (Кам.), Самотай (Волог.) г., Никол. у.), Скрипунъ, Толстолистникъ, Узикъ, Ужинъ, Уразная (Новг.), Цѣлистникъ (Мог.), Шестинедѣльникъ. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «толстянковыхъ» (*Crassulaceae* Dc.), распространенное въ сѣв. и средн. Европѣ и почти по всей Россіи, вышиною 5—7 вершк., съ прямостоячимъ простымъ стеблемъ; листья очередные или супротивные, сидячіе, плоскіе, обратно-яйцевидные или овальные, но краямъ зубчатые. Зеленовато-желтые или красновато-пурпуровые цвѣты расположены на верхушкѣ стебля ввидѣ густой щитковидной метелки. Чашелистниковъ и лепестковъ по 5-ти. Тычинокъ 10. Плодъ—сложенная листовка. Цвѣтетъ во 2-ой половинѣ лѣта. Растетъ на сухихъ небчанихъ и каменистыхъ мѣстахъ, въ лѣсахъ и между кустарниками.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Трава и корни заячьей капусты прежде употреблялись въ медицинѣ снаружи, какъ средство отъ ранъ, бородавокъ, мозолей и обжога, а внутрь сокъ травы принимали отъ падучей болѣзни.

Въ Россіи вода, перегнанная черезъ листья травы этого растения, называется, «жив ою водою» и употребляется обыкновенно для примачиванія застарѣлыхъ ранъ и карбункуловъ. (О цѣлебныхъ свойствахъ этой воды говорится въ русскихъ народныхъ сказкахъ.)

Свѣжее истолченное растение прикладывается на больные суставы, также изъ сушеного растения дѣлаютъ припарки на суставы, въ которыхъ при движеніяхъ слышенъ скрипъ или трескъ, что часто бываетъ при хроническомъ ревматизмѣ. Въ народѣ растение это иначе называется «скрипуномъ». Название это можно объяснить именно тѣмъ, что оно употребляется отъ скрипа и треска въ суставахъ.

Настоемъ этого растенія крестьянскіе знахари поятъ женщинъ отъ безплодія и даютъ также мужчинамъ отъ слабости. Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ губерніяхъ эту траву пьютъ отъ грудныхъ болѣзней. Снаружи ее употребляютъ отъ порѣзанныхъ ранъ; отъ ожоговъ прикладываютъ свѣжіе листья. Выжатымъ сокомъ мажутъ ротъ при молочницѣ, или афтахъ (на слизистой оболочкѣ рта и губъ появляются язвочки, которыя и носятъ названіе афтъ, въ народѣ это заболѣваніе рта называется «тульбою»). Въ Вологодской губерніи крестьяне держатъ эту траву у себя въ домѣ для предохраненія скота отъ болѣзней.

Кромѣ того, толченныя листья этого растенія хорошо помогаютъ отъ мозолей на ногахъ. При продолжительномъ прикладываніи этихъ листьевъ мозоль бѣлветъ, теряетъ чувствительность и отпадаетъ.

Выжатый сокъ изъ всего растенія принимаютъ по 2 столовыхъ ложки заразъ. Всего лучше его принимать съ сывороткою. Заячья капуста, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.). Заячья картошка, см. Дождевикъ шишковатый (*Lycoperdon gemmatum* Batsch.).

Заячья кисленка, }
Заячья кисленица, } см. Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.).
Заячья кислица, }

Заячья кривца, }
Заячья кровца, } см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).

Заячья кровь, см. Молочай лозный (*Euphorbia virgata* Kit.).

Заячья кровь, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

Заячья кровь, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).

Заячья кривца, см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).

Заячья лапка, см. Кошачья лапка (*Antennaria dioica* Gärtn.).

Заячья лапка, см. Кокушникъ (*Gymnadenia Conopsea* Rich.).

Заячьи лапки, см. Серпуха вѣдвеносная (*Serratula coronata* L.).

Заячьи лапки, см. Клеверъ пашенный или кошачій (*Trifolium arvense* L.).

Заячьи лапки, см. Клеверъ краснѣющій или красный колосовидный (*Trifolium rubens* L.).

Заячья рутка, см. Петрушка горная (*Peucedanum Oreoselinum* Moench.).

Заячья салата, см. Чистякъ (*Ficaria ranunculoides* Moench.).

Заячья соль, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).

Заячья соль, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).

Заячья соль, см. Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.).

Заячья соль, см. Грушанка однобокая (*Pyrola secunda* L.).

Заячья трава, см. Кошачья лапка (*Antennaria dioica* Gärtn.).

Заячья трава, см. Ледвенецъ рогатый (*Lotus corniculatus* L.).

Заячья трава, см. Очитокъ бобовый (*Sedum Fabaria* Koch.).

- Заячье дерево, см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).
- Заячьи братки, см. Ледвенецъ рогатый (*Lotus corniculatus* L.).
- Заячьи бурачки, см. Синякъ обыкновенный (*Echium vulgare* L.).
- Заячьи возжи, см. Плаунъ булабовидный (*Lycopodium clavatum* L.).
- Заячьи глазки, см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.).
- Заячьи м...ки, } см. Клеверъ пашенный или кошачій (*Trifolium*
- Заячьи ножки. } *arvense* L.).
- Заячьи пушки, см. Пушница (*Eriophorum* L.).
- Заячье ухо, см. Коровякъ бѣлоцвѣтный (*Verbascum lychnitis* L.).
- Заячьи уши, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).
- Заячьи уши, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).
- Заячьи ушки, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).
- Заячьи ушки, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).
- Заячьи ушки, см. Васильки рогатые (*Delphinium Consolida* L.).
- Заячьи ушки, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).
- Заячьи ягодки, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).
- Заячьи яички, см. Клеверъ пашенный или кошачій (*Trifolium arvense* L.).
- Зайковыйя ягодки, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).
- Зайчики, см. Клоповникъ (*Lepidium ruderales* L.).
- Зайчики боровые, см. Чина черная (*Orobis niger* L.).
- Зайчикъ, см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).
- Зайчикъ, см. Латукъ дикій или салатъ дикій (*Lactuca Scariola* L.).
- Зайчикъ, см. Осоть огородный (*Sonchus oleraceus* L.).
- Зайчукъ, см. Васильки рогатые (*Delphinium consolida* L.).
- Зайчуха, см. Васильки рогатые (*Delphinium consolida* L.).
- Зайчушки, см. Васильки рогатые (*Delphinium consolida* L.).
- Зайцевы ягодки, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).
- Звѣробой, см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).
- Звоница, см. Погребомъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista Galli* L.).
- Звонки, см. Колокольчикъ болонскій (*Campanula boloniensis* L.).
- Звонко-трава, см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).
- Звоночки, см. Анютинны глазки (*Viola tricolor* L.).
- Звоночки, см. Колокольчикъ болон. (*Campanula bolontensis* L.).
- Звонъ земляной трава, см. Кермекъ лимонный (*Statice Limonium* L.).

Звѣздовка, см. Звѣздовка большая (*Astrantia major* L.).

Звѣздовка большая (*Astrantia major* L.). Фармацевтическое название *Astrantia s. Imperatoria nigra*. Астранція большая. Патранъ (съ серб.). Красивое многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «зонтичныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), распространенное въ средн. и южной Европѣ и съ западной Россіи, со стеблемъ выш. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ арш. Листья глубоко-пильчато-пятираздѣльные, нижніе длинно-черешковые, верхніе почти сидячіе. Соцвѣтіе—простой зонтикъ, снабженный оберткой, состоящей изъ 10—20 бѣлыхъ или красноватыхъ продолговато-ланцетныхъ прицвѣтниковъ; цвѣты мелкіе, бѣлые или красноватые. Чашечка о 5-ти зубчикахъ, лепестковъ и тычинокъ по 5; завязь нижняя 2-хгнѣздная, съ однимъ янчкомъ въ каждомъ гнѣздѣ, на верхушкѣ несетъ железистый дискъ; столбиковъ 2. Плодъ продолговатый—двусѣмянка, распадающійся снизу вверхъ на 2 плодика, изъ которыхъ каждый съ 5-ю складчато-зубчатыми полыми ребрами. Цвѣтетъ лѣтомъ. Встрѣчается въ лѣсахъ и между кустарниками. (Табл. XV, фиг. 85.)

Звѣздомохорочникъ, см. Мелколепестникъ ѣдкій (*Erigeron acris* L.).

Звѣздопеченная трава, } см. Ясминникъ душистый (*Asperula odorata* L.).

Звѣздоподручная трава, }

Звѣздочка, см. Астра дикая (*Aster Amellus* L.).

Звѣздочка, см. Звѣздчатка большая (*Stellaria Holostea* L.).

Звѣздочки, см. Макъ мексиканскій (*Argemone mexicana* L.).

Звѣздочки, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* Coult.).

Звѣздочная трава, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).

Звѣздочная трава, см. Макъ мексиканскій (*Argemone mexicana* L.).

Звѣздчатая трава, см. Звѣздчатка злачная (*Stellaria graminea* With.).

Звѣздочникъ, } см. Звѣздчатка злачная (*Stellaria graminea* With.).

Звѣздочница, }

Звѣздчатка, }

Звѣздчатка большая (*Stellaria Holostea* L.). Фармацевтическое

название *Gramen Floridum*. Гвоздика (Яросл.), Грубъ (Ниж.),

Грыжникъ (Малор.), Живая трава (Полт.), Журавка (Вор.), Звѣз-

дочка (Яросл.), Зарочникъ (Умань), Костянецъ, Костенецъ, Под-

спѣжная трава (Ниж.), Приворотная трава, Пырьникъ (Мог.),

Расперстница (Кіевск.), Сердечная трава (Перм.), Совиное

зелье (Екат.), Травянка (Екат.), Чистокъ (Орл.), Чистецъ лѣсо-

вой, Дикая розга (Кал.), Нехворощъ (Волын.), Хвоць (Волын.),

Конопляникъ (Хар.), Бѣлило (Хар.), Подмаренникъ (Борон.),

Шинель (Моск.). Травянистое многолѣтнее растение изъ се-

мейства «мокричныхъ» (*Alsineae*), распространенное во всей

Европѣ и въ большей части Россіи, вышиною 3—4 вершк., съ

ползучимъ корневищемъ и прямостоящими 4-хгранными стеб-

лями. Листья узко-ланцетные, длинно-заостренные, на краяхъ

и по средней жилкѣ шершавые. Соцвѣтіе—негустой полузон-

тикъ; верхушечные листья—травянистые. Цвѣтки бѣлые. Чашечка 3-хлестная, лепестковъ 5, до середины двураздѣльныхъ, вдвое длиннѣе чашелистиковъ. Тычинокъ 10, столбика 3. Завязь одногнѣздная съ срединнымъ сѣмяноспецемъ. Плодь—шаровидная коробочка, раскрывающаяся 6-ю створками. Цвѣтетъ съ апрѣля до конца юня. Встрѣчается въ лѣсахъ и между кустарниками.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Сокъ травы прежде употреблялся въ медицинѣ отъ воспаления глазъ, теперь совсѣмъ оставленъ. Въ пародѣ крѣпкій декоктъ травы принимаютъ отъ ломоты въ костяхъ, а также отъ рѣзы въ животѣ и отъ кашля. Снаружи сокомъ растенія смазываютъ кожу отъ чесотки.

Звѣздчатка злѣчная (*Stellaria graminea* L.). Блосинникъ (Полт.), Конскій вехъ (Хар.), Конобой, Курья или курячья слѣпота, Дикій ленъ (Влад.), Лѣсной ленъ (Нижег.), Моховикъ (Перм.), Мыльная трава, Мыловка (на Дону), Мыловникъ (на Дону у казаковъ), Огонь-трава (югъ Россіи), Отзепникъ (зепь-зобъ Костр.), Повейка (Ниж.), Паровица (Перм.), Пьяное сѣно (Херс., Хар.), Пьяная трава (югъ Россіи), Мыло воробьиное (Нижег.), Урочное зелье (Амб.), Мелкій цвѣтокъ (Тамб.), Цѣпнякъ (Могил.), Яснущка (Волог.), Звѣздчатка (Дв.), Звѣздочникъ, Звѣздочка (Арх.), Звѣздочная трава, Звѣздочница, Торица (Ниж.), Фиранья (Орл.), Подмаренникъ (Вор.). Травянистое многолѣтнее растеніе изъ семейства «мокричныхъ» (*Alsineae*), распространенное почти во всей Европѣ, во всей Россіи до Архангельска, въ Крыму и на Кавказѣ. Стебель обыкновенно простерто-вѣтвистый, 4-хгранный, вмѣстѣ съ листьями зеленый; листья узко-ланцетные, по краямъ и при основаніи рѣсничатые; бѣлые цвѣтки въ раскидистомъ полузонтикѣ; верхушечные листья плеччатые, по краямъ рѣсничатые. Чашелистиковъ и лепестковъ 5. Чашелистики острые съ 3-мя жилками. Лепестки обыкновенно не длиннѣе чашелистиковъ. Тычинокъ 10; столбиковъ 3; завязь одногнѣздная съ срединнымъ сѣмяноспецемъ. Плодь—шаровидная коробочка, раскрывающаяся 6-ю створками. Цвѣтетъ съ весны до осени. Растетъ на поляхъ, на лугахъ между кустарниками.

Звѣздчатка лѣсная (*Stellaria nemorum* L.). Гаведа, Яскорка. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «мокричныхъ» (*Alsineae*), распространенное въ большей части Россіи и во всей Европѣ. Стебель гладкій, лежачій или приподнимающійся, наверху пушистый, дл. 7—14 вершк. Листья сердцевидные, заостренные, верхніе продолговато-яйцевидные сидячіе; цвѣтки бѣлые, одиночныя въ углахъ развѣтвленій стебля и полузонтиками на концахъ вѣтвей; цвѣтоножки при плодахъ горизонтальныя; чашелистиковъ 5, ланцетныхъ; лепестковъ 5, двураздѣльныхъ, вдвое длиннѣе чашелистиковъ. Тычинокъ 10; столбика 3; завязь одногнѣздная съ срединнымъ сѣмяноспецемъ. Плодь—продолговатая или шаровидная коробочка, раскрывающаяся 6-ю створками. Цвѣтетъ съ мая до августа. Растетъ въ сырыхъ, тѣнистыхъ лѣсахъ и между кустарниками. (Рис. 82.)

- Звѣнецъ**, см. Погremoкъ обыкновенн. (*Rhinanthus Crista Galli* L.).
- Звѣрецъ**, см. Чина весенняя (*Orobis vernus* L.).
- Звѣробой**, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).
- Звѣробой**, см. Горечавка крупная (*Gentiana Pneumonanthe* L.).
- Звѣробой**, см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).
- Звѣробой**, см. Вахта трилистная (*Menyanthes trifoliata* L.).
- Звѣробой**, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).
- Звѣробой**, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).
- Звѣробой боровой**, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).
- Звѣробой бѣлый**, см. Колокольчикъ жестковолосый (*Campanula cervicaria* L.).
- Звѣробой бѣлый**, см. Соколий перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).
- Звѣробой горный** (*Hypericum montanum* L.). Звѣробой черный, Звѣробойникъ. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «звѣробоевыхъ» (*Hypericineae* Dc.), распространенное почти во всей Европѣ, въ западной и юго-западной Россіи и въ Закавказьѣ. Стебель прямой, голый, цилиндрическій; листья сидячіе, при основаніи сердцевидные, овальные, снизу темного шероховатые, только верхніе съ просвѣчивающими точками; цвѣтки желтые, скученные и головчатое соцвѣтіе; чашечка остающаяся, пятилистная; чашелистики ланцетные, острые, по краямъ съ железистыми бахромками; лепестковъ 5, въ почкосложеніи скрученныхъ, на краю съ сидячими черными железами. Тычинокъ много, сросшихся своими нитями въ 3—5 пучка. Столбиковъ 3—5. Завязь вполнѣ или не вполнѣ 3—5-тигнѣздная, съ сѣмяносами по краямъ плодолистиковъ; плодъ—многосѣмянная коробочка, сѣмена безбѣлковые съ прямымъ зародышемъ. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ въ лѣсахъ, между кустарниками. Рнс. 83.)
- Звѣробой горскій**, см. Свертія многолѣтняя (*Swertia perennis* L.).
- Звѣробой дикий**, см. Вербейникъ обыкновенный (*Lysimachia vulgaris* L.).
- Звѣробой дикий**, см. Душица обыкновенный (*Origanum vulgare* L.).
- Звѣробой дырявый**, см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).
- Звѣробой желтый**, см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).
- Звѣробой женскій**, см. Стародубка (*Gentiana Amarella* L.).
- Звѣробой женскій**, см. Горечавка крупная (*Gentiana Pneumonanthe* L.).
- Звѣробой каменный**, см. Многоножка обыкновенная (*Polypodium vulgare* L.).
- Звѣробой малый**, см. Горечавка крупная (*Gentiana Pneumonanthe* L.).
- Звѣробой мужской синій**, см. Колокольчикъ переклолистный (*Campanula persicifolia* L.).

Звѣрбой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.). Фармацевтическое названіе *Herba Perforatae* s. *Fugae Demonum*, s. *Millerpertae*. *Herba cum floribus* s. *summutates et semen Hyperici*. Березка (Могил.), Воронецъ (Черн.), Дюравецъ обыкн. (Гродн.), Диравикъ, Звѣрбой дыравый, Заячикъ (Сарат.), Заячье дерево (Вол.), Заячья кровь (Малор.), Заяча кривца, Заячий кривецъ (Волк.), Заячья кровца, Заячья кривца (Екат.), Зановить (Балта), Звонки-трава, Позвонки (Вор.), Звѣрбой (Вел. Росс.), Звѣрбой (Малор.), Звѣрбойникъ, Звѣрбой желтый, Здоровая трава, Зелье святоянского (Малор.), Святоянскіе зилы, Сынтоянское зилле (юго-зап. Росс.), Св. Ивана зелье (Гродн.), Свентоянское зелье (Бѣлор.), Свято-иванская трава, Кровавецъ (Черн.), Кровца (Тавр.), Кривца (Малор.), Кровавникъ (Гродн., Киевск.), Кравникъ (Малор.), Молодецкая кровь-трава (Умань), Красная травица (Минск.), Семибратная кровь (Кол.), Дикая кура (Вор.), Крымопальки (Умань), Ракита (Екат.), Матери Вожіей слезы (Малор.), Хворобой (Кел.). Многолѣтнее травянистое растеніе, изъ семейства «звѣрбоекъ» (*Hypericaceae* Dc.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель прямой, наверху вѣтвистый съ 2-хгранными междоузліями, выш. 7—14 вершк. Листья овальные, продолговато-яйцевидные и продолговато-линейные, съ просвѣчивающими точечными железками. Многочисленные золотисто-желтые цвѣты собраны на верхушкѣ стебля щитковидною метелкой; чашечка 5-тилистная; чашелистики ланцетные, острые. Лепестковъ 5, въ почкосложеніи скрученныхъ; тычинокъ много, сросшихся своими нитями въ нѣсколько пучковъ; столбиковъ 3—5. Завязь вполнѣ или не вполнѣ 3—5-тигнѣзная, съ сѣмяноспами по краямъ плодолистиковъ. Плодъ—многосѣмянная коробочка, раскрывающаяся расклеиваніемъ плодолистиковъ. Сѣмена безбѣлковыя, съ прямымъ зародышемъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Созрѣваетъ съ августа по октябрь. Растетъ на лугахъ, между кустарниками. Обладаетъ довольно пріятнымъ запахомъ. Всѣ части растенія содержатъ большое количество летучаго масла, напоминающаго терпентинъ. Цвѣты его доставляютъ желтую и красную краску, употребляемую въ красильномъ дѣлѣ, какъ окрашивающую ленъ, шерсть и шелкъ въ красный и желтый цвѣтъ. Главнымъ-же образомъ употребляется въ народной медицинѣ, гдѣ прежде, по своимъ цѣлебнымъ свойствамъ почиталось волшебнымъ. (Табл. XVI. фиг. 87.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Внутрь настой звѣрбоия въ народной медицинѣ употребляется отъ боли въ животѣ, также отъ удушья, грудной боли и кашля. Снаружи спиртнымъ настоемъ звѣрбоия растираютъ суставы отъ ломоты. Листья звѣрбоия крестыгнѣ настаиваютъ на деревянномъ маслѣ, прибавляютъ къ нему немного скипидара и этимъ масломъ растираютъ больные суставы. Мазь изъ свѣжихъ листьевъ звѣрбоия пригоовляется слѣдующимъ образомъ: берутъ горсть свѣжихъ листьевъ звѣрбоия и шалфея, толкутъ ихъ со свѣжымъ свинымъ саломъ, прожимаютъ

сквозь ветошку въ банку, которую хорошо закупориваютъ. Мазь эта долгое время не портится и считается полезною для заживленія различныхъ ссадинъ, въ особенности у домашнего скота.

Винная настойка готовится изъ цвѣтовъ звѣрбога; на бутылку простого вина кладутъ 2—3 горсти цвѣтовъ, отчего вино окрашивается въ красный цвѣтъ. Настойку пьютъ по рюмкѣ 2—3 раза въ день. Также нѣкоторые совѣтуютъ пить горячій отваръ звѣрбога вмѣсто чая, для этого одну столовую ложку сушеныхъ цвѣточныхъ верхушекъ заливаютъ стаканомъ кипятка, даютъ немного настояться и принимаютъ по чашкѣ заразь, одинъ или два раза въ день.

Винный декоктъ цвѣтовъ звѣрбога особенно рекомендуется отъ чахотки легкихъ; для приготовления декокта берутъ полную горсть сушеныхъ цвѣточныхъ верхушекъ, заливаютъ ее тремя фунтами бѣлаго вина и кипятятъ, пока не останется 2 фунта, потомъ процеживаютъ и даютъ больнымъ по большой полной рюмкѣ или по $\frac{1}{2}$ стакана (по 6 столовыхъ ложекъ) ежедневно по утрамъ. Свѣжую толченую траву звѣрбога прикладываютъ вмѣсто припарокъ. Звѣрбой полевой, см. Шлемникъ обыкновенный (*Scutellaria galericulata* L.).

Звѣрбой синій, см. Колокольчикъ жестковолосый (*Campanula cervicaria* L.).

Звѣрбой синій, см. Колокольчикъ сборный или приточная трава (*Campanula glomerata* L.).

Звѣрбой синій, см. Иссопъ лекарственный (*Hyssopus officinalis* L.).

Звѣрбой синій, см. Синюха обыкновенная (*Polemonium coeruleum* L.).

Звѣрбой степной, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).

Звѣрбой черный, см. Звѣрбой горный (*Hypericum montanum* L.).

Звѣрбой черный, см. Горечавка крупная (*Gentiana Pneumonanthe* L.).

Звѣрбойникъ, см. Звѣрбой горный (*Hypericum montanum* L.).

Звѣрбойникъ, см. Звѣрбой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).

Згаръ, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).

Здашникъ, см. Аистникъ пикутный (*Erodium cicutarium* L.).

Здиха, см. Пасленъ черный (*Solanum nigrum* L.).

Здоровая трава, см. Звѣрбой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).

Здрижникъ, см. Трясушка средняя (*Briza media* L.).

Зезамъ, см. Кунжутъ (*Sesamum indicum* DC.).

Зезюлинъ подарокъ, см. Кукушкины слезки (*Orchis maculata* L.).

Зезюлины слезы, см. Ятрышникъ-дремликъ (*Orchis Morio* L.).

Зезюлька, см. Очанка лекарственная (*Euphrasia officinalis* L.).

Зелезница, см. Плаунъ сѣлоснутый (*Lycopodium complanatum* L.).

Зелезнякъ плавный, см. Плакунъ-травя (Lythrum Salicaria L.).

Зеленецъ, см. Конопля полевая или обыкновенная (Cannabis sativa L.).

Зеленика, см. Самшитъ обыкновенный (Buxus sempervirens L.).

Зеленика, см. Плаунъ булавистый (Lycopodium clavatum L.).

Зеленика, см. Плаунъ сплюснутый (Lycopodium complanatum L.).

Зеленика, см. Пюнь тонколистный (Paeonia tenuifolia Lin.).

Зеленикъ, см. Полъска многолѣтная (Mercurialis perennis L.).

Зеленикъ, см. Бузина вонючая (Sambucus Ebulus L.).

Зеленичникъ, см. Плаунъ булавистый (Lycopodium clavatum L.).

Зеленичево дерево, см. Самшитъ обыкновенный (Buxus sempervirens L.).

Зеленица, см. Верескъ обыкновенный (Calluna vulgaris Salisb.).

Зеленица, см. Плаунъ булавистый (Lycopodium clavatum L.).

Зеленица, см. Плаунъ сплюснутый (Lycopodium complanatum L.).

Зеленица, см. Стальникъ пахучій (Ononis hircina Jacq.).

Зеленица, см. Марена красильная или настоящая (Rubia tinctoria L.).

Зеленка, см. Плаунъ булавистый (Lycopodium clavatum L.).

Зеленка, см. Грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia L.).

Зеленка, см. Барвинокъ малый (Vinca minor L.).

Зеленая кошка, см. Лапчатка норвежская (Potentilla norvegica L.).

Зеленуха, см. Дрокъ красильный (Genista tinctoria L.).

Зеленуха, см. Плаунъ булавистый (Lycopodium clavatum L.).

Зеленчукъ, см. Зеленчукъ желтый (Galeobdolon luteum Sm.).

Зеленчукъ желтый (Galeobdolon luteum Sm.). Фармацевтическое название *Lamium luteum*. Доброполь, Зеленчукъ. Курытникъ вонючій, Волшебная крапива, Лѣсная крапива (Черниг.), Крапивка (Костр.), Ладанъ земляной, Липникъ (Смол.), Глухая мята (Вор.), Куриная слѣпота (Твер.), Сѣрякъ (Моск.). Травянистое многолѣтнее растение изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (Labiales Juss.), распространенное почти во всей Европѣ, въ сѣверной, средней и юго-западной Россіи. Стебель восходящій, мало-вѣтвистый, вып. 3—12 вершк. Листья черешковые, округло-яйцевидные, городчатые, испещренные серебристыми пятнами; нижніе листья при основаніи слегка сердцевидные. Желтые цвѣты по 6 въ удаленныхъ другъ отъ друга мутовкахъ; чашечка трубчато-колокольчатая, съ 5-ю жилками и 5-ю ланцетными колюче-заостренными зубцами; вѣнчикъ съ невыдающейся изъ чашечки трубкой, снабженной волосистымъ кольцомъ при ея основаніи, съ вогнутой племообразной длинно-рѣсничатою верхней и трехлопастною нижней губой; лопасти послѣдней яйцевидно-ланцетныя, острые, средняя немного крупнѣе боковыхъ. Тычинокъ 4, параллельныхъ подъ верхней губой; боковыя изъ нихъ длиннѣе среднихъ; гнѣзда пыльниковъ расходящіеся. Завязь верхняя 4-лопастная, 4-хгнѣздная съ однимъ столбикомъ съ 2-храздѣльнымъ

- рыльцемъ. Плодъ при созрѣваніи распадается на 4 остро-
грехгранныхъ, наверху притупленныхъ, орѣшка. Цвѣтетъ
весною. Растетъ между кустарниками и въ лѣсахъ.
- Зелень зимняя**, см. Грушанка круглолистная (*Pyrola rotundi-
folia* L.).
- Зелье бѣшеное**, см. Дурманъ вонючій (*Datura Stramonium* L.).
- Зелье вонючее**, см. Кишнецъ огородный (*Coriandrum sativum* L.).
- Зелье воробьиное**, см. Воробейникъ лекарственный (*Lithosper-
mum officinale* L.).
- Зелье вѣдьмино**, см. Колдунъ-трава (*Circaea lutetiana* L.).
- Зелье гающее**, см. Манжетка обыкновенная (*Achlemilla vul-
garis* L.).
- Зелье гвоздичное**, см. Гравилатъ городской (*Geum urbanum* L.).
- Зелье красное**, см. Дигиль лѣсной (*Angelica silvestris* L.).
- Зелье курье**, см. Полѣска однолѣтняя (*Mercurialis annuus* L.).
- Зелье лихорадочное**, см. Авранъ лекарственный (*Gratiola offi-
cinalis* L.).
- Зелье лѣсное**, см. Бородавникъ обыкновенный (*Lampsana com-
munis* L.).
- Зелье млечное**, см. Млечникъ морской (*Glaux maritima* L.).
- Зелье многоглазое**, см. Рута горная (*Asplenium Ruta muraria* L.).
- Зелье-романекъ**, см. Ромашка собачья (*Maruta Cotula* Dc.).
- Зелье св. Ивана**, } см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum*
Зелье Святоянское, } *perforatum* L.).
- Зелье солодкое**, см. Блошница проносная (*Pulicaria dysente-
rica* L.).
- Зелье сонное**, см. Белладонна (*Atropa Belladonna* L.).
- Зелье сонное**, см. Мандрагора (*Atropa Mandragora* L.).
- Зелье татарское**, см. Айръ обыкновенный (*Acorus calamus* L.).
- Зелье черное**, см. Чина весенняя (*Orobis vernus* L.).
- Зелье черное**, см. Чина черная (*Orobis niger* L.).
- Зелье яблотовое**, см. Будра плющевидная (*Glechoma hede-
rascia* L.).
- Зельечко дрибчатое**, см. Бедренецъ обыкновенный (*Pimpinella
saxifraga* L.).
- Землепухъ**, см. Мелколенестникъ ѣдкій (*Erigeron acris* L.).
- Землецвѣтка**, см. Аютины глаза (*Viola tricolor* L.).
- Земляника**, см. Хвойникъ обыкновенный (*Ephedra vulgaris* Rich.).
- Земляника**, см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca* L.).
- Земляника**, см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).
- Земляника ананасная** (*Fragaria grandiflora* Ehrh.). Ананасная
клубника. Родомъ изъ Америки. Культивируется у насъ въ
садахъ.
- Земляника болотная**, см. Сабельникъ болотный (*Comarum
palustre* L.).
- Земляника лѣсная** (*Fragaria vesca* L.). Земляника, Землянич-
никъ, Землянка, Земляница (Новг., Перм., Волог., Пск., Яр.,
Тамб.), Зубриловка (Ряз.), Красная ягода (Гродн.), Листовникъ
(Олон.), Материнка (Волын.), Падубница (Орл.), Пазабникъ (Ряз.,

Орл., Вор.), Пазобникъ (Орл., Вор.), Пазобника (Ряз., Курск.), Пазубника (Вор., Курск.), Пазбника (Ряз.), Паземника (Тамб.), Пазепика, Пазменка (Тамб.), Пызонока (Тамб.), Позибника (Тул.), Поземка, Позюмка (юг.-зап. Росс.), Поземки, Позюмки (Пск.), Поземчикъ трава (Вил.), Полуночникъ (Кiev.), Полунишникъ (Умань), Поло или Полевичникъ, Половишникъ (Курск.), Полоница (Малор.), Полуница (Кiev.), Половницы, Полевницы (Херс.), Полевтица, Суница, Суничка, Суничникъ (Вѣлор.), Суница (Мал.), Суницѣ, Суныця, Суника (Курск.), Ягодникъ (Смол., Хар., Курск.), Ягѣдникъ (Малор.), Ягода, Подъягодникъ. Вѣтъ известное травянистое растеніе, многолѣтнее, изъ семейства «розовѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook. et Benth.), распространенное въ Европѣ и почти во всей Россіи, съ прикорневыми, длинно-черешковыми, тройчатыми листьями и вѣтвистой стрѣлкой, несущей большіе цвѣты. Бурое короткое корневище выпускаетъ длинныя, надземныя побѣги (усы), которые, укореняясь, даютъ начало новымъ особямъ. Цвѣточные стебли, а также черешки покрыты оттопыренными волосками. Цвѣтки обыкновенно двудомныя, всѣ плодущіе. Чашечка 5-тираздѣльная, приросшая къ полушаровидному цвѣтоложу, снабженная подчашьемъ изъ листочковъ менѣе крупныхъ, чѣмъ доли чашечки; послѣднія при плодахъ отвороченныя. Лепестковъ 5, обратно-яйцевидныхъ. Тычинокъ неопредѣленное число, онѣ немного короче пестика. Плодолистики съ короткимъ боковымъ столбикомъ, расположенные на мясистой выпуклости цвѣтоложа, становящейся при плодахъ сочною. Ложный плодъ шаровидный или овальный, краснаго цвѣта, состоитъ изъ сѣмянокъ, погруженныхъ до половины въ мякоть выпуклаго, разросшагося, мясистаго цвѣтоложа, составляющаго мякоть ягоды. Цвѣтетъ съ апрѣля по іюль. Растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками. Употребляется въ пищу. Многочисленные крупноплодные сорта земляники, разводимыя въ Россіи въ садахъ и огородахъ, получены скрещиваніемъ виргинской или багряной земляники (*Fragaria Virginiae* Ehrh.) съ чилийскою (*Fragaria chilensis* Ehrh.), отечество которыхъ Америка. (Табл. XVI, фиг. 88.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Корень и листья лѣсной земляники прежде употреблялись въ медицинѣ подъ именемъ *Radix et herba Fragariae*, теперь они совсѣмъ оставлены. Въ народной медицинѣ до сихъ поръ это растеніе въ большомъ употребленіи.

Земляничный чай пьютъ отъ простуды, изъ сушеныхъ листьевъ дѣлаютъ припарки и прикладываютъ ихъ на глаза, также на щеку отъ зубной боли и на животъ отъ боли въ печени.

Изъ ягодъ выжимаютъ сокъ и пьютъ его на-топчакъ отъ 4-хъ до 8-ми столовыхъ ложекъ. Отъ чувства удущья въ груди принимаютъ отваръ листьевъ земляники. Для отвара берутъ одну столовую ложку листьевъ, заливаютъ ихъ фунтомъ воды и кипятятъ, пока не останется $\frac{1}{2}$ фунта, процеживаютъ и пьютъ черезъ 2 часа по столовой ложкѣ. Этотъ-же отваръ дается женщинамъ отъ кровотеченія. Для увеличенія количества молока пьютъ от-

варь земляничнаго корня на черномъ пивѣ. Для этого 2 стол. ложки (1 унцѣ=30 граммъ) заливаютъ бутылкою пива и кипятятъ до тѣхъ поръ, пока останется половина. Снаружи свѣжіе листья земляники прикладываютъ на застарѣлыя язвы. Свѣжія ягоды земляники полезны отъ цыгги и отъ каменной болѣзни.

Въ аптекахъ готовится перегнанная земляничная вода, которая имѣетъ очень пріятный охлаждающій вкусъ.

Земляника парижекая (<i>Fragaria calycina</i> Lsel.).	} Всѣ три вида составляютъ сорта французской земляники, замѣняющую во Франціи нашу лѣсную.
Землянка провансальская (<i>Fragaria calycina</i> Lsel.).	
Земляника шампанская (<i>Fragaria calycina</i> Lsel.).	

Земляница, см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca* L.).

Земляничникъ, см. Релишокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).

Земляничникъ, см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca* L.).

Землянка, см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca* L.).

Землянуха, см. Брюква (*Brassica Napus* L.).

Земляной виноградъ, см. Петровъ крестъ (*Lathraea Squamaria* L.).

Земляной завилецъ, см. Американскій земляной орѣхъ (*Arachis hypogea* L.).

Земляной картофельъ, см. Запникъ клубеносный (*Phlomis tuberosa* L.).

Земляной ладанъ, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Земляной миндаль, см. Циперусъ съѣдобный (*Cyperus esculentus* L.).

Земляной мохъ, см. Плаунъ булавистый (*Lycopodium clavatum* L.).

Земляной орѣхъ, см. Американскій земляной орѣхъ (*Arachis hypogea* L.).

Земляной орѣхъ американскій, см. Американскій земляной орѣхъ (*Arachis hypogea* L.).

Земляной фисташковый орѣшникъ, см. Американскій земляной орѣхъ (*Arachis hypogea* L.).

Земляная груша, см. Груша земляная (*Helianthus tuberosus* L.).

Земляная желчь трава, см. Золототысячникъ обыкновенный (*Erythraea centaureum* L.).

Земляная картошка, см. Запникъ клубеносный (*Phlomis tuberosa* L.).

Земляная малина, см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).

Земляная рѣдка, см. Дряква европейская (*Cyclamen europaeum* L.).

Земляное мыло, см. Кудри царскія (*Lilium Martagon* L.).

Земляные Ма(ы)шки, см. Чина клубеносная (*Lathyrus tuberosus* L.).

Земляные огурцы, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Земляные орѣхи, см. Чина клубненосная (*Lathyrus tuberosus* L.).

Земляные орѣшки, см. Медунница (*Spiraea ulmaria* L.).

Земляные орѣшки (*Spiraea filipendula* L.). Фармацевтическое названіе *Filipendula* s. *Saxifraga rubra*. Балабанъ (Малор.), Бархатки полевая (Уф.), Березка полевая, Бесъ дерево (Хар.), Бузина полевая (Екат.), Бѣлогловникъ, Воронецъ (Малор.), Гадючникъ (Малор.), Гречишникъ (Ворон.), Горкунъ (Волын.), Деревей лѣсной (Курск.), Донникъ (Вят.), Донная трава, Журинъ, Кашка (Тамб.), Ключъ (Курск.), Кропило, Лабазникъ, Липка (Малор.), Ломокамень красный, Ломъ каменный трава, Камне-ломъ, Медовикъ, Медунка (Орл.), Медунца (Могил.), Медовые орѣшки, Огурешникъ (Екат.), Поповникъ (Могил.), Порупникъ (Полт.), Початочки (Полт.), Починочки (Полт.), Пухъ (Тамб.), Ржочки (Хар.), Рябинка (Херс.), Самиръ (Подол.), Смутникъ (Черниг.), Судочистъ (Курск.), Сѣрое зелье (Екат.), Таволга земляные орѣхи (Двиг.), Талабанъ, Тарабанъ (Малор.), Балабанъ, Трясулька. Травянистое многолѣтнее растение изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Корень съ шишковатыми вздутіями (шишковатый). Стебель вышиною отъ $\frac{1}{2}$ —1 арш. Листья прерывчато-перистые, съ многочисленными перисто-надрѣзанными листочками. Цвѣтки обоеполые бѣлые съ красноватымъ отгѣнкомъ. Долей чашечки и лепестковъ вѣнчика 5. Тычинокъ 20—40, прикрѣпленныхъ вдоль жилокъ чашечки; нѣти ихъ при основаніи утонченныя, послѣ цвѣтенія отпадающія; пестикъ изъ 12-ти плодolistиковъ; рыльце головчатое; плодъ состоитъ изъ пушистыхъ сѣмянокъ. Цвѣтетъ съ мая до сентября. Растетъ на сухихъ лугахъ и между кустарниками. Корневья шишки съѣдобны. (Рис. 84.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Прежде растение это употреблялось въ медицинѣ, какъ сильное мочегонное средство и отъ геморроя. Донскіе казаки употребляютъ листья этого растенія вмѣсто чая. Въ Малороссіи его употребляютъ для заживленія ранъ отъ укушенія гадюка; для этого берутъ все растение съ корнемъ, варятъ его и отваромъ обливаютъ рану, а послѣ еще парятъ траву и дѣлаютъ изъ нея припарки къ ранѣ. Въ Пермской губерніи корневья шишки употребляются ввидѣ слабаго отвара маленькимъ дѣтямъ отъ грижи и отъ поноса.

Земляные орѣшки, см. Хохлатка плотная (*Corydalis solida* Smith.).

Земляныя яблоки, см. Дряква европейская (*Cyclamen europaeum* L.).

Земляныя яблоки, см. Картофель (*Solanum tuberosum* L.).

Земчякъ, см. Картофель (*Solanum tuberosum* L.).

Зензиверова трава, см. Просвирникъ лѣсной (*Malva silvestris* L.).

Зензиверъ, см. Просвирникъ лѣсной (*Malva silvestris* L.).

Зеновецъ, см. Люцерна серповидная (*Medicago falcata* L.).

- Зеновка**, см. Душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.).
- Зенальки**, см. Ночная фиалка (*Platanthera bifolia* Rich.).
- Зердали**, см. Персикъ (*Persica vulgaris* Dc.).
- Зернетъ**, см. Овесъ обыкновенный (*Avena sativa* L.).
- Зерновица**, см. Икотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* DC.).
- Зерновица**, см. Подмаренникъ мягкій (*Galium Mollugo* L.).
- Зерно говушично**, см. Зерно горчичное (*Phytolacca dedecandra* L'Herit.).
- Зерно горушно**, см. Зерно горчичное (*Phytolacca dedecandra* L'Herit.).
- Зерно горчичное** (*Phytolacca dedecandra*, sin. *Pircumia abissinica* Hoffm.). Многолѣтняя трава съ яйцевидно-ланцетными цѣльно-крайними листьями и съ черными ягодами, родомъ изъ Сѣв. Америки, встрѣчается на югѣ Европы. Листья, ягоды и особенно корни на вкусъ горькіе и остро-жгучіе, при варкѣ теряютъ эти свойства; молодые листья и корни употребляютъ въ пищу, какъ овощи, но въ вареномъ видѣ. Краснымъ сокомъ ягодъ подкрашиваютъ во Франціи и въ Португаліи вина. Ради своего примѣненія это растеніе особенно культивируется въ пространствѣ отъ южной Германіи до сѣв. Итали. Растеніе это иногда употребляется врачами отъ глистовъ.
- Зетка**, см. Рожь обыкновенная (*Secale cereale* L.).
- Зиберь**, см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).
- Зибовникъ**, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).
- Зилле свянтоянское**, см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).
- Зиллѣ татарское**, см. Аиръ обыкновенный (*Acorus calamus* L.).
- Зиллѣ одтрясці**, см. Лютикъ ѣдкій (*Ranunculus acer* L.).
- Зиллѣ свѣнтоянское**, см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).
- Зимняя рѣпа**, см. Груша земляная (*Helianthus tuberosus* L.).
- Зимніе цвѣты**, см. Цминъ (*Helychrisum arenarium* Dc.).
- Зимнякъ**, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).
- Зимовикъ**, см. Зимовникъ осенній (*Colchium autumnale* L.).
- Зимовникъ**, см. Зимовникъ осенній (*Colchium autumnale* L.).
- Зимовникъ осенній** (*Colchium autumnale* L.). Фармацевтическое название *Colchium*, *Crocus pratensis*. Безвременный цвѣтъ, Безвременница, Зимовникъ, Оснякъ, т. е. Осенникъ, Осенній цвѣтъ, Песобой, Собачья смерть, Подсѣжникъ, Недолгоцвѣтущая, Разсѣдъ-трава, Шафранъ дикій, Луговой шафранъ. Многолѣтнее травянистое луковичное растеніе изъ семейства Лилейныхъ (*Liliaceae* Dc.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ западной Россіи. Короткій стебель, при основаніи утолщаясь, образуетъ клубень, окруженный бурыми влагалищами старыхъ листьевъ; ежегодно клубень выпускаетъ осенью только одни блѣднорозовые цвѣты, весной-же появляются зеленые широколанцетные листья и плоды (коробочка). Околоцвѣтникъ состоитъ изъ воронковиднаго 6-траздѣльнаго отгиба и длинной, тонкой трубочки, нижняя часть которой во время цвѣтенія

скрыта въ землѣ. Тычинокъ 6, прикрѣпленныхъ въ зѣвъ около пѣтника, изъ нихъ 3 короче и 3 длиннѣе. Столбиковъ 3, нитевидныхъ, съ булавовидными рыльцами, плодъ — коробочка, раскрывается наверху, по перегородкамъ, вслѣдствіе расклеиванія плодолистиковъ другъ отъ друга. Цвѣтетъ осенью. Растетъ на влажныхъ лугахъ. Растеніе ядовитое. Изъ клубней и сѣмянъ ядовитый алкалоидъ «колхицинъ», употребляемый въ медицинѣ.

МЕДИЦИНОКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Растеніе дѣйствуетъ возбуждающимъ образомъ на органы, лежащіе въ брюшной полости. Въ маленькихъ приемахъ оно приноситъ пользу отъ ревматизма и подагры. Въ гомеопатіи готовится настойка изъ свѣжихъ корней растенія. Ее даютъ отъ ревматизма, отъ водянки въ животѣ, при болѣзняхъ мочевыхъ органовъ, при чувствѣ стѣсненія въ груди и такъ далѣе. Даютъ одну или двѣ три капли чистой настойки или 1—2-го разведенія, одинъ или два раза въ день, смотря по обстоятельствамъ, иногда даютъ и чапе.

Въ ветеринарной гомеопатіи дается животнымъ настойка этого растенія отъ ревматизма и болей въ животѣ. Даютъ отъ 3 до 6-го разведенія.

Зимодра, см. Вербейникъ обыкновен. (*Lysimachia vulgaris* L.).

Зимозеленъ, см. Рута пахучая (*Ruta graveolens* L.).

Зимозеленица, } см. Грушанка круглолистная (*Pyrola rotundifolia* L.).

Зимозеленко, } см. Жимолость обыкновенная (*Lonicera Xylos-teum* L.).

Зимоцвѣтъ, см. Цминъ (*Helichrisum arenarium* Dc.).

Зинзивей, } см. Просвирникъ обыкновенный (*Malva rotundifolia* L.).

Зинзиверь, } см. Просвирникъ лѣсной (*Malva silvestris* L.).

Зинзиверь, см. Просвирникъ обыкновен. (*Malva rotundifolia* L.).

Зинзиверь круглолистный, см. Просвирникъ обыкновенный (*Malva rotundifolia* L.).

Зинзиверь огородный, см. Просвирникъ лѣсной (*Malva silvestris* L.).

Зинобратъ, см. Дербенникъ прутняковый (*Lythrum virgatum* L.).

Зиновникъ, см. Лютикъ ползучій (*Ranunculus repens* L.).

Зимодра, см. Вербейникъ обыкновенный (*Lysimachia vulgaris* L.).

Зиновка, см. Душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.).

Зирки червоныя, см. Вербена лекарственная (*Verbena officinalis* L.).

Зирочки, } см. Гвоздика (*Dianthus* L.).

Златникъ, см. Асфодель вѣтвистый (*Asphodelus ramosus* L.).

Златоглавъ, см. Асфодель вѣтвистый (*Asphodelus ramosus* L.).

Златоселезенникъ, см. Селезеночникъ очереднолистный (*Chrysosplenium alternifolium* L.).

Златотысячникъ, } см. Золототысячникъ обыкновенный (*Erythraea Centaurium* L.).

Златотысячница, }

Златоцвѣтъ маточный, см. Дѣвникъ (*Pyrethrum Parthenium* Smith.).

Злая трава, см. Кирказонъ обыкновен. (*Aristolochia clematitis* L.).

Злосчастная трава, см. Подбѣлъ (*Andromeda polifolia* L.).

Злынка, см. Мелколепестникъ ѣдкій (*Erigeron acris* L.).

Змѣева трава, см. Переступень бѣлый (*Bryonia alba* L.).

Змѣевка, см. Горлица ястребинковая (*Picris hieracifoloides* L.).

Змѣевикъ, см. Горлець раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).

Змѣиный корень, см. Ласточникъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* Mönch.).

Змѣевъ обѣдъ, см. Козелець приземистый (*Scorzonera humilis* L.).

Змѣева трава, см. Андреевъ-крестъ (*Veronica spicata* L.).

Змѣевецъ, см. Очанка лекарственная (*Euphrasia officinalis* L.).

Змѣевецъ, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).

Змѣевецъ, см. Андреевъ-крестъ (*Veronica spicata* L.).

Змѣевикъ, см. Кошачья лапка (*Antennaria dioica* Gärtn.).

Змѣевикъ, см. Эстрагонъ (*Artemisia Dracunculus* L.).

Змѣевикъ, см. Пахучка обыкновенная (*Calamintha clinopodium* Benth.).

Змѣевикъ, см. Бѣлокрыльникъ болотный (*Calla palustris* L.).

Змѣевикъ, см. Сушеница болотная (*Gnaphallium uliginosum* L.).

Змѣевикъ, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).

Змѣевикъ, см. Кукушкины слезки (*Orchis maculata* L.).

Змѣевикъ, см. Горлець, раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).

Змѣевикъ, см. Щавель водяной (*Rumex aquaticus* L.).

Змѣевикъ, см. Чистецъ лѣсной (*Stachis silvatica* L.).

Змѣевица, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).

Змѣевица, см. Чихотная трава (*Ptar mica vulgaris* Dc.).

Змѣевка, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).

Змѣевникъ, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia clematitis* L.).

Змѣевникъ, см. Соколий перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).

Змѣевникъ, см. Чистецъ лѣсной (*Stachis silvatica* L.).

Змѣевникъ лѣсной, см. Цминъ (*Helychrisum arenarium* Dc.).

Змѣевыя головки, см. Истождъ обыкновенный (*Polygala vulgaris* L.).

Змѣедушникъ, см. Сладкій корень (*Scorzonera hispanica* L.).

Змѣедушникъ низкій, см. Козелець приземистый (*Scorzonera humilis* L.).

Змѣиная, см. Колокольчикъ жестковолосый (*Campanula cervicaria* L.).

Змѣиная, см. Котовикъ голый (*Nepeta nuda* L.).

Змѣиная, см. Дубровка (*Veronica Chamaedrys* L.).

Змѣиная трава, см. Трясунка средняя (*Briza media* L.).

Змѣиная трава, см. Дербенникъ прутняковый (*Lythrum virgatum* L.).

Змѣиная трава, см. Ятрышникъ-Дремликъ (*Orchis Morio* L.).

Змѣиная трава, см. Чистецъ лѣсной (*Stachys silvatica* L.).

- Змѣиная трава, см. Андреевъ-крестъ (*Veronica spicata* L.).
- Змѣиная трава, см. Вероника ненастоящая (*Veronica spuria* L.).
- Змѣинецъ, см. Вшивица болотная (*Pedicularis palustris* L.).
- Змѣинникъ, } см. Горлецъ, раковыя шейки (*Polygonum*
- Змѣинничникъ, } *Bistorta* L.).
- Змѣиный корень, см. Гравилатъ рѣчной (*Geum rivale* L.).
- Змѣиный корень, см. Горлецъ раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).
- Змѣиный корень, см. Ласточникъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* Molnch.).
- Змѣиный мохъ, см. Плаунъ булабовидный (*Lycopodium clavatum* L.).
- Змѣй-трава, см. Бѣлокрыльникъ болотный (*Calla palustris* L.).
- Змѣй-трава, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).
- Змѣйка, см. Бѣлокрыльникъ болотный (*Calla palustris* L.).
- Змѣйка, см. Трясунка средняя (*Briza media* L.).
- Змѣйка-водяная, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).
- Змѣйка-трава, см. Трясунка средняя (*Briza media* L.).
- Знадыба, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).
- Знѣтенникъ, см. Осотъ огородный (*Sonchus oleraceus* L.).
- Зобная трава, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).
- Зобникъ, см. Кульбаба осенняя (*Leontodon autumnalis* L.).
- Зобникъ, см. Дурнишникъ вонючій (*Xanthium strumarium* L.).
- Зобница, см. Царскій скипетръ (*Pedicularis Sceptum Carolinum* L.).
- Зобный корень, см. Норичникъ водяной (*Scrophularia aquatica* L.).
- Зоборина, см. Зоря лекарственная (*Levisticum officinale* Koch.).
- Зозулины зимнички, см. Ятрышникъ широколистный (*Orchis latifolia* L.).
- Зозулины ручники, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).
- Зозулины ручнички, } см. Тайникъ овальный (*Listera ovata*
- Зозулины рушнички, } R. Br.).
- Зозулины сапожки, см. Чина весенняя (*Orobis vernus* L.).
- Зозулины слези, см. Гайникъ овальный (*Listera ovata* R. Br.).
- Зозулины слезки, см. Кокушникъ (*Symnadenia conopsea* Rich.).
- Зозулины слезки, см. Гайникъ овальный (*Listera ovata* R. Br.).
- Зозулины черевички, см. Анютины глазки (*Viola tricolor* L.).
- Зозулины черевички, см. Чина весенняя (*Orobis vernus* L.).
- Зозулины черевички, см. Васильки рогаые (*Delphinium consolida* L.).
- Зозулины черевички, см. Башмачки желтые (*Cypripedium calceolus* L.).
- Зозулины черевички черны, см. Чина черная (*Orobis niger* L.).
- Зозулникъ, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris* Moench.).

- Зозульки, см. Кокушникъ (*Symnadenia conopsea* Rich.).
 Зозульки, см. Ятрышникъ шлемовидный (*Orchis militaris* L.).
 Зозульки, см. Фиалка опушенная (*Viola hirta* L.).
 Зозульки жовти, см. Башмачки желтые (*Cypripedium calceolus* L.).
 Золотарникъ, см. Акація желтая (*Caragana arborescens* Lam.).
 Золотарникъ, см. Девясилъ британскій (*Inula britannica* L.).
 Золотарникъ, см. Кульбаба осенняя (*Leontodon autumnalis* L.).
 Золотарникъ, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).
 Золотень, см. Василистникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).
 Золотень, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).
 Золотень, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea millefolium* L.).
 Золотистка, }
 Золотистка желтая или } см. Цминъ (*Helychrisum arena-*
 обыкновенная, } *rium* Dc.).
 Золотистое солнце, см. Цминъ (*Helychrisum arenarium* Dc.).
 Золотисячникъ, см. Золототысячникъ обыкновенный (*Erythraea Centaurium* L.).
 Золотникъ, см. Буквица обыкновенная (*Betonica vulgaris* L.).
 Золотникъ, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).
 Золотникъ, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygona-*
tum L.).
 Золотникъ, см. Золототысячникъ обыкновенный (*Erythraeum*
Centaurium L.).
 Золотникъ, см. Пикульникъ длинноцвѣтный (*Galeopsis Lada-*
num L.).
 Золотникъ, см. Гусиная лапка (*Potentilla anserina* L.).
 Золотникъ, см. Василистникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).
 Золотникъ яловый, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguis-*
orba officinalis L.).
 Золотникова голова, } см. Бѣлзоръ болотный (*Parnassia pa-*
 Золотникова трава, } *lustris* L.).
 Золотникова трава, см. Золототысячникъ обыкновенный (*Ery-*
thraeum Centaurium L.).
 Золотничекъ мужской, см. Герань кроваво-красная (*Gera-*
nium sanguineum L.).
 Золотничка болотная, см. Бѣлзоръ болотный (*Parnassia*
palustris L.).
 Золотничная трава, см. Линнея сѣверная (*Linnaea borea-*
lis L.).
 Золото, } см. Василистникъ голубковый (*Thalictrum*
 Золото чертово, } *aquilegifolium* L.).
 Золото чертово, см. Селезеночникъ очереднолистный (*Chryso-*
splenium alternifolium L.).
 Золотоголовъ простой, см. Асфодель вѣтвистый (*Asphodelus*
ramosus L.).
 Золотоголовникъ, см. Асфодель вѣтвистый (*Asphodelus ramo-*
sus L.).

Золотоножка, см. Девясилъ британскій (*Inula britannica* L.).

Золотоокъ, см. Асфодель вѣтвистый (*Asphodelus ramosus* L.).

Золотолистникъ, см. Селезеночникъ очереднолистный (*Chrysosplenium alternifolium* L.).

Золототысячная трава, см. Золототысячникъ обыкновенный (*Erythraea Centaurium* L.).

Золототысячникъ, см. Травянка (*Dianthus deltoides* L.).

Золототысячникъ, см. Синеголовникъ плосколистный (*Eryngium planum* L.).

Золототысячникъ, см. Золототысячникъ обыкновенный (*Erythraea Centaurium* L.).

Золототысячникъ, см. Авранъ лекарств. (*Gratiola officinalis* L.).

Золототысячникъ, см. Цмпитъ (*Helichrisum arenarium* De.).

Золототысячникъ, см. Марьянникъ полевой (*Melampyrum arvense* L.).

Золототысячникъ, см. Гусиная лапка (*Potentilla anserina* L.).

Золототысячникъ обыкновенный (*Erythraea Centaurium* L.).

Фармацевтическое названіе *Centaurium minus*, *Herba febrifuga*. Василекъ малый (Полт.), Горечавка (Екат.), Горычка (Гродн.), Горчица (Минск.), Желчь, Земляная трава, Золототысячная трава, Золототысячникъ, Золотисычникъ (Малор.), Златотысячникъ (Вят.), Тысячникъ, Златотысячница, Золотышникъ (Ниж.), Золотникъ (Вят.), Золотникова трава, Золотуха (Курск.), Красноцвѣтникъ (Бес.), Краснянка, Нoryшникъ, Нoryшная трава, Нюхтинъ (Волын.), Сердечникъ (Гродн.), Сердушникъ (Полт.), Семисильникъ (Полт.), Центаврія (зап. Россіи), Цвинтарія (Могил.), Центурія, Цвинтурія (Кіев.), Цвинтарей (Вѣлор.), Цервенець (Гродн.), Черовникъ (Гродн.), Авранъ. Травянистое двулѣтнее растеніе изъ семейства «горечавковыхъ» (*Gentianeae* Juss.), распространенное въ средней Европѣ, въ сѣверной, средней и юго-западной Россіи. Стебель прямостоящій, наверху вѣтвистый, вышиною 3—7 вершк.; нижніе листья собраны розеткой, продолговато-обратно-яйцевидные, тупые съ 5 жилками; верхніе листья ланцетные или линейно-ланцетные; ярко-розовые цвѣты въ полузонтикахъ; чашечка трубчатая, 5-раздѣльная; вѣнчикъ съ длинною, тонкою трубкой и скученнымъ въ почкосложеніи 5-тираздѣльнымъ отгибомъ. Тычинки—выдающіяся изъ трубочки вѣнчика, послѣ цвѣтенія скученныя; столбикъ удлиненный, нитевидный съ двулопастнымъ рыльцемъ; плодъ—коробочка, отъ вдающихся внутрь сѣмяносецъ почти двугнѣздная, двустворчатая, многосѣмянная. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на поляхъ, степяхъ и холмахъ. (Табл. XVI, фиг. 89.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Золототысячникъ составляетъ обыкновенное домашнее средство, употребляемое отъ перемежающейся лихорадки и при слабомъ пищевареніи. Онъ содержитъ въ себѣ горькія вещества и по своему дѣйствію имѣетъ сходство съ генціаной, дѣйствуетъ только слабѣе ея. Въ народной медицинѣ отваръ золототысячника употребляется еще и отъ грудной боли, отъ золотухи и отъ чахотки.

Женщинамъ деревенскія повитухи даютъ отваръ травы во время родовъ для усиленія болей. Отваръ готовится, какъ чай. Горсть сушеныхъ цвѣтовъ заваривается стаканомъ кипятка, и такой отваръ принимаютъ по чашкѣ 1—2 раза въ день. Трава и цвѣты этого растенія входятъ въ составъ горькихъ настоевъ и элексировъ.

Въ вѣтѣринарной медицинѣ золототысячникъ употребляется въ тѣхъ-же случаяхъ, какъ и генциана.

Золотохвостъ, см. Дрокъ красильный (*Genista tinctoria* L.).

Золотохвостъ, см. Утесникъ обыкновенный (*Ulex europaeus* L.).

Золоточникъ, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).

Золотоцвѣтъ, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Золотой корень, см. Кудри царскія (*Lilium Martagon* L.).

Золотой цвѣтъ, см. Поповникъ (*Chrysanthemum* Dc.).

Золотая вѣтка, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).

Золотая лоза, см. Желтуха (*Senecio Jacobea* L.).

Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.). Фармацевтическое названіе *Virgaurea s: Consolida serracensis* (Herba.). Блошникъ (Мог.), Винокуръ (Нижег.), Воронецъ (Кост.), Грабли (Мог.), Желтоцвѣтъ (Костр.), Желтый цвѣтъ (Тв.), Желтуха (Олон.), Желтокрузь (Мог.), Жовтобрюхъ (Кіев.), Желтушникъ-чаекъ (Тв., Ост., Пун.), Живительная трава (Перм.), Желтзнянка боровая (Вят.), Заячій пухъ (Уф.), Заячьи уши (Костр.), Звѣробой (Моск.), Звѣробой боровой, Золотая вѣтка, Золотое перо (Тв.), Золотарникъ (Дв.), Золотень, Золоточникъ, Золотушникъ, Золотуха (Укр.), Костовязъ (Пет.), Красуха (Пск.), Куница (Олон.), Куникъ (Могил.), Листопадная (Волог.), Медовикъ, Перестрѣль (Гродн.), Полетуша (Могил.), Пустоцвѣтъ (Костр.), Пуховка (Вят.), Боровой глуховикъ (Влад.), Расходникъ (Вор.), Разстрѣльная (Ниж.), Розга (Мог.), Сумникъ (Минск.), Стрѣльникъ (Гродн.), Смертьельникъ (Пск.), Суданоръ (Ворон.), Табака лѣсная (Гродн.), Трава черная (Уф.), Угалникъ (Мог.), Глухая цыкорія, Дикая цыкорія (Минск.), Цвѣточникъ (Тул.). Травянистое многолѣтнее растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное по всей Европѣ и весьма обыкновенное въ Россіи. Стебель прямостоящій, вышиною 1—1½ арш. Прикорневые листья черешковые, обратно-яйцевидные, стеблевые суженные въ короткій черешокъ, ланцетовидные, по краямъ съ рѣдкими зубцами. Корзинки цвѣтовъ собраны на верхушкѣ стебля удлиненной, узкой метелкой; язычковые женскіе цвѣты большей частью въ числѣ восьми и трубчатые. золотисто-желтаго цвѣта. Тычинокъ 5; пыльники сданы въ трубочку, черезъ которую проходитъ столбикъ; лопасти послѣдняго весьма длинныя и тупыя. Плодъ—цилиндрическія, ребристыя сѣмянки съ летучкою изъ одного ряда волосковъ. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ въ лѣсахъ, между кустарниками и на поляхъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ этого растенія въ прежнее время

было очень распространено. Врачи давали его от каменной болѣзни, какъ отличное мочегонное средство; кромѣ того, его давали отъ поносовъ, снаружи его прикладывали на раны. Теперь въ врачебной практикѣ средство это почти оставлено, но въ народной медицинѣ его очень часто употребляютъ также отъ каменной болѣзни, кромѣ того, отъ чахотки, отъ кровавой мочи, отъ водянки, отъ язвъ въ гортани и отъ поврежденій наружныхъ тканей.

Изъ сушеной травы дѣлають отваръ, наливая на 1—2 щепотки травы 16 столовыхъ ложекъ (одинъ стаканъ) кипятка, и принимаютъ черезъ часъ или черезъ 2 часа по столовой ложкѣ; или же 2—3 драхмы (4—5 граммъ) травы настаиваютъ на бутылкѣ бѣлаго вина, которое и принимаютъ такъ-же. При поносахъ изъ воднаго отвара дѣлають клистиры. Снаружи толченая трава прикладывается на пылготныя раны.

Для укрѣпленія шатающихся зубовъ и при слабости и кровоточивости десенъ жуютъ свѣжую траву или отваромъ изъ травы полощатъ ротъ.

Въ ветеринарной народной медицинѣ растение это дается отъ поноса и при задержкѣ мочеиспусканія. Для этого отвариваютъ 2 горсти растенія въ бутылкѣ воды, пока вода не выкипитъ до половины, и такой decoctъ вливаютъ понемногу въ поило животнымъ.

Золотая трава, см. Солнечникъ обыкновенный (*Helianthemum vulgare* Gärtn.).

Золотая трава, см. Крестовникъ обыкновенный (*Senecio vulgaris* L.).

Золотая трава, см. Василистникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).

Золотое перо, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).

Золотуха, см. Василистникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).

Золотуха, см. Золототысячникъ обыкновенный (*Erythraea Centaurium* L.).

Золотуха, см. Сушеница лѣсная (*Gnaphalium silvaticum* L.).

Золотуха, см. Цминъ (*Helychrisum arenarium* Dc.).

Золотуха, см. Желтуха (*Senecio Jacobea* L.).

Золотуха, см. Пасленъ сладко-горькій (*Solanum dulcamara* L.).

Золотуха, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).

Золотуха, см. Василистникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).

Золотуха, см. Аютины глазки (*Viola tricolor* L.).

Золотуха желтая, см. Василистникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).

Золотушечникъ, см. Василистникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).

Золотушная трава, см. Череда трехраздѣльная (*Bidens tripartita* L.).

Золотушная трава, см. Чернокорень обыкновенный (*Cynoglossum officinale* L.).

Золотушная трава, см. Жабникъ пашенный (*Filago arvensis* L.).

Золотушная трава, см. Кульбаба осенняя (*Leontodon autumnalis* L.).

Золотушная трава, см. Иванъ да Марья (*Melampyrum nemorosum* L.).

Золотушная трава, см. Погремокъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista Galli* L.).

Золотушная трава, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Золотушникъ, см. Цминтъ (*Helichrisum arenarium* DC.).

Золотушникъ, см. Буквица обыкновенная (*Betonica vulgaris* L.).

Золотушникъ, см. Девясилъ британскій (*Inula britannica* L.).

Золотушникъ, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).

Золотушникъ, см. Василѣстникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).

Золотушникъ мужской, см. Цминтъ (*Helichrisum arenarium* DC.).

Золотчискъ, см. Герань болотная (*Geranium palustre* L.).

Золотышникъ, см. Золототысячникъ обыкновенный (*Erythraea Centaurium* L.).

Золотянка, см. Селезеночникъ очереднолистный (*Chrysosplenium alternifolium* L.).

Зольная трава, см. Язвенникъ обыкн. (*Anthyllis Vulneraria* L.).

Зольникъ, см. Язвенникъ обыкновенный (*Anthyllis Vulneraria* L.).

Зольникъ, см. Зольникъ калийный (*Salsola Kali* L.).

Зольникъ калийный (*Salsola Kali* L.). Верблюжья трава, Верблюжье сѣно, Зольникъ, Камчакъ, Камочка, Качимъ, Каравикъ, Катунъ, Покатунъ, Покатичникъ, Катиполь, Перекатиполе (Малор.), Колючка (южн. Росс.), Колюка, Уколюка (Курск.), Курай, Курапка, Мыльная трава, Киргизское мыло, Потапникъ, Соленая трава, Солянка, Сарыбаракъ. Однолѣтнее травянистое растение съ жесткими, шиловидными, спирально-расположенными листьями, вышиною 3—7 вершк., изъ семейства «солончаковыхъ» (*Chenopodiaceae* Vent.), распространенное почти во всей Европѣ, въ средней и южной Россіи, въ Туркестанѣ и въ Сибири. Стебель вѣтвистый, гладкій или покрытый волосками; вѣтки растопыренныя; листья съ крѣпкимъ колючимъ остроконеціемъ; цвѣтки пазушные, одиночныя, съ 2 колючими придѣлками. Цвѣтки обоеполовые. Околоцвѣтникъ болѣе или менѣе 5-тираздѣльный, при плодахъ внизу хрящеватый, наверху перепончатый. Доли его—или съ короткими, малоразвитыми, или съ обратно-яйцевидными и полукруглыми бѣловатыми или красноватыми перепончатыми крыльями. Тычинокъ 5, прикреплennыхъ къ кольцообразному подстѣбичному диску; столбиковъ 2, съ длинными, нитевидными рыльцами. Плодъ—сжатая немного сверху сѣмянка. Сѣмя горизонтальное, безбѣлковое. Зародышъ свернутъ въ винтообразной спирали. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на песчаныхъ мѣстахъ и солончакахъ. Зола растения даетъ чистую соду и употребляется киргизами для приготовления мыла. (Рис. 85.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ ничтожно. Въ Самарской губерніи растение употребляется отъ колоты въ бокахъ.

Зольное зелье, см. Язвенникъ обыкн. (*Anthyllis Vulneraria* L.).

Зопникъ, см. Запникъ клубнепосный (*Phlomis tuberosa* L.).

Зорка, см. Гвоздика (*Dianthus* L.).

Зорни, см. Гвоздика (*Dianthus L.*).

Зорница, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris Mill.*).

Зорница, см. Гречиха птичья (*Polygonum aviculare L.*).

Зорочникъ, см. Звѣздчатка большая (*Stellaria Holostea L.*).

Зоры,

Зорыпъка, } см. Гвоздика (*Dianthus L.*).

Зорька,

Зоря, см. Зоря садовая (*Levisticum officinale Koch.*).

Зоря дикая, см. Василистникъ желтый (*Thalictrum flavum L.*).

Зоря дикая полевая, см. Дигиль лѣсной (*Angelica silvestris L.*).

Зоря луговая, см. Лютикъ ѣдкій (*Ranunculus acer L.*).

Зоря луговая, см. Лютикъ ползучій (*Ranunculus repens L.*).

Зоря нѣмецкая, см. Зоря садовая (*Levisticum officinale Koch.*).

Зоря садовая (*Levisticum officinale Koch.*, sin. *Ligusticum Levisticum L.*). Фармацевтическое названіе *Levisticum* s. *Ligusticum*, s. *Laserpitium germanicum* (Radix.). Дудочникъ, Дудчатая трава, Заборина, Зоря (въ большей части Россіи), Зоря нѣмецкая, Любистокъ (въ большей части В. Россіи и Малор.), Любистикъ (Екат.), Любистикъ (Малор.), Любиста (Малор., Вѣлор.), Любистра (Курск.), Любимъ (Смол.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «зонтичныхъ» (*Umbelliferae Juss.*), распространенное въ южной Европѣ, встрѣчается иногда одичалымъ на югѣ Россіи. Стебель высокій, вѣтвистый наверху, круглый; листья блестящіе, однажды или двойко-перистые, съ крупными, обратно-яйцевидно-клиновидными ромбическими, немного надрѣзанными-зубчатыми сегментами. Цвѣты расположены на концахъ вѣтвей, образую зонтичное соцвѣтіе желтовато-зеленаго цвѣта. Чашечка 5-тираздѣльная. Вѣнчикъ 5-тираздѣльный, лепестки округлые, съ загнутой верхушкой. Тычинокъ 5; столбиковъ 2. Плодъ овальный, сжатый со стороны спинки сѣмянокъ. Цвѣтеетъ съ іюня, созрѣваетъ въ сентябрѣ. Разводится въ садахъ отъ сѣмянъ или черезъ разсадку корней. Сѣмена должны быть заставляемы тотчасъ по созрѣваніи. Въ Германіи ими заставляютъ иногда даже цѣлыя поля. Для употребленія собираются корни на 3-й годъ послѣ посѣва, осенью или рано весною, листья въ маѣ и въ іюнѣ, а сѣмена въ сентябрѣ. Корень мясистый, снаружи желтобурый, внутри бѣлый, при разрѣзываніи въ свѣжемъ состояніи даетъ желтоватый смолистый сокъ. Всѣ части растенія издаютъ острый запахъ, въ особенности корень и сѣмена. Послѣдніе употребляются въ медицинѣ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Растеніе это очень распространено въ народной медицинѣ. Отваръ корня дѣйствуетъ возбуждающимъ образомъ на почки, вызываетъ усиленное отдѣленіе мочи, потому употребляется при водянкѣ; кромѣ того, зорный корень рекомендуется отъ нервныхъ болѣзней и истеріи, отъ женскихъ болѣзней и отъ неправильныхъ мѣсячныхъ очищеній. Повивальныя бабки прежде держали этотъ корень въ большомъ секретѣ и давали его ослабѣвшимъ роженицамъ въ трудныхъ ро-

дахъ. Отваръ зорной травы въ водѣ или въ винѣ утоляетъ боли въ животѣ; отъ перваго разстройства и истерикъ зорную траву даютъ въ порошокъ.

Зорный корень и сѣмена настанваютъ на водкѣ и употребляютъ по рюмкѣ передъ ѣдой. Настойкѣ приписываютъ свойство уменьшать боли въ животѣ, укрѣплять слабый желудокъ и действовать вѣтрогонно. Эта настойка вызываетъ, кромѣ того, отхожденіе глистовъ. Зорная палочка употребляется также при лихорадкахъ и истерическихъ припадкахъ.

Водный отваръ зорнаго корня готовится изъ двухъ драхмъ (4-хъ граммъ) толченаго корня, который заливаютъ стаканомъ кипятка, даютъ настояться, процеживаютъ и принимаютъ черезъ 2 часа по столовой ложкѣ. Изъ свѣжей травы выжимаютъ сокъ, который принимается отъ одной до двухъ столовыхъ ложекъ заразъ. Сѣмена растений толкутся и принимаются въ порошокъ по 5-ти или 10-ти гранъ (0.4—0.8 граммъ) на прѣмъ. Листья растенія служатъ для наружнаго употребленія, для ваннъ, припарокъ и промывательныхъ.

Въ деревняхъ дѣти ѣдятъ молодые стволы растенія, отчего у нихъ отходятъ глисты. Въ Малороссіи дѣвушки пьютъ отваромъ зорнаго корня молодыхъ парней, такъ какъ считается, что корень этотъ служитъ «приворотнымъ зельемъ», откуда, вѣроятно, и названіе его «любимъ» или «любиста».

Въ ветеринарной медицинѣ зорный корень употребляется при длительныхъ катаррахъ кишекъ, при водянкѣ, при воспаленіи легкихъ, также отъ глистовъ. Лошадямъ даютъ отъ 1-го до 2-хъ унцъ (30—60 граммъ) корня въ формѣ пилюль, кашки или въ отварѣ: рогатому скоту—отъ 2-хъ унцъ до 4-хъ (60 до 120 граммъ), свиньямъ—отъ 2—4-хъ драхмъ (3—10 граммъ). Къ отвару прибавляютъ мяту, камфору или скипидаръ. Зорное сѣмя считается болѣе сильно дѣйствующимъ средствомъ, чѣмъ корень.

Зостера морская (*Zostera marina* L.). Морская трава. Многолѣтняя трава съ ползучимъ и приподнимающимся, вполнѣ погруженнымъ въ воду стеблемъ длиною 1½ арш., изъ семейства «наядовыхъ» (*Najadaceae*). Листья очередные, длинные, линейныестрежхервные, при основаніи влагалищные. Однополые цвѣты, лишенные околоцвѣтника, расположенные на внутренней сторонѣ плоской оси соцвѣтія, обхваченнаго влагалищемъ листа. Тычиночный цвѣтокъ заключаетъ всего 1 тычинку, а пестичный—1 плодникъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Произрастаетъ почти повсюду на песчаномъ днѣ морей и выбрасывается въ большомъ количествѣ на берегъ волнами; въ высушенномъ видѣ трава служитъ для набивки матрацовъ и мебели. (Рис. 86.)

Застиль, см. Крушина слабительная (*Rhamnus cathartica* L.).

Зрадникъ,
Зрочникъ,
Зрядникъ, } см. Шпажникъ обыкновенный (*Gladiolus communis* L.).

Зрядникъ, см. Шпажникъ черепичатый (*Gladiolus imbricatus* L.).

Зуби, см. Губазовка обыкновенная (*Neottia nida* Avis Rich.).

Зубникъ, см. Бѣлена черная (*Hyosclamus niger* L.).

Зубникъ, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).

Зубница, см. Зубница луковичная (*Dentaria bulbifera* L.).

Зубница луковичная (*Dentaria bulbifera* L.). Фармацевтическое названіе *Dentaria minor* s. *antidysenterica*. Бабын зубы, Зубянка, Зубница, Живецъ, Жибецъ. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ, въ западной Россіи, на Кавказѣ, въ южной Финляндіи и Бессарабіи. Стебель вышиною 10—15 верш., съ многочисленными очередными листьями, въ пазухахъ которыхъ сидятъ луковички чернаго цвѣта; нижніе листья перисто-разсѣченные, верхніе цѣльные. Цвѣты крупныя, розовыя или блѣдно-лиловыя. Чашечка изъ 2 паръ опадающихъ листочковъ; вѣнчикъ изъ 4 лепестковъ, расположенныхъ на-крестъ. Тычинокъ 6, пестикъ состоитъ изъ 2 плодolistиковъ и раздѣленъ пластинчатымъ сѣмяноскоемъ на 2 гнѣзда. Плодъ—линейный, сплюснутый стручекъ. Растеніе размножается луковичками. Это растеніе довольно рѣдко приносить вполне развитыя, зрѣлыя плоды. Цвѣтетъ весною. Встрѣчается въ тѣнистыхъ лѣсахъ.

Зубница перистая (*Dentaria pinnata* Lmk.). Растеніе травянистое, многолѣтнее, изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), распространенное въ горныхъ лѣсахъ южной Германіи. Стебель несетъ отъ 3—5 поодинокъ перисто-разсѣченныхъ листьевъ. Цвѣты бѣлыя или блѣдно-лиловыя. Плодъ—широко линейные стручки. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ.

Зубной корень, см. Бедренецъ обыкновенный (*Pimpinella saxifraga* L.).

Зубная трава (*Anthemis pirethrum* L. sin. *Anacyclus pirethrum* DC.). Слюнистая трава. Растеніе родомъ изъ Азіи и сѣв. Африки. Корень его употребляется отъ зубной боли.

Зубная трава, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Зубная трава, см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.).

Зубная трава, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).

Зубовникъ, см. Вахта трилистная (*Menyanthes trifoliata* L.).

Зубошекъ, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).

Зубрій, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).

Зубриловка, см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca* L.).

Зубровая, см. Иванъ да Марья (*Melampyrum nemorosum* L.).

Зубровая трава, см. Вехъ ядовитый (*Cicuta virosa* L.).

Зубцаста, см. Чертополохъ огородный (*Cirsium oleraceum* All.).

Зубчатая большая трава, см. Василекъ перистый (*Centaurea Scabiosa* L.).

Зубчатка, см. Колокольчикъ сборный или приточная трава (*Campanula glomerata* L.).

Зубчатка, см. Дубровка (*Veronica Chamaedrys* L.).

Зубъ, см. Цминъ (*Helychrisum aeneum* De.).

Зубъ-зелье, см. Смолевка повислая (*Silene nutans* L.).

Зубъ-львиный, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).

Зубъ собачій, } см. Собачій зубъ (*Erythronium Dens Canis* L.).

Зубъ трава.

Зубы волчьи, см. Орлякъ обыкновенный (*Pteris aquilina* L.).

Зубянка, см. Зубница луковичная (*Dentaria bulbifera* L.).

Зузулька, см. Настурция (*Tropaeolus majus* L.).

Зыбрь, см. Чертополохъ разнолистный (*Cirsium heterophyllum* All.).

Зѣвъ львиный, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

Зѣноватъ, см. Дрокъ красильный (*Genista tinctoria* L.).

Зѣновка, см. Душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.).

Зюзикъ,

Зюзникъ, } см. Зюзникъ европейскій (*Lycopus europaeus* L.).

Зюзникъ европейскій (*Lycopus europaeus* L.). Фармацевтическое название *Marrubium aquaticum* (Herba). Драголюбъ (Малор.) Жура (Орд.), Зюзикъ, Зюзникъ (Малор.), Конопель лѣсной (Волын.), Крапива болотная (Вят.), Крапчатка (Пет.), Дикій маточникъ, Волчья нога, Лапа волчья, Чистецъ, Сердечная трава, Шандра водяная. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель вышиною отъ $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ арш., 4-хгранный, простой или вѣтвистый. Листья коротко-черешковые, продолговато-яйцевидные, крупно-зубчатые, при основаніи почти перисто-раздѣльные. Бѣлые цвѣтки съ пурпуровыми точками сидятъ въ пазухахъ листьевъ удаленными другъ отъ друга мутовками. Чашечка колокольчатая, приблизительно до середины 5-тизубчатая; вѣнчикъ колокольчатый, нежного превышающій чашечку 4-хлопастный. Тычинокъ всего 2; заднія 2 обыкновенно нитевидныя, недоразвитыя, безъ пыльниковъ. Плодъ распадается на 4 къ основанію суженныхъ, наверху тупыхъ, сжатыхъ, снабженныхъ утолщеннымъ краемъ, орѣшка. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на сырыхъ лугахъ, по канавамъ и по берегамъ. (Рис. 87.)

Медицинское употребленіе. Въ медицинѣ совсѣмъ не употребляется. Въ народѣ, въ нѣкоторыхъ губернныхъ изрѣдка употребляется отъ простого и отъ кроваваго поноса.

Зяблица, см. Василистникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).

Зяблица, см. Горошекъ мышиный (*Vicia cracca* L.).

Зяблица, см. Горошекъ заборный (*Vicia sepium* L.).

Зяблица, см. Вика (*Vicia sativa* L.).

Зяберъ, см. Медовникъ (*Galeopsis Tetrahit* L.).

Зяберъ, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).

Зябиль, см. Медовникъ (*Galeopsis Tetrahit* L.).

Зябиль мелкоцвѣтный, см. Медовникъ (*Galeopsis Tetrahit* L.).

Зябра (*Galeopsis versicolor* Curt.), Бабе кадило (Ползе.), Собачьи конопли (Малор.), Медовникъ (Малор.), Медунца (Арх.), Меду-

ничникъ (Яросл., Курск.), Пикушки (Ник., Волог.). Пѣтушки (Ник., Волог.), Свиная трава (Нижег.). Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiales* Juss.), распространенное въ ср. Европѣ, въ сѣв., средн., юго-западной Россіи и на Кавказѣ. Стебель вышиною иногда до $2\frac{1}{4}$ аршинъ прямостоящій, вѣтвистый, жестко-волосый, подъ узлами утолщенный. Листья продолговато-яйцевидные, заостренные, зубчатые. Вѣтчикъ 5-тилопастный, крупный, желтый, средняя лопасть нижней губы фиолетовая; трубочка вѣтчика вдвое длиннѣ чашечки, верхняя губа вогнутая ввидѣ шлема. Тычинки двусильныя, параллельныя подъ верхней губой. Завязь 4-лопастная, съ однимъ столбикомъ, оканчивающимся двураздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ распадается на 4 орѣшка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на поляхъ, на сорныхъ мѣстахъ, около дорогъ и между кустарниками.

Зябра полевая, см. Чистецъ болотный (*Stachys palustris* L.).

Зябрей, см. Чистецъ однолѣтній (*Stachys annua* L.).

З зюлька, см. Кукушкины слезки (*Orchis maculata* L.).

Зязюля сѣренькая, см. Кукунникъ (*Gymnadenia conopsea* Rich.).

И.

Иама, см. Иньяма (*Dioscorea alata* L.).

Ибунка, см. Вероника ключевая (*Veronica Anagallis* L.).

Ибунка, см. Вероника ручейная (*Veronica Beccabunga* L.).

Ива, см. Параличная трава (*Ajuga Chia Poir.*).

Ива, см. Ива козья (*Salix caprea* L.).

Ива, см. Ива ломкая (*Salix fragilis* L.).

Ива, см. Лоза, Ива корзиночная (*Salix viminalis* L.).

Ива, см. Дрошникъ тонкій (*Spartium junceum* L.).

Ива бѣлая (*Salix alba* L.) Верб. Верб. бѣлая, Бѣла Верб. (Малор.). Ветла, Ветловникъ. Ветла (Малор.). Ветла бѣлая, Ива, Обыкновен. бѣлая ива (Щегл.), Лоза, Чернополоза (Хар.), Бѣла лоза (Малор.), Осокорь (Уф.), Ракига (Малор.), Черногаль (Астрах.), Тальникъ (Сарат.), Тамина, Таловое дерево (Кам. Приарг. край), Таль. Большое дерево изъ семейства «ивовыхъ» (*Salicaceae* Rich.), съ перистые-строй или бѣловатой листвою и зеленовато-сѣрыми молодыми побѣгами; распространенное почти повсемѣстно въ Европѣ и въ Россіи. Листья ланцетовидные, длинно-заостренные, мелко-пильчатые, снизу сѣроватые, покрытые съ обѣихъ сторонъ шелковистыми волосками; прилистники ланцетные. Черешокъ наверху снабженъ 1—2 железками. Цвѣтки однополые, двудомные, одиночные въ углахъ кроющихъ прицвѣтниковъ, собранные колосьями, развивающимися изъ прошлогоднихъ почекъ. Тычинокъ 2, свободныхъ, реже сросшихся между собою нитями. Пестикъ состоитъ изъ 2-хъ плодolistиковъ, образующихъ одногнѣздную верхнюю завязь съ 2 стѣнчатыми сѣмя-

посадки. Посадками многочисленныя сѣмяночки, и съ короткимъ столбикомъ, раздѣляющагося на 2 тѣхъ зачатыхъ рыльца. Плодь—двустворчатая коробочка на короткой ножкѣ, съ мелкими бѣловатыми сѣменами и пучкомъ волосковъ при основаніи. Растетъ на влажныхъ мѣстахъ, по берегамъ рѣкъ и около дорогъ. Цвѣтетъ весной. Древесина легкая и очень вязкая, употребляется на выдѣлываніе дугъ, корытъ, кадокъ и проч.; гибкія и тонкія вѣтви пригодны для плетенія корзинъ. Въ садахъ часто разводится верба золотая (*Salix vitellina* L.) съ золотисто-желтыми вѣтвями, разновидность ивы бѣлой (*Salix alba* L.). (Рис. 88.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ коры бѣлой ивы и другихъ ея видовъ основано на ея вяжущихъ свойствахъ. Вънутрь водный отваръ ивы употребляется рѣдко и то въ народной медицинѣ; чаще отваромъ ивовой коры обмываютъ плохо заростающія гнойныя раны, дѣлаютъ спринцеванія, обмываютъ пролежни; дѣтей, страдающихъ слабостью въ ногахъ, купаютъ въ отварѣ ивы. Животнымъ отваръ ивовой коры дается въ тѣхъ-же случаяхъ.

Въ народѣ кора ивы замѣняетъ хину и дается внутрь отъ перемежающейся лихорадки. Берутъ зеленую кору и высушиваютъ ее. Для приема внутрь дѣлаютъ отваръ изъ 2-хъ унцій (60 граммъ) толченой сушеной коры, которую заливаютъ 2-мя фунтами (24 унцій=720 гр.) воды и кипятятъ, пока не останется $\frac{2}{3}$ жидкости (16 унцій). Принимаютъ по столовой ложкѣ черезъ 2 часа.

Ива гибкая, см. Лоза. Ива корзиночная (*Salix viminalis* L.)

Ива козья (*Salix caprea* L.). Бредина. Бреднякъ (Твер.). Верба (Мог.), Верба козья, Верболозь (Мал. и Зап.), Ива (Укр. и Бел. ч. Росс.), Ива пальмовая, Ива (Малор.). Ивика (Кіев.), Ивина (Зап. Рос.), Лоза (Гродн.), Красная лоза (Яросл.), Лозина (Ворон.), Тала (Вор.), Таль, Таловый кустъ (Тамб.), Ракита-бредина. Высокій кустарникъ или дерево, выш. 3 $\frac{1}{2}$ саж., изъ семейства ивовыхъ (*Salicaceae* Rich.), распространенный почти во всей Европѣ и Россіи. Молодыя вѣтви черноватыя, пушистыя, двудѣтныя—красновато-бурыя; листья эллиптическіе или продолговатые, часто съ загнутой верхушкой, городчато-пильчатые, молодые—бѣловатойлочные, а старыя—сверху голыя, съ нижней стороны сѣроватойлочные; прилистники широкіе почковидные; цвѣтки однополые, двудомные, въ сережкахъ или колоскахъ, сидящихъ на короткой вѣточкѣ, густые, сидячіе, цвѣтущіе до появленія листьевъ, мужскіе — продолговатые, женскіе — цилиндрическіе; прицвѣтнички спереди буроватые мохнатыя; ось сережки и цвѣтоножки пушистыя; цвѣты вмѣсто околоцвѣтника снабжены 2-мя железками; тычинокъ 2, лимонно-желтаго цвѣта. Плодь—коробочка, шиловидная, войлочная, съ весьма короткимъ столбикомъ, заканчивающимся 2-мя двураздѣльными, продолговатымицевидными рыльцами. Растетъ въ лѣсахъ, между кустарниками и по берегамъ рѣкъ. Цвѣтетъ ранней весной. Молодыя вѣтви употребляются въ насѣ при богослуженіи въ Вербное воскресенье. Во время цвѣтенія тычиночныя сережки издають сильный медовый запахъ, привлекающій пчелъ.

Ива корзиночная, см. Лоза (*Salix viminalis* L.).

Ива красная, см. Ива миндальная (*Salix amygdalina* L.).

Ива лозная, см. Лоза, ива корзиночная (*Salix viminalis* L.).

Ива ломкая (*Salix fragilis* L.). Верба (въ б. ч. Росс.), Ломка верба (Мал.), Ветла, Ива (Ряз.), Ивина (Пск.), Раки́та (Орл., Тар.). Высокое дерево или кустарникъ изъ семейства «ивовыхъ» (*Salicineae* Rich.), съ весьма хрупкими вѣтвями, особенно при сочлененіяхъ, распространенное почти во всей Европѣ и въ Россіи. Листья ланцетовидные, по краямъ съ шиповидными, загнутыми внутрь, зубцами; старые—голые, молодые—немного шелковисто-пушистые; прилистники полусердцевидные; черешки наверху съ 1—2 железками; вѣточки, несущія сережки цвѣтовъ, съ цѣлюкрайними листьями. Цвѣтки однополые, двудомные, собранные сережками въ углахъ кроющихъ прицвѣтниковъ; послѣдніе — обратнойцевидные, спереди длинноволосистые; тычинокъ 2; завязь одногнѣздная, верхняя, съ короткимъ столбикомъ, заканчивающимся 2-мя двураздѣльными рыльцами. Плодъ—двустворчатая коробочка на ножкѣ, которая въ 2—3 раза длиннѣ задней железки. Растетъ на влажныхъ мѣстахъ при берегахъ. Цвѣтетъ весною. (Табл. XVI, фиг. 90.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ ломкой ивы (*Salix fragilis*) то-же, что и бѣлой ивы. Отваръ ея замѣняетъ отваръ хинной коры и принимается при перемежающейся лихорадкѣ, при хроническихъ поносахъ и отъ глистовъ. Снаружи свѣжіе толченые листья ивы прикладываются къ застарѣлымъ язвамъ. Изъ отвара корки дѣлаютъ при поносахъ клистиры. Для этого смѣшиваютъ отваръ коры съ отваромъ ромашки. Количество употребляемой коры для отвара то-же, что и коры бѣлой ивы.

Ива миндальная (*Salix amygdalina* L.). Бѣлоталь, Бѣлолозь (Астр.), Бѣлоталь (Укр., Черн.), Влотъяль (Сред.), Красноталь (Даль), Тала (Укр., Черняевъ), Тальникъ (Нижег.), Верба (Собол.), Ветла (Собол., Тв.), Лоза (Мог.), Лозина (Тамб.), Красная лоза (Харьк.), Красная ива (Владим.), Ломашникъ (Нов., Оск.). Высокій кустарникъ или дерево, выш. 1½—2 саж., изъ семейства «ивовыхъ» (*Salicineae* Rich.) распространенное почти по всей Европѣ и Россіи. Вѣтви съ красно-бурою корой, листья ланцетовидные, острые, нильчатые, голые, сверху зеленые, снизу блѣдно-зеленые или сизые; прилистники полусердцевидные, вѣтви однополые, двудомные, въ длинныхъ, густыхъ сережкахъ. Прицвѣтники при основаніи немного мохнаты. Тычинокъ 3; столбикъ короткий, съ 2-мя двураздѣльными рыльцами; плодъ—яйцевидноконическая коробочка съ довольно длинной ножкой. Растетъ на влажныхъ мѣстахъ, въ лѣсахъ, между кустарниками и по берегамъ рѣкъ. Цвѣтетъ весной. Вслѣдствіе сильнаго развитія корневой системы, состоящей изъ густаго сплетенія корней, ива миндальная, или бѣлоталь, употребляется для укрѣпленія береговъ; изъ прутьевъ плетутъ разныя вещи. (Рис. 89.)

Ива пальмовая, см. Ива козья (*Salix caprea* L.).

Ива плакучая (*Salix babylonica* L.). Агновы вѣтви, Иерусалим-

ская верба (Сл. Ц.). Дерево изъ семейства «ивовыхъ» (*Salicineae* Rich.), родомъ изъ Зап. Азіи, Туркестана и Японіи, съ длинными повислыми вѣтвями. Листья линейно-ланцетные, длинно и немного косо-заостренные, мелко-пильчатые, снизу сѣроватые; прилистники ланцетошиловидные; прицвѣтники при основаніи пушистые, цвѣты однополые, одноподомные, въ сережкахъ. Тычинокъ 2; завязь верхняя, однопѣздная, съ короткимъ столбикомъ, заканчивающимся 2 двураздѣльными рыльцами. Плодъ—двустворчатая коробочка на ножкѣ, которая короче железки, находящейся на пестичныхъ, т. е., железныхъ цвѣткахъ. Разводится иногда въ садахъ и на кладбищахъ. Цвѣтетъ весною.

Ива плетневая, см. Лоза, ива корзиночная (*Salix viminalis* L.).

Ива ползучая (*Salix repens* L.). Ицелозъ (Малороссія), Ракитникъ (Тамб.), Волосистый тальникъ. Низкій ползучій кустарникъ, выш. 7—10 верш., изъ семейства «ивовыхъ» (*Salicineae* Rich.), распространенный въ сѣв. и средн. Европѣ и почти по всей Россіи (на югѣ встрѣчается рѣже), съ дугобразно-приподнимающимися вѣтвями. Листья линейно-ланцетные, цѣльно-крайніе, или съ рѣдкими зазубринами, снизу покрыты шелковисто-бѣлыми волосками; прилистники ланцетные. Обоюдополовые одноподомные цвѣтки въ пяти сидячихъ, густыхъ, сначала почти округлыхъ, потомъ овальныхъ сережкахъ. Прицвѣтники спереди черноватые, пушистые. Плодъ—яйцевидно-коническая серебристо-пушистая коробочка на ножкѣ, которая въ 2—3 раза длиннѣе железки, находящейся на женскихъ пестичныхъ цвѣткахъ, и съ короткимъ столбикомъ, заканчивающимся яйцевидными двудопастными рыльцами. Растетъ на влажныхъ, песчаныхъ мѣстахъ и на болотахъ. Цвѣтетъ весною. (Рис. 90.)

Ива сѣтчато-нервная (*Salix reticulata* L.). Сильно вѣтвистый приземистый кустарничекъ, выш. не болѣе 3 верш., изъ семейства «ивовыхъ» (*Salicineae* Rich.), съ лежащими распростертыми въ ямки, распространенный въ сѣв. и средней Европѣ, въ Россіи встрѣчающійся на крайнемъ сѣверѣ и въ Сибири. Листья длинно-черешковые, округлые или обратно-яйцевидные, цѣльно-крайніе, въ длину и ширину около $\frac{1}{2}$ вершк., сверху голые, морщинистые, снизу пушистые или голые съ рѣзко выступающей сѣткою жилокъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. (Рис. 91.)

Ива-трава, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Ива ушастая (*Salix aurita* L.). Ветла, Верба-ушатка, Лоза (въ бол. ч. губ.), Ракита, Ракитникъ (Пет.), Тальникъ, Бѣлоталь (Ниж.). Очень вѣтвистый кустарникъ, выш. до 1—1½ саж., изъ семейства «ивовыхъ» (*Salicineae* Rich.), распространенный въ сѣв., средн. и юго-западной Россіи, на Кавказѣ и въ Сибири. Листья мелкіе, обратно-яйцевидные, морщинистые, цѣльно-крайніе или выемчато-шиловидные, волнистые, сверху голые или слегка пушистые, снизу сѣро-войлочные; прилистники крупные, почковидные. Обоюдополовые одноподомные цвѣтки въ продолговатыхъ, негустыхъ, довольно маленькихъ сережкахъ на мелко-облиственныхъ вѣточкахъ; прицвѣтники спереди буроватые, немного

мохнатые; плодъ яйцевидно-коническая, шелковисто-войлочная коробочка съ очень короткимъ столбикомъ и маленькими яйцевидными выемчатыми рыльцами. Растетъ на влажныхъ лугахъ, между кустарниками и на болотахъ. Цвѣтетъ весною. Употребляется на разныя плетения и для дубленія кожъ. (Рис. 92.)

Ивалекъ, см. Пастушья-сумка (*Capsella Bursa pastoris* Moench).

Ивана св. зелье, см. Звѣробойъ обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).

Иванецъ, см. Иванъ да Марья (*Melampyrum nemorosum* L.).

Ивановедъ, см. Дрочникъ тонкій (*Spartium junceum* L.).

Иванова голова, см. Клеверъ средний (*Trifolium medium* L.).

Иванова голова, см. Колокольчикъ сборный, Приточная трава (*Campanula glomerata* L.).

Иванъ в. трава, см. Букашникъ горный (*Jasione montana* L.).

Иванова трава, см. Иванъ да Марья (*Melampyrum nemorosum* L.).

Иванова трава, см. Лютикъ ѣдкій (*Ranunculus acer* L.).

Ивановская трава, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Ивановская трава, см. Букашникъ горный (*Jasione montana* L.).

Ивановъ цвѣтъ, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Ивановъ цвѣтъ, см. Поповникъ непахучій (*Matricaria inodora* L.).

Ивановъ цвѣтъ, см. Медунца (*Spirea ulmaria* L.).

Ивановъ чай, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Ивановы головы, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Ивановы цвѣты, см. Колокольчикъ сборный, Приточная трава (*Campanula glomerata* L.).

Ивановыя гродники, см. Мелколенестникъ ѣдкій (*Erigeron acris* L.).

Иванъ-головастый, см. Романъ (*Anacyclus officinarum* Hayne.).

Иванъ да Марья, см. Аютины глазки (*Viola tricolor* L.).

Иванъ да Марья, см. Шалфей луговой (*Salvia pratensis* L.).

Иванъ да Марья, см. Ствинца лекарственная (*Parietaria officinalis* L.).

Иванъ да Марья, см. Живучка мохнатая (*Ajuga genevensis* L.).

Иванъ да Марья (*Melampyrum nemorosum* L.). Братъ и сестра (Зап. Рос.), Братъ съ сестрой (Гамб.), Братъ-сестра (Вѣлор.), Братики, Братокъ (Южн. Рос.), Братовка (Могил.), Аютины глазки (Ряз.), Братан, Быковникъ. День и ночь (Гродн.), Двучвѣтникъ (Новг.), Желтупица (Яросл. Петр.), Желтушка (Курск.), Зиновія (Курск.), Золотушная трава (Гвер. Ост. Куп.), Зубовая (Гродн.), Забрій (Вор.), Луговой Звонецъ (Минск.), Звонецъ (Гродн.), Иванецъ (Вит.), Иванова-травка (Иск.), Иванъ да Марья (Малор.), Иоакимъ и Анна (Нижег.), Адрианъ и Марія, Казюля (Кал.), Липникъ (Олон.), Медунка (Впл.), Мѣдянка (Вол.), Огнецвѣтъ (Яр.), Сухокрыла (Олон.), Сачновка (Гродн.), Скотскій корень, Мѣткая трава (Вят. Лен.), Трехцвѣтная трава (Даль), Черная пшеница, Чмельникъ (Гродн.). Травянистое однолѣтнее растение изъ семейства «горичниковыхъ» (*Scrophulariaceae* R. Br.), распространенное по всей Европѣ, Европейской Россіи и на Кавказѣ. Сте-

бель выш. 3—10 вершк., прямой и вѣтвистый; листья супротивные, съ короткими черешками, яйцевидно-ланцетные или ланцетные, заостренные. Цвѣтки въ одностороннихъ колоскахъ въ углахъ крупныхъ, сердцевидно-ланцетныхъ, фиолетовыхъ, рѣже обловатыхъ прицвѣтничковъ. Чашечка трубчато-кольчатая 4-зубчатая, немного мохнатая, съ ланцето-шиловидными, оттопыренными зубцами, доходящими до середины трубочки вѣнчика; вѣнчикъ съ цилиндрическою красновато-бурой трубочкой, желтый, съ двугубымъ отгибомъ; нижняя губа длиннѣе верхней. Тычинокъ 4, двусильныхъ, съ остроконечными при основаніи гнѣздами пыльниковъ; плодь—яйцевидная, косая, гнѣздоразрывная коробочка; гнѣзда 1—2-хѣзьянные; съмена сравнительно крупныя, продолговатыя, гладкія. Растетъ на лугахъ и между кустарниками. Цвѣтетъ лѣтомъ. Въ Курской губ. изъ растенія добываютъ желтую краску.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Листья этого растенія употребляются очень часто въ народной медицинѣ; ихъ высушиваютъ и завариваютъ, какъ чай, который пьютъ отъ золотухи и отъ другихъ сыпей. Такимъ-же отваромъ обмываютъ больныя мѣста на кожѣ и дѣлаютъ изъ него ванны.

Для внутренняго употребленія отваръ листьевъ Иванъ да Марья смѣшиваютъ съ одинаковымъ количествомъ отвара листьевъ орбнича.

Иванъ и Марья. см. Колокольчикъ сборный, Приточная трава (*Campanula glomerata* L.).

Иванъ-трава, см. Вшивица болотная (*Pedicularis palustris* L.).

Иванъ-трава, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Иванъ-трава, см. Половинникъ обыкновенный, Белоцвѣтъ (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.). Фарм. назв. *Lysimachia Chamaeperion*. Богородицына трава (Олон.). Верб-трава (съ пол.). Сорочьи глаза (Ленех.). Дятельникъ (Ряз.). Елунникъ (Арх.). Дрема (Пск.), Дремуха (Тв.), Боровое зелье (Гродн.). Ива-трава, Ивовая трава, Ивановъ чай, Чай-Иванъ (Твер.), Иванъ-трава, Ивановская трава (Олон.), Кирей (въ больш. ч. Рос.), Кирейникъ, Кирей (Ленех.), Кирей (Кал.), Коныль трава (Приаргун. гр.), Конопка, Конопскій чай (отъ села Конопья въ П-терб. губ.), Курильскій чай, Дикая конопля, Красный цвѣтъ (Тамб.), Краснушка (Новг.), Кожевникъ (восточная часть Томской губ.), Любистъ (Пет.), Полевая левкоя (Минск.), Дикій лещъ, Лѣнокъ (Умань), Маточникъ (Влад.), Мельничникъ (Олон.), Плакучъ (Арх., Олон., Ниж., Курск., Ленех.), Пуховникъ (Приарг. край), отъ пуха. окруж. съмена. Пушникъ (Нижег.), Пустодомъ, Ракъ (Ворон.), Ревенка, Синоводъ (Гродн.), Скрипучъ (Волог.), Скрипучъ, Скрысень, Скрывникъ (Смол., Тамб., Пск.), Скрысень (Кал., Ряз.), Лѣсной Скрыпій, Скрыней, Скрыница (Вят.), Скрытъ (Кал.), Скрипенъ, Скрипель (Могил.), Хрыпникъ (Ист.), Хрыпальникъ (Меркл.), Хрыпникъ (Тв., Ост., Пун.), Спрыгъ (Олон.), Смолъ тр., Стеникъ (Арх.), Дикая фіалка (Смол.), Хлѣбница

(Парское Село), Хмызокъ (Орл.), Шелковица (Пет. Мерк.), Шелкунецъ (Даль), Яровникъ или Еровникъ (Казанск. г.), Балникъ (Костр.), Бурьянъ (Кал.). Полевые васьилки (Каз.), Виноходъ (Нижег.), Ненадычка (Олон.), Шалфей полевой (Моск.), Ницалога (Черниг.), Пятушковы яблоки, Донникъ, Сапожникъ (въ три въ Арх. г.), Пырей (Костр.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «кипрейниковыхъ» (*Onagraceae* Juss.), распространенное почти повсемѣстно въ Европѣ и въ Россіи; корни съ придаточными почками; стебель, выш. 1—2½ арш., прямой; листья очерченные ланцетовидные, сидячіе, заостренные, мелко-железисто-пильчатые, снизу свѣтло-зеленые, съ выдающимися жилками. Красивые, крупные красно-лиловые цвѣты собраны длинною кистью. Чашечка глубоко-4-храздѣльная, послѣ цвѣтенія отпадающая; лепестки вѣнчика обратно-яйцевидные, простертые, при основаніи суженные въ ноготокъ, числомъ 4; тычинокъ 8, изъ которыхъ 4 длиннѣе, 4 короче; плодъ—длинная, 4-хгранная, 4-хстворчатая коробочка съ многочисленными сѣменами, снабженными хохолкомъ. Произрастаетъ на сухихъ песчаныхъ мѣстахъ, на опушкахъ лѣсовъ и около дорогъ. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Изъ молодыхъ листьевъ готовятъ Копорскій чай (отъ села Копорья Петерб. губ.), который примѣниваютъ нерѣдко къ настоящему чаю. Татары и тунгузы употребляютъ молодые листья въ пищу, подобно капустѣ.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Растеніе употребляется въ народной медицинѣ. Въ Олонецкой губерніи чай изъ листьевъ этого растения пьютъ отъ головной боли, въ Владимірской губ.—отъ заморозовъ. Иваринкоза, см. Верблюжье сѣно (*Andropogon Schoenanthus* L.). Ивасикъ, см. Бѣлоголовка (*Trifolium montanum* L.). Ивасикъ, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Ивика, см. Ива козья (*Salix caprea* L.).

Ивима, см. Омела обыкновенная (*Viscum album* L.).

Ивинъ, см. Ива козья (*Salix caprea* L.).

Ивина, см. Ива ломкая (*Salix fragilis* L.).

Ивовая трава, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Ивотернъ, см. Облѣпиха обыкновенная (*Rhiporphae rhamnoides* L.).

Игла грудная придорожная, см. Юнуба (*Ziziphus vulgaris* L.).

Иглы сорочьи, см. Аистникъ цикутный (*Erodium cicutarium* L.).

Иголка, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).

Иголка, см. Ковыль волосистый (*Stipa capillata* L.).

Иголка мягкая, см. Вухарникъ мягкій (*Holcus mollis* L.).

Иголка придорожная, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).

Иголка придорожная, см. Крушина слабительная (*Rhamnus cathartica* L.).

Игольникъ, см. Травянка (*Dianthus deltoides* L.).

Игольникъ, см. Аистникъ цикутный (*Erodium cicutarium* L.).

Игольникъ, см. Герань кроваво-красная (*Geranium sanguineum* L.).

Игольникъ, см. Кервель гребневидный (*Scandix Pecten* W.).

Игольчикъ, см. Кервель гребневидный (*Scandix Pecten* W.).

Игнаціевы бобы (*Strychnos Ignatia* Berg.). Ползучій кустар-

никъ, произрастающій на Филиппинскихъ островахъ. Сѣмена его, извѣстныя въ аптекахъ подъ названіемъ «игнаціевыхъ бобовъ», весьма ядовиты, какъ содержащія стрихнинъ.

Иготки, см. Чистецъ прямой (*Stachys recta* L.).

Изгонъ, см. Вехъ ядовитый (*Cicuta virosa* L.).

Изгонъ боровой, см. Зимолюбка зонтичн. (*Chimaphila umbellata*)

Изгонъ раменный, см. Зимолюбка зонтичная (*Chimaphila umbellata* Nutt.).

Измодикъ, см. Истошь обыкновенный (*Polygala vulgaris* L.).

Измодъ, см. Истошь обыкновенный (*Polygala vulgaris* L.).

Измодѣнъ водяной, см. Лютикъ жестколистный (*Ranunculus divaricatus* L.).

Измѣтникъ, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Изплекъ, см. Многопоялка тройчатая (*Polypodium dryopteris* L.).

Изпличная трава, см. Василистникъ желт. (*Thalictrum flavum* L.).

Изсекъ, см. Хохлатка плотная (*Corydalis solida* Smith.).

Изюмъ, см. Виноградъ (*Vitis vinifera* L.).

Икавецъ, см. Чихотная трава (*Parnassia vulgaris* Dc.).

Иковка, см. Икотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* Dc.).

Икотная трава, см. Икотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* Dc.).

Икотка сѣдая, см. Икотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* Dc.).

Икотникъ, см. Икотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* Dc.).

Икотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* Dc., sin *Farsetia incana* R. Br.) Бабинникъ (Малор.), Бѣлоголовникъ (Орл.), Вѣль (Вор.), Бѣлоцвѣтъ, Бѣлоцвѣтъ (Новор. Сред.), Вѣлянка, Бѣлая боровица (Нижег.), Выхри вѣтеръ (Екат.), Горлица, Горлянка (Сарат., Могил.), Золототысячникъ бѣлый (Тул.), Икавка (Кален.), Икавка (Рог.), Икотная трава (Собол., Мейеръ), Икотникъ (Цвиг., Моск. фл. Кауф.), Икотка сѣдая, Кашка, Кашка лѣсная (Тамб.), Сорочья (Екат.), Кашникъ (Черн.), Кругломошочникъ, Сѣдунъ, Толанъ (Рог.), Торица трава (Кондр.), Удушная трава (Влад.), Чистикъ (Орл.), Укотка сѣдая (Вил.), Укотникъ бѣловатый (Моск.), Зерновица или Сапогарія (Нижег.), Ясеникъ (Нижег.), Рѣзунъ (Уфим.), Чихота (Ниж.), Мелкій подорожникъ (Казан.), Боровая морква (Черн.), Шалфейникъ (Сарат.), Кечегуль (Тавр.). Двухлѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и весьма обыкновенное въ Россіи, все сѣрое отъ звѣздчатыхъ волосковъ; листья ланцетные, обыкновенно рѣдко-мелко-зубчатые; цвѣтки въ укороченныхъ или длинныхъ кистяхъ; чашечка изъ 2-хъ паръ опадающихъ листочковъ; вѣнчикъ изъ 4 бѣлыхъ двураздѣльныхъ лепестковъ, расположенныхъ на-крестъ; тычинокъ 6, изъ которыхъ 2 короче и находятся противъ створокъ пестика, нити ихъ на одной сторонѣ съ зубцомъ; 4 остальныхъ тычинокъ длиннѣе, попарно сближены противъ швовъ пестика, и нити ихъ при основаніи расширены. Пестикъ состоитъ изъ 2-хъ плодолистиковъ и раздѣленъ пластинчатымъ сѣмяносцемъ на 2 гнѣзда; плодъ—эллиптическій стручечекъ, сжатый со стороны створокъ и раскры-

вающійся двумя выпуклыми створками; сѣмянъ 6' и болѣе въ каждомъ гнѣздѣ; сѣмена безбѣлковыя. Растетъ на поляхъ, около дорогъ и домовъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Въ народѣ употребляется отъ худобы и отъ судорогъ у дѣтей на первомъ и второмъ году жизни отъ такъ называемой «младенческой». Изъ отвара этой травы имъ дѣлають ванны.

Икумъ, см. Горлецъ, Раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).

Иланъ-Жиланъ (*Unona odorata* sin. *Uvaria odorata* L.). Дерево въ Остѣ-Индіи, изъ цвѣтовъ котораго малайцы приготовляютъ духи, известные подъ именемъ Иланъ-Жиланъ; ради этого въ Индіи это дерево культивируется.

Илевъ, см. Илъмъ полевой (*Ulmus campestris* Sm.).

Илемъ, см. Илъмъ горный (*Ulmus montana* With.).

Илемъ, } см. Илъмъ полевой (*Ulmus campestris* Sm.).

Илимъ, } см. Илъмъ горный (*Ulmus montana* With.).

Илимовникъ, см. Илъмъ пробковый (*Ulmus suberosa* Ehrh.).

Илипе, см. *Marva* (*Bassia butyracea* Roxb.).

Ильинская трава, см. Бѣлзоръ болотный (*Parnassia palustris* L.).

Илъмъ, см. Илъмъ полевой (*Ulmus campestris* Sm.).

Илъмъ горный (*Ulmus montana* With.). Вязъ (Нижег., Самар., Вор.), Берестъ (Волин.), Беристъ (Полт.), Илемъ (Укр.), Илимъ, Илма, Ильмина. Дерево выш. 2—10 верш. изъ семейства «вязовыхъ» (*Ulmaceae* Mirb.), распространенное во всей Россіи, за исключеніемъ крайняго сѣвера. Молодые вѣтви густо-пушистыя, почти войлочные, листья почти симметричныя, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, коротко заостренные, иногда спереди неглубоко 3-хлопастныя двояко-пильчатые, сверху шероховатые, снизу, преимущественно по жилкамъ—пушистыя; цвѣты обоеполовые, на короткихъ ножкахъ, въ плотныхъ шаровидныхъ пучкахъ; околоцвѣтникъ колокольчатый о 4—5 болѣе или менѣе сросшихся между собою травянистыхъ листочкахъ, 4—5тизубчатый, тычинокъ 5—6, прикрѣпленныхъ къ основанію околоцвѣтника и супротивныхъ его частямъ, завязь верхняя, одногнѣздная, съ одной повислой сѣмяночкой и 2 рыльцами. Плодъ—крупная голая округлая или эллиптическая крылатка съ бѣлковымъ сѣменемъ, падающимъ въ центрѣ плода. Цвѣтетъ весной до появленія листьевъ. Растетъ въ лѣсахъ. Употребляется на разныя издѣлія и особенно на оглобли и вязья къ санямъ.

Илъмъ полевой (*Ulmus campestris* Sm. L.). Береста, Берестъ, Вязъ (во мног. губ.), Илимъ, Илемъ (Ворон.), Илма, Илъмъ, Ильмятъ. Илевъ, Каранчъ, Карагучъ. Дерево выш. 2—10 верш., изъ семейства «вязовыхъ» (*Ulmaceae* Mirb.), распространенное въ ср. и южн. Европѣ, въ средней и южной Россіи, съ тонкими, голыми вѣтвями. Листья яйцевидные, очень несимметричныя (одна половина меньше другой), коротко заостренные по краямъ, двояко-городчато-пильчатые, кожистые, голые. Обоеполовые цвѣты почти сидячіе въ плотныхъ шаровидныхъ пучкахъ; околоцвѣтникъ о 4—5 травянистыхъ листочкахъ, 4—5тизубчатый; ты-

чинокъ 4—5; завязь верхняя одногнѣздная, съ 1-й повислой съмяпочкой и 2-мя рыльцами; плодъ — сухая, мелкая, голая крылатка (плодъ окруженъ кожистымъ крыломъ), обратно-яйцевидная, съ съменемъ, придвинутымъ къ верхнему концу плода. Цвѣтетъ весною до появленія листьевъ. Растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Полевой ильмъ (*Ulmus campestris*) извѣстенъ въ народной медицинѣ, какъ легкое вяжущее мочегонное и потогонное средство, и употребляется въ видѣ отвара изъ корки при слабости отправленій желудка и кишокъ, при перемежающейся лихорадкѣ, подагрѣ, ревматизмѣ, водянкѣ, при кровотеченияхъ и при обильныхъ слизистыхъ выдѣленіяхъ; въ особенности-же охотно его примѣняютъ при накожныхъ болѣзняхъ.

Одинъ или два унца (30—60 граммъ) молодой корки варятъ въ двухъ фунтахъ воды, пока не останется половины жидкости, затѣмъ процеживаютъ и выпиваютъ всю порцію въ теченіе дня, заразъ не болѣе одной чашки отвара. Такимъ-же отваромъ обмываютъ кожу и дѣлаютъ примочки. Корку собираютъ весною съ молодыхъ деревьевъ. Молодые листочки раннею весною употребляютъ въ пищу, изъ нихъ варятъ супы. Свѣжій сокъ изъ молодыхъ корокъ содержитъ въ себѣ много слизи и хорошо помогаетъ отъ ожоговъ.

Ильмъ пробковый (*Ulmus suberosa* Ehrh.). Берестина (Укр.), Берестокъ, Берестъ (въ б. ч. Россіи), Берестъ и измѣн. Берескъ (Курск.), Илимовникъ (Забайк.), Ильменникъ, Ильмъ пробочный, Карачникъ, Карагачъ, Караячина (Укр., Черп.), Караачъ, Карагучъ (по Волгѣ и Тереку). Представляетъ изъ себя разновидность ильма полевого (*Ulmus campestris* Sm.); встрѣчается рѣже и отличается отъ ильма полевого сильно развитой пробкой на стволѣ и пробковыми крыльями на вѣтвяхъ. Описание см. выше: ильмъ полевой (*Ulmus campestris* Sm.).

Ильмъ пробочный, см. Ильмъ пробковый (*Ulmus suberosa* Ehrh.).

Ильма, см. Ильмъ полевой (*Ulmus campestris* Sm.).

Ильма, см. Ильмъ горный (*Ulmus montana* With.).

Ильма, см. Вязъ обыкновенный (*Ulmus effusa* Willd.).

Ильменникъ, см. Ильмъ пробковый (*Ulmus suberosa* Ehrh.).

Ильмина, см. Вязъ обыкновенный (*Ulmus effusa* Willd.).

Ильмина, см. Ильмъ горный (*Ulmus montana* With.).

Ильмякъ, см. Ильмъ полевой (*Ulmus campestris* Sm.).

Имбирь (*Zingiber officinale* Roxb.). Имбиръ бѣлый, Имбиръ. Известное пряное растеніе, родомъ изъ Остъ-Индіи, откуда вывезено и культивируется въ Вѣстъ-Индіи и Исламіи. Сильно развитая корневая система растенія образуетъ клубневидныя утолщенія, изъ которыхъ добываютъ такъ называемый «имбирь», причемъ послѣдній представляетъ два сорта: лучшій, бѣлый имбиръ получается изъ тщательно вычищенныхъ и высушенныхъ на солнцѣ клубней растенія и черный, вѣрнѣе, корицевый имбиръ получается изъ клубней, вываренныхъ просто въ водѣ. Имбиръ отличается сильно прянымъ запахомъ и вкусомъ и возбуждающимъ дѣйствіемъ; употребляется нерѣдко въ

качествъ приправы въ нѣкоторыхъ кушаньяхъ, пирожныхъ и вареньяхъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Въ медицинѣ имбирь употребляется крайне рѣдко. Въ аптекахъ продается имбирная настойка изъ 1-й части имбиря и 2 частей виннаго спирта, принимается она отъ 20—60 капель. Имбирь входитъ въ составъ ароматическаго порошка, который составляется изъ 5 частей китайской корицы, 3 частей кардамона и 2 частей имбиря. Порошокъ этотъ принимается на кончикъ ножа при слабости желудочнаго пищеваренія. Имбирь имѣетъ горьковатый вкусъ и дѣйствуетъ, какъ сильное раздражающее средство, на слизистую оболочку стѣнокъ желудка и кишокъ, потому и полезенъ въ случаяхъ вялости пищеваренія. Врачи его почти не назначаютъ, какъ народное-же средство, онъ входитъ въ различные настойки. Такъ, напр., на немъ настаиваютъ вино, которое принимаютъ отъ застарѣлыхъ перемежающихся лихорадокъ и отъ слабости пищеваренія послѣ какихъ-либо долго длившихся болѣзней.

Въ ветеринарной практикѣ имбирь дается въ тѣхъ-же случаяхъ и въ такомъ-же количествѣ, какъ апръ (см. апръ). Имбирь бѣлый, см. Имбирь (*Zingiber officinale* Roxb.). Имбирная трава, см. Подмаренникъ сѣверный (*Galium boreale* L.). Имела, см. Омела обыкновенная (*Viscum album* L.).

Иммортельки мелкія (*Ammœbium alatum* R. Br.), родомъ изъ Новой Голландіи, одна изъ разновидностей цмина (*Helichrysum*), описаніе см. ниже: цминъ (*Helichrysum arenarium*), съ бѣлыми сухими и сохраняющимися въ продолженіе многихъ лѣтъ цвѣтами; разводятся у насъ въ садахъ для букетовъ и главнымъ образомъ для вѣнковъ.

Имурка, см. Люцерна серповидная (*Medicago falcata* L.).

Имбирь, см. Имбирь (*Zingiber officinale* Roxb.).

Индиго ненастоящій, см. Аморфа кустарная (*Amorpha fruticosa* L.).

Индиговое растеніе, см. Индигофера (*Indigophera* L.).

Индигофера (*Indigophera* L.). Индиговое растеніе. Многочисленные и весьма распространенные виды индигоферы представляютъ изъ себя травы или полукустарники, произрастающіе въ тропическихъ странахъ Остъ-Индіи и Вестъ-Индіи; нѣкоторые изъ нихъ доставляютъ извѣстное синее красильное вещество «индиго», ради котораго и культивируются. Приготавливается индиго слѣдующимъ образомъ: до цвѣтенія собранныя растенія, свѣжія или сначала высушенныя, мочатъ въ водѣ и накрываютъ сверху досками, пока жидкость не окрашивается интенсивно въ желто-зеленый цвѣтъ, между тѣмъ какъ растенія въ этотъ промежутокъ времени подвергаются процессу разложенія. Для того, чтобы получить «индиго» изъ воды, даютъ послѣдней стекать въ подставленный сосудъ и стараются въ продолженіе 2-хъ часовъ посредствомъ избалтыванія и перемѣшиванія привести поверхность жидкости въ возможно большее соприкосновеніе съ вѣинымъ воздухомъ, для того, чтобы «индиго», соединясь съ кислородомъ, приняла синюю окраску и

стало нерастворимо въ водѣ. Изъ помутнѣвшей жидкости, онъ осаждается на дно въ видѣ ~~снѣга~~ порошка, который отдѣляютъ посредствомъ процеживанія жидкости черезъ сукно и затѣмъ высушиваютъ. «Индиго» употребляется исключительно въ качествѣ красящаго въ синий цвѣтъ вещества въ красильномъ искусствѣ; для этого оно переводится въ бѣлое индиго, и въ растворъ послѣдняго погружаютъ шерсть или ткань, которыя при просушкѣ на воздухѣ получаютъ синюю окраску.

Индѣйское дерево, см. Сандальное дерево (*Santalum* L.).

Индѣйскія ласточкины гнѣзда, см. Саланга (*Sphaerococcus lichenoides* Ag.).

Инежетъ, см. Василитникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).

Инциръ, см. Смоковница обыкновенная (*Ficus Carica* L.).

Инча, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).

Иншавсикъ, см. Девясилъ иволистный (*Inula salicina* L.).

Иньяма (*Dioscorea alata* L.). Пама. Клубневидное вьющееся растеніе изъ семейства «диоскорейныхъ» (*Dioscoreae*), родомъ изъ Остѣ-Индіи, культивируемое въ Африкѣ, Южной Америкѣ и прочихъ тропическихъ странахъ ради питательнаго мучнистаго вещества, содержащагося въ клубняхъ растенія, съ мелкими однополыми цвѣтами и очередными листьями. Въ сыромъ видѣ клубни горьки на вкусъ и вредны для здоровья, но при вывариваніи въ водѣ и при поджариваніи теряютъ свои вредоносныя качества и употребляются въ пищу, замѣняя нашъ картофель. Въ Остѣ-Индіи добывается мука, подобно нашей картофельной, которую примѣшиваютъ при печеніи хлѣбовъ и употребляютъ на приготовленіе различныхъ мучныхъ блюдъ. Какъ вьющееся декоративное растеніе, разводится у насъ въ оранжереяхъ.

Ипекакуана, см. Ипекакуана наст. (*Cerhaelis Ipecacuanha* Rich.).

Ипекакуана, см. Ипекакуана черная (*Psychotria emetica* Mut.).

Ипекакуана настоящая, Рвотный корень (*Cerhaelis Ipecacuanha* Rich.). Полукустарниковое растеніе, произрастающее въ Бразиліи и Гренадѣ. Корень его уже болѣе 200 лѣтъ введенъ въ Европѣ, какъ цѣлебное средство. Въ Парижѣ корень ипекакуаны вошелъ въ болыное употребленіе послѣ того, какъ докторъ Гельвеціузъ излечилъ имъ дофина (въ послѣдствіи Людовика XV) отъ кроваваго поноса и, кромѣ всякихъ знаменъ отличій и почестей, получилъ отъ короля-солнца (*roi soleil*) награду въ 1,000 лундоровъ. Употребляемая въ медицинѣ ипекакуана состоитъ изъ побочныхъ корней растенія, найденнаго въ влажныхъ и тѣнистыхъ мѣстахъ бразильскихъ дѣвственныхъ лѣсовъ, также въ Перу и Новой Гренадѣ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ корня ипекакуаны очень распространено. Корень ипекакуаны составляетъ необходимую принадлежность каждой домашней аптеки. Корень ипекакуаны принимаютъ въ порошкахъ, отварахъ и настойкахъ. Небольшія количества ипекакуаны помогаютъ отдѣленію мокроты изъ легкихъ, потому даются отъ кашля, какъ отхаркивающее средство; большіе

приемы вызывают рвоту, потому часто назначаются при отравлениях и при ложном крупѣ. Кроме того, ипекакуанѣ приписывается свойство помогать отъ дезинтеріи (кроваваго поноса). Высушенный корень очищенный сохраняется въ хорошо закупоренныхъ банкахъ, такъ какъ порошокъ ипекакуаны, вдыхаемый вмѣстѣ съ воздухомъ, можетъ дѣйствовать, какъ весьма ядовитое средство.

Вслѣдствіе своей способности вызывать рвоту, ипекакуана называется рвотнымъ корнемъ. Для того, чтобы вызвать рвоту, корня ипекакуаны нужно принять отъ 1-го до 5-ти гранъ (0,05—0,3). Передъ наступленіемъ рвоты у больного дѣлается слюнотеченіе, зѣвота, недомоганіе, тошнота и затѣмъ уже рвота. Во время рвоты происходитъ усиленное выдѣленіе поджелудочной железы и печени, отдѣлимое ихъ извергается вмѣстѣ съ содержимымъ желудка, отчего къ рвотѣ примѣшивается желчь. Кроме того, вмѣстѣ съ усиленнымъ выдыханіемъ во время рвоты изъ открытой голосовой щели, извергается также отдѣлимое бронхъ. Рвотнымъ дѣйствіемъ ипекакуаны врачи пользуются въ тѣхъ случаяхъ, когда надо освободить верхнюю часть кишечника отъ ядовъ и отъ непереваренныхъ остатковъ дурной пищи, которая можетъ разстроитъ пищевареніе. Посредствующимъ образомъ стараются достигнуть того-же самаго для содержимаго бронхъ, дыхательнаго горла и гортани; на этомъ основано прежде часто практиковавшееся назначеніе рвотнаго корня при крупѣ. Теперь при крупѣ рвотный корень даютъ значительно рѣже. Съ рвотою, дѣйствительно, выдѣляются пленки изъ гортани, но на самый ходъ болѣзни и на образованіе новыхъ пленокъ рвотный корень никакого дѣйствія не оказываетъ, наоборотъ, неумѣстное употребленіе корня можетъ ослабить дѣятельность сердца и вызвать упадокъ силъ.

Вообще ипекакуана, какъ рвотное средство, не должна даваться при высокой степени слабости больного, старымъ людямъ, у которыхъ вслѣдствіе рвоты можетъ сдѣлаться апоплексія (кровотеченіе въ мозгъ), беременнымъ, при грыжахъ и выпаденіяхъ матки, при болѣзняхъ сердца, при явленіяхъ воспаленія желудка и кишокъ, при судорогахъ, или вообще людямъ, подверженнымъ къ нимъ, при лихорадочныхъ болѣзняхъ, при которыхъ вообще легко наступаетъ упадокъ силъ. Если надо дать рвотное средство человеку, у котораго нѣсколько дней желудокъ не дѣйствовалъ, ему слѣдуетъ предварительно поставить клизму, для того, чтобы опорожнить нижній отдѣлъ кишечника.

Маленькія дозы ипекакуаны назначаются при кашлѣ и въ тѣхъ случаяхъ, когда надо вызвать легкую испарину; въ особенности ее рекомендуютъ при гриппѣ, также при кори и вообще при многихъ болѣзняхъ, сопровождающихся катаррами бронхъ. При этомъ отдѣляется большое количество жидкости слизистой оболочки бронхъ, содержащаяся слизь разжижается и легче выкашливается. Въ этихъ случаяхъ ипекакуана дается видѣ настоялки или-же въ порошокъ. Для взрослыхъ на 6 унцій (180 грм.) воды берутъ обыкновенно 6 гранъ (0,4 грм.) истолченнаго въ порошокъ корня; корень заливаютъ кипящей водою, настаиваютъ минутъ

10—15, затѣмъ сливаютъ, процеживаютъ и принимаютъ черезъ 2 часа по столовой ложкѣ. Дѣтямъ отваръ этой-же крѣпости даютъ по чайной ложкѣ. Для вкуса при лихорадочной формѣ заболѣванія въ отваръ прибавляютъ нѣсколько капель разведенной соляной кислоты (отъ 20-ти до 30-ти капель) и столовую ложку простого или малинового сиропа. Если надо усилить отхаркивающее дѣйствіе ипекакуаны, къ ней прибавляютъ анисовыхъ капель и, для того, чтобы кашель не очень раздражалъ, воды горькаго миндаля: на 6 унцій (180 грм.) отвара ипекакуаны прибавляютъ отъ 30-ти до 60-ти капель аниса (*Liquor ammonii anisati* 2,0—4,0 грм.) и 20—30 капель воды горькаго миндаля (*Aqua amygdalarum amararum*).

Кромѣ отвара ипекакуаны, часто употребляютъ Д о в е р о в ъ порошокъ, состоящій изъ одной части порошка ипекакуаны и чистаго опія на 3 частей сѣрнокислаго калия (*kali sulfurici*). Взрослымъ Доверовъ порошокъ дается отъ 3-хъ до 4-хъ гранъ (0,2—0,4 грм.) два два, три въ день; дѣтямъ—отъ $\frac{1}{4}$ грана до 2-хъ, смотря по возрасту (0,015—0,12 грм.). Дѣтямъ до года совѣтъ не слѣдуетъ давать Доверовъ порошокъ, потому что онъ содержитъ опій и можетъ вызвать у ребенка судороги и спячку.

Кромѣ этихъ двухъ самыхъ употребительныхъ препаратовъ, въ продажѣ еще существуетъ сиропъ ипекакуаны, который дается чайными ложками, тоже отъ кашля, и винная настойка ипекакуаны. Вино ипекакуаны входитъ въ составъ многихъ капель отъ кашля. Заразъ его принимаютъ взрослые 20 капель, на сутки до 60 кап.

Въ гомеопатіи корень ипекакуаны имѣетъ также обширное примѣненіе. Его даютъ при кровотеченіи изъ различныхъ органовъ, при припадкахъ внезапной слабости съ тошнотой или дурнотой, при лихорадкѣ съ незначительнымъ ознобомъ, но сильнымъ жаромъ и жаждою, при перемежающихся лихорадкахъ, послѣ злоупотребленія хиною и при головной боли. Различныя разстройства кишечника, какъ-то: горькая рвота (желчная или при нятою пищу), поносъ съ кровью и слизью, дѣтскіе поносы лечатся въ гомеопатіи ипекакуаной; изъ болѣзней дыхательныхъ путей леченію ипекакуаной подвергаются коклюшъ, сухой кашель, вслѣдствіе катарра глотки и гортани, вызывающій чувство царапанія въ горлѣ, одышка, припадки удушья, преимущественно у дѣтей. Даютъ спиртную настойку корней или 1—2 разведеніе 1—2 капли каждые 1—3, 4 или 6 час., смотря по состоянію болѣзни.

Въ ветеринарной медицинѣ рвотный корень дается свиньямъ и плотояднымъ животнымъ; какъ рвотное средство отъ 30 до 120 гранъ ($\frac{1}{2}$ —4 грм.) свиньямъ и 3—10 грам. (0,25—0,75 грм.) собакамъ. Въ маленькихъ дозахъ ипекакуану даютъ при воспаленіяхъ легкихъ и жабъ, также при катаррѣ дыхательныхъ путей и желудочно-кишечнаго канала, именно при поносахъ.

Въ гомеопатической ветеринаріи ипекакуана дается также при разстройствахъ дыхательныхъ и пищеварительныхъ путей, кромѣ того, при появленіи крови въ мочѣ и при судорогахъ, въ особенности у молодыхъ животныхъ. Даютъ 1 и 2-е разведеніе, а также и чистую спиртную настойку.

Ипекакуана черная (*Psychotria emetica* Mat.). Полукустарниковое растение въ Гренадѣ, растущее въ бассейнахъ рѣки Магдалины; корень его, какъ отличающійся тѣмъ-же цѣлебнымъ дѣйствіемъ, какъ корень ипекакуаны настоящей, только въ болѣе слабой степени, прежде тоже употреблялся въ медицинѣ, но нынѣ совсѣмъ оставленъ.

Ирга, см. Ирга обыкновенная (*Amelanchier vulgaris* Moench.).

Ирга, см. Кизильникъ обыкновенный (*Cotoneaster vulgaris* Lindl.).

Ирга, см. Таволга дубраволлистная (*Spiraea chamaedryfolia* L.).

Ирга обыкновенная (*Amelanchier vulgaris* Moench.). Мухомула обыкновенная, Армудъ, Каменная груша, Сыриккикука (на Дону). Кустарникъ выш. $1\frac{1}{2}$ —5 арш., изъ семейства «яблоневыхъ» (*Romaceae* Lindl.), распространенный на горахъ въ ср. и южн. Европѣ, въ Крыму и на Кавказѣ. Листья очередные, округло-овальные, тупые, пильчатые, съ нижней стороны сперва войлочные, потомъ почти голые. Правильные цвѣты въ кистяхъ. Чашечка раздѣльная; вѣнчикъ 5-тилепестный, съ узкими, къ основанію нитевидными, бѣлыми лепестками. Тычинки сидятъ на кольцѣ, находящемся на краю вогнутого цвѣтоложа; завязь 2—5-тигнѣздная, съ такимъ-же количествомъ столбиковъ; срастающаяся съ цвѣтоложкомъ, она даетъ мясистый ягодообразный шаровидный плодъ, черный и на вкусъ сладкій. Цвѣтетъ весною. Растетъ на горахъ. Часто разводится въ садахъ. (Рис. 93.)

Иржы, см. Рожь обыкновенная (*Secale cereale* L.).

Ирисъ, см. Касатикъ флорентійскій (*Iris florentina* L.).

Ирландскій мохъ, см. Карагенъ (*Chondrus crispus* Lyngb.).

Иропъ, см. Фиалка песчаная (*Viola arenaria* De.).

Иръ, см. Аиръ обыкновенный (*Acorus calamus* L.).

Иръ, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Иръ нѣмецкая, см. Касатикъ германскій (*Iris germanica* L.).

Ископытъ, см. Соколій перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).

Искра, см. Травянка (*Dianthus deltoides* L.).

Исландскій мохъ (*Cetraria islandica* Ach.). Фарм. назв. *Lichen islandicus*, *Muschus islandicus*. Мохъ жесткій, Комашникъ (Твер., Ост., Пунар.), Березовый мохъ (Влад., Рунр.), Мохъ рябчиковый (Волог.), Сухоборный мохъ (Арх.), Дубовыя лапти, Шлевскій мохъ. Листовидно-кустистый ягель*) буроватаго цвѣта съ коричневыми апотеціями (т. е., блудцевидными вмѣстилищами сумокъ со спорами). Въ средней Россіи встрѣчается въ сосновыхъ борахъ, но особенно обильно растетъ въ сѣверной Европѣ. Имѣетъ слизисто-горькій, нѣсколько вязущій вкусъ и очень

*) Ягели суть грибы поселившіеся на водоросляхъ. По наружному виду ягели бываютъ разнообразны, чаще всего бѣловатаго, сѣраго, желтаго и бурого цвѣтовъ. По формѣ отличаются ягели «корковидные», плотно приростающіе къ камнямъ или къ корѣ, «листовидные», имѣющіе видъ развѣтвленных листовидныхъ пластинокъ, и «кустистые», имѣющіе ростецъ, развѣтвленный кустообразно. Ягели растутъ въ полярныхъ странахъ, гдѣ покрываютъ огромныя пространства, также на высокихъ горахъ.

питателенъ. Въ Исландіи употребляется въ пищу въ видѣ каши или хлѣба. (Табл. XVI, фиг. 91.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Болѣе 200 лѣтъ тому назадъ употребленіе исландскаго моха было извѣстно среди исландцевъ. Врачи въ прежнее время давали его, какъ питательное средство, больнымъ, истощеннымъ тяжелыми болѣзнями, и такъ-же, какъ средство, поддерживающее желудочное пищевареніе. Въ особенности много его назначали при чахоткѣ легкихъ. Дальнѣйшія изслѣдованія показали, что исландскій мохъ можно принимать только такимъ чахоточнымъ, которые не лихорадятъ и не имѣютъ наклонности къ кровохарканію. Исландскій мохъ обладаетъ свойствомъ дѣйствовать обволакивающимъ образомъ на слизистыя оболочки, потому дается также при разстройствахъ кишечника. Его варятъ въ водѣ съ сахаромъ, въ молокѣ или винѣ, также изъ него готовятъ лепешки. При кипяченіи онъ вполне растворяется и, остывая, превращается въ студенистую массу, которая уже болѣе 50 лѣтъ употребляется за границу, какъ питательное средство, при исхуданіяхъ вслѣдствіе различныхъ хроническихъ болѣзней и въ особенности при чахоткѣ. Для улучшенія вкуса, къ желе изъ исландскаго моха прибавляютъ немного лимоннаго сока, корицы или горькихъ миндалей.

Испленъ, см. Многоножка тройчатая (*Polypodium dryopteris* L.).

Исплешна, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).

Исопъ, см. Истодъ обыкновенный (*Polygala vulgaris* L.).

Исопъ, см. Истодъ хохлатый (*Polygala comosa* Schk.).

Иссопъ, см. Иссопъ лекарственный (*Hyssopus officinalis* L.).

Иссопъ лекарственный (*Hyssopus officinalis* L.). Фарм. назв. *Hyssopus*. Васильки (Екат.), Душница (Приарг. кр.), Звѣрбой, Синій звѣрбой (Щегл.), Иссопъ, Иссопова трава, Гиссопъ, Сусопъ, Юзефка, Юзефъ (Малор.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное въ южной Россіи, обыкновенно коротко-пушистое; стебель развѣтвленный, въ углахъ листьевъ короткія вѣточки; листья линейно-ланцетные, цвѣтки не густыми пучками въ углахъ верхнихъ листьевъ стебля, сближенными въ продолговатомъ, при основаніи иногда прерванномъ, одностороннемъ соціѣтій; чашечка трубчатая, съ 15-ю жилками и 5-ю почти равными зубцами, ланцетными и заостренными; вѣнчикъ темно-голубой, двугубый, съ немного выдающейся изъ чашечки трубкою, съ почти плоскою выемчатой верхней губой и трехлопастною нижнею губой, съ болѣе широкою двуллопастною среднею лопастью; тычинокъ 4, выдающихся изъ вѣнчика, двубратственныхъ; гнѣзда пыльниковъ расходящіеся, раскрывающіеся общею щелью. Плодъ—продолговатые орѣшки. Растетъ иногда на сорныхъ мѣстахъ, разводится въ садахъ и огородахъ. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Иссопъ употребляется въ медицинѣ, для чего собираютъ его листья и цвѣтущія верхушки. Они имѣютъ пріятный, нѣсколько пряный запахъ, уменьшающійся вслѣдствіе высушиванія, также пряный, нѣсколько горьковатый вкусъ.

и содержать въ себѣ эфирное масло и немного дубильнаго вещества.

Употребляется иссопъ врачами крайне рѣдко; въ народной медицинѣ онъ имѣетъ примѣненіе, какъ средство, слегка возбуждающее, потому отваръ изъ его листьевъ или цвѣтовъ принимаютъ при слабости пищеваренія, при катаррѣ дыхательныхъ органовъ, при боляхъ въ груди и ревматизмѣ. Снаружи отваръ иссопа употребляется для полосканія горла и для обмыванія глазъ. Эфирное масло иссопа употребляется рѣдко; его рекомендуютъ отъ ночныхъ потовъ чахоточныхъ, для чего принимаютъ 10 капель масла въ анисовой водѣ 3 раза въ день. При парывахъ въ горлѣ полощатъ горло отваромъ иссопа съ винными ягодами; въ полосканіе отъ флюса въ отваръ иссопа кладутъ нѣсколько капель уксуса.

Для внутренняго употребленія берутъ 1—2 драхмы (4—8 грм.) сушеныхъ листьевъ или верхушекъ иссопа и заливаютъ 12 столовыми ложками воды, пьютъ по $\frac{1}{2}$ или одной чашкѣ 2—3 раза въ день.

Для наружнаго употребленія дѣлаютъ отваръ иссопа, для чего 1 унцію (30 грм.) травы варятъ въ 8 унціяхъ (16-ти столовыхъ ложекъ воды), къ отвару прибавляютъ 3—4 столовыхъ ложки краснаго вина.

Трава иссопа входитъ въ составъ грудного сбора. Грудной сборъ принимается вмѣсто чая вмѣстѣ съ медомъ при грудныхъ болѣзняхъ; на фунтъ кипящей воды берутъ хорошую горсть (1 унц.—30 грм.) травы. Траву иссопа варятъ съ винными ягодами; горсть иссопа смѣшиваютъ съ 12 мелко нарезанными винными ягодами и варятъ въ 3 фунтахъ воды, пока не останется 2 фунта жидкости (что равняется бутылкѣ); отваръ этотъ пьютъ каждое утро по чайной чашкѣ.

Иссопъ лѣсной, см. Маточникъ (*Dracosephalum moldavica* L.).

Иссопова трава, см. Иссопъ лекарств. (*Hyssopus officinalis* L.).

Истокъ, см. Многоножка тройчатая (*Polypodium dryopteris* L.).

Истодъ, см. Истодъ обыкновенный (*Polygala vulgaris* L.).

Истодъ обыкновенный (*Polygala vulgaris* L.). Фарм. назв.

такое-же. Воронье очко (Черн.), Выкакопичья, Вѣтвь коныя (Кондр.), Змѣевыя головки (Вятск.), Измодъ, Измодникъ (Тул., Калнин.), Исопъ (Тв., Пун.), Истодъ, Истодотъ, Полевѣ кисточки (Мал.), Коница, Корениникъ, Краиницъ (Мог.), Купица (Малор.), Мыльцо (Олон.), Наесадникъ (Мог.), Прострѣлъ (Арх.), Родимцевая (Вят.), Синюшка, Синюшки (Тв.), Сорокоприточная (Волог., Двинг.), Крестовикъ, Крестовникъ, Млечникъ, Млечный корень, Многомлечникъ, Многомлечница, Вознесенскій цвѣтъ. Травянистое многолѣтнее растеніе изъ семейства «истодовыхъ» (*Polygaleae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и въ Россіи. Стебель съ многочисленными приподнимающимися вѣтвями, выш. 3—7 верш.; листья узко-ланцетные, острые, спиральные, прикорневые собраны пучкомъ. Голубые или розовые цвѣты расположены верхушечными кистями и снабжены 3-мя прицвѣтниками, изъ которыхъ кроющій длиннѣе. Чашечка остающаяся, 5-тилистная, съ 2-мя внутренними болѣе крупными, окрашенными и при плодахъ разрастающимися, листоч-

ками, называемыми крыльями. Лепестковъ 3—5, сросшихся между собою и тычиночными нитями; тычинокъ 8, внизу сросшихся между собою въ одинъ пучокъ, наверху раздѣляющійся на 2 супротивные пучка, состоящихъ каждый изъ 4 тычинокъ; пыльники одногнѣздные, раскрывающіеся отверстиями на верхушкѣ; нестикъ со сплюснутой со стороны пшовой завязью, простымъ столбикомъ и 2-хлостнымъ рыльцемъ. Плодъ—обратно-сердцевидная, двугнѣзная, двусѣмянная коробочка, раскрывающаяся гнѣздоразрывно, на короткой ножкѣ, и сѣменами, покрытыми при основаніи волосками. Растетъ на лугахъ и между кустарниками. Цвѣтетъ лѣтомъ. Листья употребляютъ иногда вмѣсто зеленого чая.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Истодъ извѣстенъ только, какъ народное средство. Изъ сушеныхъ корней приготовляютъ отваръ съ водою или молокомъ: 1 унцъ (30 грм.) толченыхъ корней кипятятъ въ ½ бутылкѣ молока, пьютъ по чайной чашкѣ раза два-три въ день; такой отваръ обыкновенно даютъ чахоточнымъ. Кромѣ того, этому отвару приписывается свойство увеличивать количество мочи.

Истодъ хохлатый (*Polygala comosa* Schk.). Алоцвѣтка (съ розов. пв. Вят.), Вередникъ (Мог.), Горобичи стручки (Хар.), Исонъ (Орл.), Истодъ-дерево (Гмел.). Киятки полевые (Кіев.), Малые козлики (Минск.), Лѣсовой ленокъ (Полт.), Растъ, бѣлый (Кіев.), Шильникъ (Хар.), Шена (Смол.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «истодовыхъ» (*Polygaleae* Juss.), обыкновенное въ Европѣ и въ Россіи. Отличается отъ истода обыкновеннаго (описаніе см. выше: истодъ обыкновенный *Polygala vulgaris* L.) болѣе прямыми вѣтвями, продолговатыми нижними и стеблевыми линейно-ланцетными листьями. Цвѣтки обыкновенно свѣтло-пурпуровые, рѣже лиловые, розовые или бѣловатые, собраны въ болѣе густую кисть. Растетъ въ рощахъ, между кустарниками и на лугахъ. Употребляется въ народѣ отъ рака, водяной болѣзни и чахотки.

Истодотъ, см. Истодъ обыкновенный (*Polygala vulgaris* L.).

Искоколенникъ, см. Торница полевая (*Spergula arvensis* L.).

Итальянская трава, см. Донникъ лекарственный (*Melilotus officinalis* Lam.).

I.

Иакова трава, см. Желтуха (*Senecio Jacobea* L.).

Ибунка, см. Вероника ручейная (*Veronica Beccabunga* L.).

Ива, см. Ива козья (*Salix caprea* L.).

Ива молдаванська, см. Лоза (*Salix viminalis* L.).

Иванъ да Марья, см. Иванъ да Марья (*Melampyrum nemorosum* L.).

Иванъ да Марья, см. Анютины глазки (*Viola tricolor* L.).

Ивасикъ, см. Клеверъ напѣнный или кошачій (*Trifolium pratense* L.).

Іерусалимъ, см. Кудрявецъ (*Chenopodium Botrys* L.).
 Іерусалимка, см. Шандра обыкн. (*Eisholtzia cristata* Willd.).
 Іерусалимская верба, см. Ива плакучая (*Salix babylonica* L.).
 Ікавка, см. Икотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* DC.).
 Іоакимъ и Анна, см. Иванъ да Марья (*Melampyrum nemorosum* L.).
 Іоакимъ и Анна, см. Синюха обык. (*Polemonium coeruleum* L.).
 Іоаннова кровь, см. Дивала многолѣтн. (*Scleranthus perennis* L.).
 Іонжа, см. Люцерна полевая (*Medicago sativa* L.).
 Іудино дерево (*Cercis Siliquastrum* L.). Жидовская трава, Багрянникъ, Багрянникъ іудейскій, Любовное растеніе. Дерево, распространенное на югъ Европы. Благодаря красивымъ краснымъ цвѣтамъ, разводится для украшенія у насъ въ садахъ. Красиво испещренная жилками древесина употребляется на тонкія столярныя работы; плоды, имѣющіе видъ длинныхъ повислыхъ стручковъ, носятъ названіе ненастоящихъ сладкихъ рожковъ.

К.

Кабакъ, см. Тыква кухонная (*Cucurbita maxima* Duch).
 Кабакъ, см. Тыква обыкновенная (*Cucurbita Pepo* L.).
 Кабака, см. Тыква кухонная (*Cucurbita maxima* Duch).
 Кабачки, см. Тыква обыкновенная (*Cucurbita Pepo* L.).
 Кавалерскій цвѣтъ, см. Голубки обыкновенные (*Aquilegia vulgaris* D.).
 Кавунъ, } см. Арбузъ (*Cucumis Citrullus* Sering.).
 Кавунка, }
 Кавыла, см. Ковыль волосистый (*Stipa capillata* L.).
 Кадило, см. Параличная трава (*Ajuga Chamaepitys* L.).
 Кадило, см. Кадило пахучее (*Melittis melissophyllum* L.).
 Кадило, см. Мелисса лекарственная, Лимонная мята (*Melissa officinalis* L.).
 Кадило, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).
 Кадило пахучее (*Melittis melissophyllum* L.). Фарм. назв. *Melissophyllum s. Melissa Tragi* (Herba). Кадило, Медунка (Гродн.). Мочегонъ (Сл. Ак.), Пчельникъ, Пчельный листъ, Пижельникъ (Волин.), Гадинъ языкъ (Волин.). Травянистое многолѣтнее растеніе изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное въ Привислянскомъ краѣ, въ Литвѣ и юго-западныхъ губерніяхъ. Все растеніе шершаво-волосистое, выш. 5—6 вершк.; стебель прямой, простой; листья черешковые, яйцевидные, городчатые, нижніе при основаніи сердцевидные. Крупные бѣлые цвѣты сидятъ по 1—3 въ углахъ листьевъ, обращены въ одну сторону; цвѣтопожки короче чашечки; чашечка колокольчатая, почти перепончатая, 4—5-тизубчатая, почти двугубая; вѣничекъ въ 2—3 раза длиннѣе чашечки, бѣлый или ро-

зовый, съ курчуровыми пятнами. съ длинною, выдающеюся изъ чашечки трубкою и двугубымъ отгибомъ: верхняя губа вогнутая, округлая, нижняя 3-хлопостная съ приплюсненною средней лопастью; тычинокъ 4, съ расходящимися гнѣздами пыльниковъ. Завязь верхняя, 4-хлопастная, 4-гнѣздная съ столбикомъ, заканчивающимся 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Плоды сжатые округлые орѣшки. Растетъ между кустарниками и въ дѣсахъ: цвѣтетъ въ началѣ лѣта. (Таб. XVII, фиг. 92.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Кадило пахучее употребляется въ народной medicinѣ. Листья растения собираются передъ началомъ цвѣтенія. Ихъ хорошо высушиваютъ и сохраняютъ въ сухомъ мѣстѣ. Листья имѣютъ пріятный лимонный запахъ. На вкусъ они пріятно-горькіе, кислотатые, содержатъ эфирное масло, горькое вещество и немного желѣзистодубильнаго вещества.

Растеніе употребляется, какъ слабое возбуждающее средство и успокоивающее боли въ животѣ; кромѣ того—отъ кашля и одышки. Для внутренняго употребленія изъ сушеныхъ листьевъ приготавливаютъ слабый настой, какъ чай. Для наружнаго употребленія изъ сушеныхъ листьевъ дѣлаютъ настойку на винѣ, листья же входятъ въ составъ такъ наз. «воды кармелитовъ». Холодный чай кадила, приготовленный изъ свѣжихъ цвѣтовъ, дѣйствуетъ освежающимъ образомъ, а горячій употребляется, какъ потогонное. Чай изъ кадила, подобно мятѣ, возбуждаетъ движеніе кишокъ, устраняетъ колики, зависящія отъ скопленія газовъ въ кишкахъ, и боли въ подложечной области, если пораженъ желудокъ.

Кадило трава бѣлая, см. Чемерица бѣлая (*Veratrum album* L.).

Кадыло, см. Шалфей клейкій (*Salvia glutinosa* L.).

Кажушка, см. Чернокорень лекарств. (*Cynoglossum officinale* L.).

Казакъ, см. Соколий-перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).

Казюля, см. Иванъ да Марья (*Melampyrum nemorosum* L.).

Каинко (*Chiococca racemosa* L.). Кустъ, произрастающій въ Бразиліи и на Антильскихъ островахъ. Его корень, называемый «каинковымъ», имѣетъ тошнотворное дѣйствіе и употребляется въ Бразиліи, какъ средство отъ укушенія змѣй и водобоязни.

Каинковый корень, см. Каинко (*Chiococca racemosa* L.).

Какао (*Theobroma Cacao* L.). Шоколадное дерево. Плоды извѣстны въ фарм. подъ именемъ *Semen Theobromatis, Fabae, s. Avelanae mexicanae, Amygdalae peruvianaе, Nucces Fabae Cacao*. Шоколадные бобы. Высокое дерево 2--6 сажень в., произрастающее въ южной Америкѣ. Мексикѣ до Гвианы и на Антильскихъ островахъ. Его обратно-яйцевидные плоды, тупые на концѣ, 3—5 вершк. дл., напоминаютъ по формѣ огурцы, содержатъ яйцевидныя, сплюснутыя, миндалевидныя, красновато-бурыя зерна, извѣстныя подъ названіемъ «шоколадныхъ бобовъ», заключающія маслянистыя сѣмена; последние составляютъ главную питательную пищу американцевъ. Кромѣ того, изъ зеренъ, приведенныхъ въ тѣстообразную массу, приготавливаютъ шоколадъ, изъ тертыхъ, прессованныхъ и обработанныхъ надлежащимъ образомъ бобовъ добывается какаовое масло, употребляе-

мое въ медицинѣ, изъ шелухи жареныхъ бобовъ варятъ особый напитокъ—«какао», замѣняющій кофе: наконiecъ, бобы содержатъ въ себѣ красящее въ коричневый цвѣтъ вещество, почему шоколадъ иногда употребляютъ при мытьѣ коричневыхъ матерій. При приготовленіи шоколада весьма часто прибѣгаютъ къ поддѣлкѣ, примѣшивая къ нему муку, картофельную муку и прочія мучнистыя вещества, присутствіе которыхъ легко обнаружить при помощи йодной настойки, окрашивающей картофельную муку въ ярко-синій цвѣтъ. Доброкачественный шоколадъ долженъ имѣть совершенно гладкую поверхность, легко таять во рту и не обнаруживать зернистости. Худыя плитки шоколада легко узнать по цвѣту, который изъ красновато-коричневаго въпадаетъ въ черный оттѣнокъ, что указываетъ на то, что шоколадъ приготовленъ изъ испорченныхъ худыхъ бобовъ. Зеленоватый-же оттѣнокъ плитокъ есть признакъ того, что при толченіи зеренъ въ мѣдной ступкѣ попали въ шоколадную массу частички мѣди: очевидно, подобный шоколадъ можетъ оказаться ядовитымъ. Въ заключение можно добавить, что волокна древесины дерева доставляютъ матеріалъ для пряжи.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Зерна какао содержатъ въ себѣ масло и немного горькаго вещества. Сухія зерна почти не имѣютъ запаха, подогрѣтыя имѣютъ пріятный пряный запахъ. Влѣяніе какао на человѣческій организмъ очень хорошее; при употребленіи какао дѣятельность желудочно-кишечнаго канала становится энергичнѣе, нервная система нѣсколько возбуждается. Въ чистомъ видѣ зерна какао, истолченные въ порошокъ, даются рѣдко; обыкновенно какао варятъ въ молокѣ и въ этомъ видѣ его предписываютъ людямъ, ослабѣвшимъ послѣ перенесенныхъ тяжелыхъ болѣзней или страдающимъ слабымъ пищевареніемъ. Очень часто люди, не переносящіе никакой пищи, хорошо усваиваютъ какао, сваренное на молокѣ. Во Франціи въ большомъ употребленіи слѣдующая питательная смѣсь: 50 граммъ рисовой и столько-же картофельной муки смѣшивается съ 125 граммами сахара, 8 грам. ванили и 15 грам. какао; все это перетирается вмѣстѣ и кладется въ хорошо закупоривающіяся банки: въ $\frac{1}{2}$ литръ молока варятъ 2 чайныя ложки смѣси, отчего получается очень пріятный, полезный для желудка питательный напитокъ. Съ исландскимъ мохомъ смѣшиваютъ какао для грудныхъ больныхъ. Изъ зеренъ какао добываютъ масло, имѣющее пріятный запахъ. Масло это служитъ для приготовления нѣжно дѣйствующихъ мазей, главнымъ образомъ—для смазыванія слезистыхъ оболочекъ. Изъ соды и масла какао приготовляется мыло, очень дорогое; его употребляютъ для лица съ цѣлю улучшить питаніе кожи лица.

Какишъ, см. Козлобородникъ луговой (*Tragopogon pratensis* L.).

Какишъ,

Какишникъ, } см. Осотъ огородный (*Sonchus oleraceus* L.).

Какішъ,

Какора, см. Багульникъ болотный (*Ledum palustre* L.).

Какорва, см. Поповникъ непахучій (*Matricaria inodora* L.).

Какорва, см. Пулавка полевая (*Anthemis arvensis* L.).
 Какорожникъ, } см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officina-*
 К. кушка, } *lis* L.).
 Каль-чертовъ, см. Асса-фетида (*Ferula Assa-foetida* L.).
 Калакалуша, см. Черемуха (*Prunus Padus* L.).
 Калам акъ, см. Алойное дерево (*Aquilaria Agallochum* Roxb.).
 Калаецъ, } см. Касатикъ сибирскій (*Iris sibirica* L.).
 Калачики, }
 Калачики, см. Просвирикъ сѣверный (*Malva borealis* Wallm.).
 Калачики, см. Просвирикъ обыкновенный (*Malva rotundifolia* L.).
 Калачики, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).
 Калачникъ, см. Просвирикъ сѣверный (*Malva borealis* Wallm.).
 Калганъ (*Alphina Galanga* Sw.). Калганъ, корень аптечный. Расте-
 ніе, находящееся на Остъ-Индскихъ островахъ.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Твердое, деревянистое корневище доставляетъ такъ называемый «аптечный корень», или калганъ, отличающийся приятнымъ принымъ запахомъ и вкусомъ и употребляемый въ медицинѣ, какъ народное средство, при вялости кишечнаго пищеваренія. Большею частью калганъ входитъ въ составъ другихъ горькихъ веществъ; также изъ него приготовляется вмѣстѣ съ другими веществами такъ наз. «ароматическая настойка». Его заставляютъ на винѣ и пьютъ по рюмкѣ утромъ и вечеромъ. Калганное вино улучшаетъ аппетитъ и содѣйствуетъ пищеваренію. Калганъ дикій, см. Лапчатка-узыкъ (*Potentilla Tormentilla* Schrenk.).

Калива
 Каливка }
 Калига
 Калигва } см. Брюква (*Brassica Napus* L.).
 Калика }

Калина, см. Жимолость обыкновенная (*Lonicera Xylosteum* L.).
 Калина, см. Калина обыкновенная (*Viburnum Opulus* L.).
 Калина дикая, см. Бузина красная (*Sambucus racemosa* L.).
 Калина обыкновенная (*Viburnum Opulus* L.) фарм. назв. *Opi-*
lus s. *Sambucus aquaticus* (Cortex, Flores et Baccae). Калина
 (вездѣ), Калына, Калинина махров. наз., Снѣжки, Булденежъ
 (Boule de neige), Ягоды-Дристуха. (Таб. XVII, фиг. 93 и 94.)

Кустарникъ изъ семейства «жимолостныхъ» (*Caprifoliaceae* Juss.), выш. 1—3 сажень, распространенный почти во всей Европѣ и Россіи. Молодые ветви, черешки и нижняя поверхность листьевъ сѣрые отъ звездчатыхъ волосковъ, листья супротивные, 3—5-тилопастные, съ заостренными лопастями, крупнозубчатые; цвѣточки соцвѣтія сѣро-войлочные. Бѣлые цвѣты въ плоскихъ зонтикообразныхъ соцвѣтияхъ, краевые цвѣтки имѣютъ колесовидный вѣничекъ, безплодны и круше внутреннихъ обоеполовыхъ цвѣт. въ окраина чашечки 5-тизубчатая, остающаяся; вѣничекъ 5-тираздѣльный; тычинокъ 5; столбикъ короткій, коническій, съ трехраздѣльнымъ рыльцемъ; завязь 1—3-хгнѣздная; плодъ—черныя костянки съ одной косточкой, съѣдобны. Кали-

на растеть обыкновенно въ лѣсахъ, между кустарниками. Цвѣтеть въ началѣ лѣта. Разводится иногда въ садахъ; у одной изъ садовыхъ формъ—«булденежъ», всѣ цвѣты махровые, т. е., бесплодные, крупные, и собраны въ густыя бѣлыя, какъ снѣгъ, шаровидныя соцвѣтїя.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Цвѣты и плоды калины употребляютъ въ народной медицинѣ. Отваръ цвѣтовъ калины, также ея варенныя ягоды имѣютъ слегка вяжущій вкусъ. Отваромъ калины полощатъ ротъ отъ охриплости и боли при глотанїи, причемъ выпиваютъ на ночь стаканъ теплаго, подслащеннаго медомъ, отвара сушеныхъ цвѣтовъ калины. Калиновыя зерна примѣниваютъ къ обыкновеннымъ кофейнымъ зернамъ, жарятъ и пьютъ вмѣсто кофе. Иногда пьютъ кофе и изъ однихъ калиновыхъ сѣмянъ. Такой кофе совѣтуютъ отъ запоровъ. Изъ зрѣлыхъ ягодъ крестьянки варятъ кисель, который называютъ «калинникъ». Изъ ягоднаго сока готовится уксусъ.

Калина черная, см. Гордовина (*Viburnum lantana* L.).

Калинина, см. Калина обыкновенная (*Viburnum Opulus* L.).

Калитка, см. Брюква (*Brassica Napus* L.).

Калиферъ, см. Калуферъ (*Tanacetum Balsamita* L.).

Калмусъ, см. Аиръ обыкновенный (*Acorus calamus* L.).

Калужница, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).

Калужница болотная (*Caltha palustris* L.). Фарм. назв. *Caltha palustris*, s. *Populago* (Fol. и Fl.). Баламайка (Никол. у., Волог. губ.), Балахъ (Сл. Церк.), Балахъ, Вороньи глазки (Кал.), Калужница, Калужница (Малор.), Козелець (Смол.), Лататта (Малор.), Лягушечникъ (Никол. у., Волог. г.), Нюньки (Бѣлор.), Люньки (Вор.), Попики (Малор.), Болотный фіалокъ (Кондр.), Бѣлокопытникъ (Тамб.), Мачиха (Волог., Сар.), Куриная слѣпота (Вятск.), Курослѣпъ желтый, Курослѣпникъ, Слѣпокуръ, Латагье (Екат., Полт., Киев.), Лотоники (Киев.), Лотонъ, Лотатъ, Латагъ (Малор.), Кубышка болотная (Нижег.), Лопухъ, Лопушка (Мог., Киев.), Пригодная лопуха (Арх.), Болотный лопухъ (Ниж.), Бобовникъ, Бобокъ, Волки (Арх.), Ноготный цвѣтъ, Болотные ноготки (Тамб.), Змѣйка водяная, Змѣй-трава, Коровій цвѣтъ, Желтокъ яичный, Маювка (смѣш. съ польск.).

Травянистое многолѣтнее растеніе изъ семейства «лютиковыхъ» (*Ranunculaceae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и Россїи. Все растеніе голое; стебель приподнимающійся, листья блестящіе, голые, нижніе—сердцевидные, верхніе—почковидные, городчатые. Цвѣты золотисто-желтые, блестящіе. Чашечка изъ 5 желтыхъ листочковъ, лепестковъ нѣтъ; тычинокъ много, пыльники раскрываются продольными щелями; плодъ состоитъ изъ 5—10 листовокъ. Растетъ при берегахъ, въ канавахъ и на болотахъ. Цвѣтеть весною.

Въ народѣ обыкновенно свѣжіе листья калужницы прикладываются при ожогѣ.

Калужница европейская, см. Купальница европейская (*Trollius europaeus* L.).

Калузъ, см. Арнаутка (*Triticum durum* Desf.).

Калуферъ (*Tanacetum Balsamita* L.). Фарм. назв. *Balsamita s. Mentha sarracenicica, s. Costus hortensis, s. Mentha romana, s. Tanacetum hortense* (*Herba et Semen.*). Афанасія, Девятильникъ благовонный (Кашписк.), Колуферъ (Бѣл. Пос.), Канушрь (Малор.), Кануперъ, Кануферъ (Малор.), Канупиръ (Екат.), Калиферъ, Рябинничикъ (Малор.), Шпанская ромашка. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное на Кавказѣ и въ Малой Азіи, прижатобло-пушистое, съ приподнимающимся наверху вѣтвистымъ стеблемъ. Листья продолговато-эллиптическіе, тупые при основаніи съ нѣсколькими линейными долями, въ прочемъ—цѣльные городчато-пильчатые. Головка цвѣтовъ средней величины, въ щиткахъ; листочки обертки при верхушкѣ черноватые, краевые язычковые женскіе цвѣтки красноватые, столь-же длинныя, какъ обертка; обыкновенно ихъ нѣтъ; срединныя обоеполовые цвѣтки трубчатые, съ круглою или сжатой трубочкой; тычинокъ 5, прикрѣпленныхъ нитями къ трубочкѣ вѣнчика; пыльники линейные, сросшіеся между собою въ трубочку, черезъ которую проходитъ пылевидный столбикъ, въ мужскихъ цвѣтахъ нераздѣльный, въ плодущихъ—на верхушкѣ двулопастный, причѣмъ лопасти притуплены и кистисты. Завязь нижняя одногнѣздная; плодъ—сѣмянка съ 5 гранями. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Разводится въ садахъ. Траву его собираютъ въ іюлѣ и въ іюнѣ; разводятъ его черезъ раздѣленіе и разсаживаніе корней. Калуферъ любитъ почву, преимущественно, открытую и прогрѣваемую лучами солнца, и отличается сильнымъ благовоннымъ запахомъ и горькимъ прянымъ вкусомъ. Прежде употребляли его, какъ пряность, для приправы кушаньевъ и конфетъ, нынѣ-же употребленіе его въ этомъ смыслѣ почти неизвѣстно. Калуферъ разводятъ теперь въ садахъ только для добыванія благовонной воды и листьевъ, которыми ради запаха перекладываютъ бѣлье и платье. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ свѣжій калуферъ кладутъ въ постели противъ блохъ и прочихъ насѣкомыхъ. Въ Германіи его прибавляютъ съ нѣкоторыми другими травами въ пиво, чтобы придать послѣднему пріятный, нѣсколько пряный вкусъ и замѣнить хмель.

МЕДИЦИНСКАЯ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Калуферъ извѣстенъ, какъ народное средство. Въ аптекахъ трава калуфера употребляется для приготовленія различныхъ ароматическихъ сборовъ, въ составъ которыхъ входятъ, кромѣ того, мята, душица и богородская трава. Для внутренняго употребленія собираютъ цвѣты и листья калуфера, сушатъ ихъ и готовятъ обыкновенный отваръ, какъ чай; одну-две чайныя ложки травы завариваютъ стаканомъ кипятка и пьютъ чашками отъ болей въ животѣ, зависящихъ отъ скопленія газовъ въ кишечникѣ.

Отвару калуфера приписываютъ свойство прогонять глистовъ. Извѣстный ботаникъ Линней считалъ калуферъ противодѣйствіемъ опія; кромѣ того, калуферъ считается въ народѣ мочегоннымъ сред-

- ствомя и употребляется отъ водянки. Кромѣ отвара изъ сушеныхъ цвѣтовъ и листьевъ, приготовляютъ настойку на винѣ; изъ свѣжихъ листьевъ калуфера выжимаютъ сокъ и даютъ его черезъ 2 часа по столовой ложкѣ отъ блѣдной немочи и водянки.
- Калына, см. Калина обыкновенная (*Viburnum Opulus* L.).
- Калужникъ, см. Астрагалъ солодколистный (*Astragalus glycyphyllos* L.).
- Калужница, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).
- Каляга } см. Брюква (*Brassica Napus* L.).
- Калярепа }
- Камала, см. Обезьянное дерево (*Mallotus philippinensis* Mill.).
- Каманика, см. Ежевика обыкновенная (*Rubus fruticosus* L.).
- Камуничникъ, см. Сивецъ (*Scabiosa succisa* L.).
- Каменка, см. Костяника (*Rubus saxatilis* L.).
- Каменика, см. Ежевика обыкновенная (*Rubus fruticosus* L.).
- Каменика, см. Куманика (*Rubus caesius* L.).
- Каменика, см. Костяника (*Rubus saxatilis* L.).
- Каменица, см. Куманика (*Rubus caesius* L.).
- Кам-ница, см. Морошка (*Rubus chamaemorus* L.).
- Каменица, см. Костяника (*Rubus saxatilis* L.).
- Каменица, см. Донникъ бѣлый (*Mellilotus alba* Desf.).
- Каменица, см. Костяника (*Rubus saxatilis* L.).
- Каменичникъ, см. Костяника (*Rubus saxatilis* L.).
- Каменный кустъ, см. Азалея желтая (*Azalea pontica* L.).
- Каменная трава, см. Многоножка тройчатая (*Polypodium dryopteris* L.).
- Каменоломъ, см. Бедренецъ обыкновен. (*Pimpinella saxifraga* L.).
- Каменоломникъ, см. Селезеночникъ очереднолистный (*Chrysosplenium alternifolium* L.).
- Камикъ трава, см. Плаунъ живородящій, дерябникъ (*Lycopodium Selago* L.).
- Каминъ, см. Сушеница тѣсная (*Gnaphallum silvaticum* L.).
- Камнеломъ, см. Конскій укропъ (*Oenanthe Phellandrium* Lam.).
- Камнеломъ, см. Земляные орѣшки (*Spiraea filipendula* L.).
- Камнеломка, см. Камнеломка супротивнолистная (*Saxifraga oppositifolia* L.).
- Камнеломка, см. Камнеломка желтая (*Saxifraga aizoides* L.).
- Камнеломка, см. Камнеломка клубеньковая или зернистая (*Saxifraga granulata* L.).
- Камнеломка желтая (*Saxifraga aizoides* L.). Низенькая (выш. всего 3½ вершк.) альпійская травка, образующая иногда небольшие дерновинки, многотынная, изъ семейства «камнеломковыхъ» (*Saxifragaceae* Dc.), распространенная въ горахъ Европы и произрастающая на крайнемъ сѣверѣ Европейской Россіи. Листья очередные, линейно-ланцетные, толстоватые и блестящіе; желтые цвѣты въ рыхлыхъ кистяхъ. Чашечка 4—5-раздѣльная, вѣнчикъ 4—5-тылестный; тычинокъ столько-же или вдвое больше; плодъ—коробочка. Цвѣтетъ лѣтомъ.
- Камнеломка клубеньковая или зернистая (*Saxifraga gra-*

nulata L.). Фарм. назв. *Saxifraga alba*. Многолѣтняя трава изъ семейства «камнеломковыхъ» (*Saxifragaceae* Dc.), распространенъ почти во всей Европѣ и въ западной Россіи. Стебель выш. 3—9 вершк., простой или слабо развѣтвленный, съ малыми и новидными луковичками въ пазухахъ листьевъ. Прикорнев. листья длинно-черешковые, почковидные, крупно-городчатъ-стеблевые—клиновидные, спереди надрѣзанные, иногда цель. крайніе. Бѣлые довольно крупныя цвѣты расположены шити виднымъ полузонтикомъ. Чашечка 4—5-тираздѣльная, съ продолговато-ланцетными простертыми долями; лепестковъ 5, бѣлыхъ вдвое превышающихъ доли чашечки; тычинокъ 10; завязь пол. нижняя; столбикъ 2, остающихся; плодъ—двугнѣздная мног. сѣмянная коробочка съ сѣмяночкомъ посреди перегородки, ра. крывающаяся на верхушкѣ, между ея долями, отверстиемъ. Р. стетъ на лугахъ, холмахъ, опушкѣ лѣсовъ. Цвѣтетъ съ мая по июл.

Камнеломка супротивнолистная (*Saxifraga oppositifolia* L.) Ползучая многолѣтняя травка, образующая дерновинки, изъ семейства «камнеломковыхъ» (*Saxifragaceae* Dc.), встрѣчающаяся на высокихъ горахъ въ Европѣ и на крайнемъ сѣверѣ Европей. ской Россіи и Сибири. Стебель нитевидный, очень вѣтвистый дл. 2—5 вершковъ, съ супротивными, тѣсно-сближенными, об. ратно-лицевидными листьями. Многочисленные, сперва пурп. ровые, потомъ фіолетовые цвѣты сидятъ поодиночкѣ на корот. кихъ прямостоящихъ вѣтвяхъ. Цвѣты правильные; чашечка 4—5-тираздѣльная, вѣнчикъ 5-тилепестный; тычинокъ 10; плодъ—коробочка. Цвѣтетъ обыкновенно въ май и въ началѣ лѣта. (Таб. XVII, фиг. 95).

Камочка, см. Зольникъ калийный (*Salsola Kali* L.).

Кампетъ

Кампегеовое дерево } см. Сандальное дерево (*Haematoxylon Cam-*
pechianum L.).

Кампетникъ

Камуницъ, см. Сивецъ (*Scabiosa succisa* L.).

Камфорное дерево (*Camphora officinarum* N. u. E., *Sin. Laurus Camphora* L.). Высокое, 4—5 сажень, дерево, родомъ изъ Китая и Японіи, культивируемое съ успѣхомъ въ Остѣ-Индіи и на Антильскихъ островахъ, съ вѣчно зелеными, яйцевидными блестящими листьями и маленькими бѣлыми вверхъ стоящими цвѣтами, образующими кистеобразныя соцветія. Всѣ части дерева, особенно-же корни, отличаются сильнымъ камфорнымъ запахомъ и вкусомъ; въ расщелинахъ древесины находятъ кам. фору ввидѣ маленькихъ зеренъ грязновато-сѣраго цвѣта; въ такомъ видѣ она препровождается въ Европу, гдѣ ее очищаютъ. Такъ называемая «бѣлая» камфора добывается изъ корней, кусочковъ древесины, коры, вѣтвей и листьевъ, для чего ихъ мелко рѣжутъ, переливаютъ водою, подвергаютъ сильному кипяченію, послѣ котораго получается осадокъ камфоры ввидѣ маленькихъ зеренъ. Чистая камфора представляетъ изъ себя кристаллическую бѣлую и легко воспламеняющуюся массу, съ своеобразнымъ вкусомъ и запахомъ; камфора улетучивается легко

даже при обыкновенной температурѣ и совершенно растворяется въ спиртѣ, эфирѣ и маслахъ; по вѣсу она легче воды.

Древесина дерева цѣнится весьма дорого и идетъ на выдѣлку мебели.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Камфора имѣетъ обширное применение въ медицинѣ.

Впервые о камфорѣ упоминается въ медицинскихъ сочиненіяхъ на санскритскомъ языкѣ въ IV столѣтіи по нашему лѣтоисчисленію. У китайцевъ камфора извѣстна съ VII столѣтія. Къ намъ она перешла отъ индусовъ. Серьезное изученіе надъ вліяніемъ камфоры на животныхъ и человека было начато въ Европѣ въ концѣ прошлаго столѣтія.

При приемѣ малыхъ дозъ камфоры (отъ 0,06 до 0,7 грм. = 1 до 2 гранъ) очень замѣтныхъ измѣненій въ общемъ состояніи не замѣчается. Во рту камфора возбуждаетъ горькій вкусъ, съ послѣдующимъ жгучимъ и затѣмъ охлаждающимъ ощущеніемъ; въ желудкѣ малые приемы вызываютъ ощущеніе теплоты, появляется отрыжка, даже увеличенное развитіе кишечныхъ газовъ и болѣе частыя испражненія, дыханіе немного учащается. Мозговая дѣятельность отъ малыхъ приемовъ возбуждается, мысли идутъ оживленнѣе, движенія дѣлаются быстрые, по всему тѣлу разливаются пріятная теплота. Если при этомъ состояніи увеличиваютъ еще приемъ камфоры, то возбужденіе становится еще сильнѣе, лицо краснѣетъ, глаза получаютъ блескъ, становятся чувствительными къ свѣту, но черезъ нѣкоторое время наступаютъ обратныя явленія: появляется боль и чувство тяжести въ головѣ, расстройство зрѣнія, головокруженіе, дрожаніе рукъ и вообще явленія какъ-бы опьяненія, доходящія до потери сознанія; но всѣ эти явленія довольно быстро проходятъ. Опыты съ большими приемами камфоры, отъ 24—75 грм. (1,5—5,0 грм.), показали слѣдующее. Въ желудкѣ появляется боль, и часто камфора выбрасывается обратно рвотою, кожа блѣднѣетъ и покрывается холоднымъ клейкимъ потомъ, сердце начинаетъ биться медленнѣе обыкновеннаго, дыханіе также замедляется до того, что становится едва замѣтнымъ, появляется чувство тоски, звонъ въ ушахъ, головокруженіе, галлюцинаціи зрѣнія, иногда даже дикая пляска, мысли пугаются, затѣмъ наступаетъ потеря сознанія, судороги и, наконецъ, сопорозное состояніе, смѣняющееся сномъ, послѣ котораго больные большею частью черезъ нѣсколько часовъ оправляются совершенно, хотя извѣстны случаи и смертельнаго отравленія камфорой.

Врачи даютъ камфору большею частью въ малыхъ приемахъ для временнаго возбужденія нервной системы, главнымъ образомъ, въ періодъ упадка сердечной дѣятельности при брюшномъ тифѣ, при воспаленіи легкихъ и при другихъ лихорадочныхъ заболѣваніяхъ, какъ-то при дифтеритѣ, скарлатинѣ, кори, рожѣ и при тяжелой перемежающейся лихорадкѣ. Въ настоящее время врачи во всѣхъ случаяхъ сильной слабости больного дѣлаютъ подкожныя впрыскиванія камфорнаго масла. Соединеніе камфоры съ бромомъ—бромистая камфора, за послѣдніе годы имѣетъ

обширное примѣненіе среди врачей-спеціалистовъ по нервнымъ болѣзнямъ. Малые пріемы бромистой камфоры 0.1 грм. (1 гранъ) поднимаютъ дѣятельность нервной системы и улучшаютъ настроеніе духа у людей, страдающихъ слабостью нервной системы, такъ называемой нейрастеніей. Такіе малые пріемы повторяются днемъ два два-три и даются въ теченіе довольно долгаго времени: отъ мѣсяца до 6—8 недѣль. Бромистую камфору назначаютъ также отъ бѣлой горячки, отъ истерическихъ судорогъ и повралгій. Снаружи камфора употребляется, главнымъ образомъ, въ видѣ камфорнаго масла, для чего камфору растворяютъ съ прованскимъ масломъ (1 часть камфоры растворяется въ 9 частяхъ масла) или въ видѣ камфорнаго спирта (1 часть камфоры растворяется въ 9 частяхъ 90-проц. спирта). Камфора вызываетъ красноту на кожѣ, потому и служитъ, какъ средство, отвлекающее кровь отъ больныхъ глубоколежащихъ органовъ. Кроме того, камфора убиваетъ паразитовъ. Порошкомъ камфоры присыпаютъ гангренозные язвы.

Противопоказаніемъ къ внутреннему назначенію камфоры служитъ старость, сопровождающаяся наклонностью кровеносныхъ сосудовъ головного мозга къ разрыву, предрасположеніе къ легочнымъ кровотечениямъ, къ кровотеченію изъ почекъ и существующее воспаленіе желудка и почекъ.

Камфора считается противоядіемъ при отравленіи опіемъ и другими растительными ядами. Принимается камфора чаще всего въ порошкахъ; въ микстурѣ она растворяется въ слизистыхъ отварахъ и вообще принимается неохотно, ввиду ея жгучаго вкуса и непріятнаго запаха. Бромистую камфору врачи прописываютъ большею частью въ пилюляхъ съ бромистой хиной и валеріановымъ корнемъ.

Въ гомеопатіи камфора въ спиртномъ растворѣ дается при сильной слабости, при судорогахъ, при холерѣ, сопровождающейся судорогами въ икрахъ, холодомъ въ тѣлѣ, сильной тоской и болью въ подложечной области. Такъ-же, какъ и въ аллопатіи, гомеопаты считаютъ камфору противоядіемъ противъ растительныхъ ядовъ.

Въ ветеринарной медицинѣ камфора также служитъ возбуждающимъ средствомъ при всѣхъ явленіяхъ слабости животныхъ, въ особенности слабости нервной системы, которая наступаетъ или вслѣдъ за перенесенными физическими страданіями, или послѣ продолжительнаго лихорадочнаго состоянія. Камфора увеличиваетъ немного отдѣленіе пота, потому ее даютъ животнымъ также при ревматизмѣ. Лошадямъ даютъ 1.0—7.5 грм. (16 гранъ до полторы драхмы); рогатому скоту до 15 грм. (4 драхмы); овцамъ и свиньямъ отъ 0.5 до 1.0 грм. (8—16 гранъ); собакамъ 0.1—1 грм. (1—16 гранъ). Эти дозы считаются большими и даются только въ тяжелыхъ случаяхъ, обыкновенно-же дозы даются значительно меньшія и въ раздѣльныхъ пріемахъ. Животнымъ камфору даютъ въ слизистомъ растворѣ изъ крахмала или яичныхъ бѣлковъ. Также ее примѣниваютъ къ кашкѣ, предварительно разведя въ спиртѣ или-же смѣшавъ съ желткомъ или гуммиарабикомъ.

Большіе приёмы повторяютъ только послѣ того, какъ исцезнутъ всѣ явленія возбужденія, наступающія послѣ приёма камфоры.

Въ ветеринарной гомеопатіи камфору даютъ животнымъ при лихорадкѣ съ упадкомъ силъ, при гриппѣ, при столбнякѣ и ревматизмѣ у лошадей. На приёмъ дается 4—5 капель спиртнаго раствора камфоры.

Камчадалка, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).

Камчакъ, см. Зольникъ калийный (*Salsola Kali* L.).

Камчугъ, см. Кошачья лапка (*Antennaria dioica* Gaertn.).

Камчугъ, см. Аютины глазки (*Viola tricolor* L.).

Камчужникъ, см. Мащетка обыкн. (*Alchemilla vulgaris* L.).

Камчужная трава, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).

Камчужная трава, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).

Камчужница, см. Гусиная лапка (*Potentilla anserina* L.).

Камышъ, см. Аиръ обыкновенный (*Acorus calamus* L.).

Камышъ, см. Тростникъ обыкновенный (*Arundo Phragmites* L.).

Камышъ, см. Пальма тростниковая (*Calamus Rotang* L.).

Камышъ, см. Ситнягъ (*Echinocharis palustris* B. Br.).

Камышъ, см. Канарейникъ тростниковый (*Phalaris arundinacea* L.).

Камышъ, см. Камышъ озерной (*Scirpus lacustris* L.).

Камышъ, см. Камышъ болотный (*Scirpus palustris* L.).

Камышъ, см. Камышъ лѣсной (*Scirpus sylvaticus* L.).

Камышъ, см. Ковыль волосистый (*Stipa capillata* L.).

Камышъ болотный (*Scirpus palustris* L.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «осоковыхъ» или иначе «ситовниковыхъ» (*Cyperaceae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и весьма обыкновенное въ Россіи. Корневище ползучее, образованное изъ нижнихъ междоузлій слѣдующихъ одинъ за другимъ побѣговъ. Цилиндрическій безлистный стебель окруженъ при основаніи листовыми красно-бурыми влагалищами. Цвѣты въ одиночныхъ верхушечныхъ продолговатыхъ колоскахъ; въ составъ каждаго колоска входятъ нѣсколько спирально-расположенныхъ пленокъ (прицвѣтныхъ чешуй, яйцевидныхъ, буроватыхъ, съ перепончатыми бѣлыми краями и зеленою полоской на спинкѣ); въ пазухѣ каждой пленки заключается по одному цвѣтку, нижнія 1—2 пленки безплодны. Цвѣтки обоополовые и однополовые; околоцвѣтникъ состоитъ изъ небольшого числа щетинокъ; тычинокъ 3, съ нитями и двугнѣздными пыльниками; завязь одностнѣздная, съ однимъ при основаніи утолщеннымъ столбикомъ и 2 нитевидными рыльцами; плодъ—обратнояйцевидный орѣшекъ, съ мучнистымъ бѣлкомъ. Камышъ болотный растетъ на сырыхъ и болотистыхъ мѣстахъ, цвѣтетъ лѣтомъ. (Рис. 94.)

Камышъ боровой, см. Плакунъ трава (*Lythrum salicaria* L.).

Камышъ лѣсной (*Scirpus sylvaticus* L.). Лепешникъ, Лепеха (Малор.), Марголя, Осока болотная, Дикій осотъ. Многолѣтнее травянистое растеніе, изъ семейства «осоковыхъ», или «ситовнико-

выхъ» (*Suregaseae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и весьма обыкновенное во всѣхъ мѣстностяхъ Россіи. Стебель лѣсного камыша облиственный, тупо-трехгранный, выш. $13\frac{1}{2}$ —29 вершковъ. Листья линейные, плоскіе. Цвѣты въ колоскахъ, сученныхъ по 3—5 пучками, собранными въ очень вѣтвистое метельчатое соцвѣтіе; въ составъ каждого колоска входятъ нѣсколько продолговато-яйцевидныхъ, на верхушкѣ коротко-заостренныхъ, черноватыхъ иленокъ (прицвѣтныхъ чешуй, прилегающихъ другъ къ другу, на подобіе череницы, и заключающихъ въ пазухѣ каждая по одному цвѣтку); цвѣтки однополые или обоеполые, тычинокъ 3; завязь одногнѣздная, съ однимъ нитевиднымъ столбикомъ, заканчивающимся тремя нитевидными рыльцами. Плодъ — орѣшекъ. Растетъ на болотахъ, въ лѣсахъ, на сырыхъ лугахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. (Рис. 95.)

Камышъ озерный (*Scirpus lacustris* L.). Фармацевтическое названіе озернаго камыша: *Scirpus major* s. *Juncus maximus*. Камышъ (въ б. ч. Россіи), **Камышъ** (Малор.), Куга (Ворон., Малор., Екат.), Окуга (у Кирг.), Кура, Микалки (цвѣт. въ Астр. губ.), Ожюна (Малор.), Обручная трава (Пет.), Оситнякъ (Малор.), Рогизъ, Рогоза, (Малор.), Сита (Псков.), Ситникъ, Ситнокъ, Ситовникъ (Сл. Ц.), Треста (Пск., Твер.), Хвощъ озерный (Сар.) Травянистое многолѣтнее растеніе изъ семейства «осоковыхъ», или «ситовниковыхъ» (*Suregaseae* Juss.), весьма обыкновенное въ Европѣ и въ Россіи. Корневище толстое, ползучее; стебель, выш. $1\frac{1}{2}$ —3 арш., цилиндрический, безлистный, при основаніи съ красно-бурыми листовыми влагалищами. При соцвѣтіи находится обертка изъ небольшого числа (1—3) листьевъ, неравной величины; цвѣты въ колоскахъ, собранныхъ пучками и расположенныхъ метельчато; въ составъ каждого колоска входятъ нѣсколько овальныхъ красно-бурыхъ гладкихъ иленокъ, прикрывающихъ другъ друга на подобіе черепицы и заключающихъ въ пазухѣ по одному цвѣтку; тычинокъ 3; завязь одногнѣздная, съ однимъ столбикомъ и 3 нитевидными рыльцами. Плодъ — орѣшекъ. Растетъ на болотахъ, озерахъ и прудахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Стебли камыша употребляются для плетенія. (Таб. XVII, фиг. 96.)

Камышъ песочный (*Ammophila arenaria* Host.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), произрастающее на морскихъ берегахъ сѣв. Европы. Стебель достигаетъ $1\frac{1}{2}$ арш. выш. Благодаря развѣтвленному ползучему корневищу, растеніе служитъ для укрѣпленія песковъ и песчаныхъ береговъ. Корневище въ Исландіи употребляется въ пищу.

Камышъ песчаный, см. Колоснякъ песч. (*Elymus arenarius* L.).

Камышъ степовой, см. Вѣйникъ наземный (*Calamagrostis epigeios* Roth).

Камышникъ, см. Тростникъ высокій (*Arunda Donax* L.).

Камышникъ, см. Бѣлзоръ болотный (*Parnassia palustris* L.).

Камышникъ, см. Метла или Мышій тернъ (*Ruscus aculeatus* L.).

Канаборникъ, см. Багульникъ болотный (*Ledum palustre* L.).

Канавра борова, } см. Верескъ обыкновенный (*Calluna vulgaris*
Канабренникъ, } *Salisb.*)

Канаръ, см. Овесъ обыкновенный (*Avena sativa* L.).

Канареечное сѣмя } см. Канарейное сѣмя (*Phalaris canariensis* L.).
Канарейкина трава }
Канарейникъ }

Канарейникъ тростниковый (*Phalaris arundinacea* L. sin. *Baldingera arundina*). Фармацевтическое названіе *Gramen pictum*. Баклаунъ, Батлаукъ (Хар., Черняев.), Житовникъ, Камышъ (Тв.), Пырей (Моск., Желѣзн.), Тростя (Тв.), Турецкая трава (съ польскаго), Шелковая трава, Шовкова трава (Малороссія). Травянистое многолѣтнее растеніе изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), довольно сильно распространенное почти по всей Европѣ и извѣстное во всѣхъ мѣстностяхъ Россіи. Стебель тростниковаго канарейника выш. 11—22 вершк., съ длинными и довольно широкими листьями. Мелкіе невзрачныя цвѣты въ многоцвѣтковыхъ колоскахъ, собранныхъ продолговатою, послѣ цвѣтенія сжатую, метелкою, съ короткими вѣтвями; на которыхъ скученно сидятъ многочисленныя колоски. Двѣ нижнія чешуи колоска, наз. створками, или колосковыми чешуями, клиновидныя на спинкѣ, не крылатыя, длиннѣе пленокъ, коими снабженъ каждый цвѣтокъ; изъ нихъ 2 большія принадлежатъ плодущему цвѣтку, а 2 малелькія недоразвившемся безплодному. Колоски пестро-красныя, въ тѣнистыхъ мѣстахъ желтовато-зеленыя. Околоцвѣтникъ замѣненъ 2—3 маленькими нижними пленочками, которыя, согласно новѣйшимъ изслѣдованіямъ, должно скорѣе считать прицвѣтничками. Тычинокъ 3; завязь одногнѣздная, односѣмянная, съ 2 столбиками, несущими перистыя рыльца. Плодъ—зерновка. Растетъ по берегамъ рѣкъ, прудовъ, на сырыхъ лугахъ и болотахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Особый сортъ, извѣстный подъ названіемъ «ленточной травы» (*Phalaris picta* L.), часто разводится въ садахъ. (Рис. 96.)

Канарейное сѣмя (*Phalaris canariensis* L.). Канарейкина трава, Канарейникъ, Кишарисное сѣмя. Канарейное сѣмя есть однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), родомъ изъ сѣв. Африки, растетъ въ южной Европѣ и изрѣдка попадается въ одичаломъ состояніи на сорныхъ мѣстахъ и около жилищъ въ западной, средней и южной Россіи. Прямостоячій стебель несетъ на верхушкѣ овальную плотную метелку. Створки, или колосковыя чешуи (двѣ нижнія чешуи колоска), снабжены на спинкѣ цѣльнокрайнимъ крыломъ. Колоски бѣловатыя, вдоль крыльевъ зеленые. Тычинокъ 3; завязь одногнѣздная, односѣмянная, съ 2 столбиками, несущими перистыя рыльца. Плодъ—зерновка. Зерна канарейнаго сѣмени составляютъ любимую пищу канареекъ и другихъ пѣвчихъ птицъ. Въ южной Европѣ муку, получаемую изъ зеренъ растенія, примѣниваютъ къ шпеничной и пекутъ изъ нея хлѣбъ. (Рис. 97.)

Канарникъ борова, см. Верескъ обыкновенный (*Calluna vulgaris* *Salisb.*).

Канарскій чай (*Sida canariensis* Willd.). Растеніе родомъ изъ Остъ-Индіи. Волокна употребляютъ на пряжу; на Канарскихъ островахъ его употребляютъ вмѣсто настоящаго чая.

Канатникъ, см. Грудничникъ (*Abutilon Avicennae* Gärtn.).

Канаторъ, см. Василекъ луговой (*Centaurea jacea* L.).

Кандыкъ, см. Собачій зубъ (*Erythronium Dens Canis* L.).

Канибра, см. Верескъ обыкновенный (*Calluna vulgaris* Salisb.).

Кандобра, см. Багульникъ болотный (*Ledum palustre* L.).

Канѡпа, см. Конопля посѣвная или обикн. (*Cannabis sativa* L.).

Каноперевиць } см. Перечникъ широколистный (*Lepidium latifolium* L.).

Кануперъ, см. Калуферъ (*Tanacetum Balsamita* L.).

Кануперъ полевой, см. Буквица лекарственная (*Betonica vulgaris* L.).

Канупиръ

Канупиръ } см. Калуферъ (*Tanacetum Balsamita* L.)

Кануферъ

Канцелярское сѣмя, см. Лалчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).

Канцелярскій корень, см. Дивала однолѣтняя (*Scleranthus annuus* L.).

Капыготникъ, см. Бѣлокрыльникъ болотный (*Calla palustris* L.).

Каперсовый кустъ (*Capparis spinosa* L.). Каперсы, Каперсы.

Кустъ изъ семейства «каперсовыхъ» (*Capparidaceae*), родомъ изъ сѣв. Африки и средней Азіи, свободно произрастающій по всемъ южнымъ странамъ Европы. Корень каперсоваго куста длинный, деревянистый, развѣтвленный и покрытый толстою корой; стебли вѣтвистые, гладкіе, высотой отъ 3—4 фут. Листья поперечные, овально-округленные, б. ч. тупые, иногда заостренные, зеленые, мягкіе, съ обихъ сторонъ покрыты короткими волосами, цѣлюкрайне, на короткихъ нѣсколько члунистыхъ черешкахъ, снабженные двумя шиповатыми, острыми, изогнутыми прилистниками. Большіе цвѣточки сидятъ по одному въ пазухахъ листьевъ на цвѣтоножкахъ дл. отъ 3—4 дюймовъ. Чашечка неправильная, изъ 4 неровныхъ, крестообразно расположенныхъ и лодкообразно вогнутыхъ, чашелистиковъ; вѣнчикъ неправильный, состоящій изъ 4 неровныхъ большихъ по величинѣ чашелистиковъ, лепестковъ; два верхнихъ лепестка, выпрямленные по краямъ, неровные, при основаніи ноготковые; два нижнихъ нѣсколько больше и весьма неправильные; тычинки многочисленныя (60—80), весьма длинныя; завязь однолѣстная, многосѣмянная, съ короткимъ стебелькомъ и головчатымъ рыльцемъ. Плодъ грушеобразный, мясистый, заключающій въ мякоти большое число сѣмянъ.

Каперсовый кустъ разводится во многихъ странахъ Европы на поляхъ и въ садахъ. Всего болѣе занимаются воздѣлываніемъ его во Франціи между Тулономъ и Марселемъ, гдѣ имъ покрыты цѣлыя обширныя пространства. Разводится онъ очень удобно отдѣленіемъ отростковъ отъ старыхъ кустовъ; разрастаетъ

ся онъ очень скоро, но боится холода. почему на зиму обрѣзываютъ его побѣги на разстояніи 7 дюймовъ отъ земли и накрываютъ кусты землею. По наступленіи весны, ихъ откапываютъ по шейку корня и даютъ расти; въ началѣ лѣта являются уже на молодыхъ вѣтвяхъ цвѣты, которые разворачиваются другъ за другомъ до самой осени. Каперсы вообще любятъ мѣста открытыя и легко переносятъ жару и засуху. Цвѣточные почки каперса, называемыя «каперсы», употребляются въ пищу; собираютъ ихъ въ продолженіе всего лѣта; какъ скоро начинаютъ появляться на каперсовыхъ кустахъ цвѣтки, женщины и дѣти ходятъ каждое утро обрывать готовящіяся распускаться почки; послѣ сбора ихъ раскладываютъ часа на три или четыре въ тѣнистомъ мѣстѣ, чтобы онѣ завяли и не могли распуститься, потомъ кладутъ въ сосудъ, наполненный уксусомъ, накрываютъ и оставляютъ на 8 дней. По истеченіи этого времени ихъ вынимаютъ, слегка выжимаютъ и кладутъ еще на 8 дней въ свѣжій уксусъ; затѣмъ, повторивъ еще 1 разъ это дѣйствіе, раздѣляютъ почки различной величины съ помощью рѣшетъ съ отверстиями различной величины. Самые мелкіе каперсы считаются лучшими. Послѣ разбора укладываютъ каперсы разныхъ сортовъ въ боченки съ уксусомъ, прибавляя иногда въ нихъ нѣсколько соли. Въ продажѣ предпочитаютъ тѣ каперсы, которые сохранили свой зеленый цвѣтъ, для чего продавцы очень часто подмѣшиваютъ мѣдъ, которая, какъ извѣстно, придастъ зеленую окраску, но очень вредна для здоровья.

Каперсы имѣютъ ѣдкій, острый вкусъ и обладаютъ возбуждающими свойствами, чрезмѣрное употребленіе ихъ вредно для здоровья.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ медицинѣ каперсы употребляются только, какъ народное средство. Ихъ отвариваютъ въ водѣ и ѣдятъ съ уксусомъ и масломъ при увеличеніяхъ селезенки. Горькіе листья или-же кора растенія отваривается и принимается отъ водяной болѣзни. Изъ листьевъ для этой-же цѣли готовятъ салатъ. Каперсы, см. Каперсовый кустъ (*Capparis spinosa* L.). Каперсы стручковатыя, см. Ярмометъ (*Zygophyllum Fabago* L.).

Каперы дикіе, см. Борщевикъ сибирскій (*Heracleum sibiricum* L.).

Каплуны, см. Шалфей луговой (*Salvia pratensis* L.).

Капорка, см. Папоротникъ черный (*Struthiopteris germanica* L.).

Капорсы, см. Каперсовый кустъ (*Capparis spinosa* L.).

Каприфоль, см. Жимолость душистая (*Lonicera Caprifolium* L.).

Каприфоль дикая, см. Жимолость вьющаяся (*Lonicera Periclymenum* L.).

Каптурникъ, см. Хлопушка (*Silene inflata* Smth.).

Капуста, см. Капуста огородная (*Brassica oleracea* L.).

Капуста башкирская, см. Куслецъ (*Polygonum polymorphum* Led.).

Капуста брюссельская (*Brassica oleracea gemmifera* Dc.).

- Одна изъ разновидностей капусты огородной (*Brassica oleracea* L., описаніе см. ниже), воздѣлываемая на огородахъ и употребляемая въ пищу; съ удлиненнымъ стеблемъ, на которомъ густо сидятъ крупныя листовыя почки ввидѣ маленькихъ кочней. (Рис. 98.)
- Капуста водяная**, см. Рдестъ плавающий (*Potamogeton natans* L.).
- Капуста дикая**, см. Вероника ручейная (*Veronica beccabunga* L.).
- Капуста заячья**, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).
- Капуста заячья**, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).
- Капуста заячья**, см. Арника горная (*Arnica montana* L.).
- Капуста заячья**, см. Володушка золотистая (*Bupleorum aureum* L.).
- Капуста заячья**, см. Чертополохъ огородный (*Cirsium oleraceum* All.).
- Капуста заячья**, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).
- Капуста заячья**, см. Кушена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).
- Капуста заячья**, см. Кислица обыкн. (*Oxalis acetosella* L.).
- Капуста заячья**, см. Очитокъ бобовый (*Sedum Fabaria* Koch.).
- Капуста заячья**, см. Осотъ огородный (*Sonchus oleraceus* L.).
- Капуста заячья**, см. Хлопушка (*Silene inflata* Smith.).
- Капуста заячья**, см. Ленокъ полевой (*Turritis glabra* L.).
- Капуста кочанная** (*Brassica oleracea capitata* L.). Кочень, Вилки, Нагрызень. Одна изъ разновидностей капусты огородной (опис. см. ниже: капуста огородная, *Brassica oleracea* L.), воздѣлываемая на огородахъ и употребляемая въ пищу, съ укороченнымъ стеблемъ, на которомъ сидятъ многочисленные листья, плотно прилегающіе другъ къ другу и образующіе кочанъ, смотря по сорту, краснаго или бѣлаго цвѣта. (Рис. 102.)
- Капуста кудрявая**, см. Капуста савойская или сафой (*Brassica oleracea sabina* L.).
- Капуста лѣзная**, см. Бородавникъ обыкновенный (*Lampsana communis* L.).
- Капуста морская**, см. Катранъ морской (*Crambe maritima* L.).
- Капуста морская** (*Laminaria digitata* Lamourx). Пальчатая пластиночница. Листовидная морская водоросль, дл. 1—3 арш., принадлежащая къ классу «бурыхъ водорослей» (*Phaeophyceae*), т. е., заключающихъ въ себѣ, кромѣ хлорофила, вещество, придающее имъ зеленую окраску, еще бурое, красящее вещество. Нижняя часть водоросли круглая, ввидѣ черепка, верхняя же листовидная, пальчатораздѣльная. Встрѣчается въ сѣверной части Атлантическаго океана и въ Ледовитомъ океанѣ, равно какъ въ прилежащихъ моряхъ. Изъ золы ея добывается іодъ (въ Шотландіи), а черешки употребляются въ медицинѣ.
- Капуста огородная** (*Brassica oleracea* L.). Двухлѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae*

Juss.), выш. 6½—12½ верш., встрѣчающееся дико на морскихъ берегахъ Европы. Листья очередные, голые, нижніе ланцетные, черешковые, верхніе продолговатые, сидячіе. Блѣдно-желтые цвѣты собраны удлинненными уже до цвѣтораспусканія кистями; чашечка 4-хлстная, чашелистики прямостоящіе, прижатые. Лестковъ 4, расположенныхъ на-крестъ; тычинокъ 6, изъ которыхъ 2 короче остальныхъ. Плодъ—цилиндрическій стручокъ, раздѣленный тонкой перегородкой на 2 гнѣзда; каждая изъ его 2-хъ створокъ снабжена одной продольной срединной жилкой и двумя боковыми извилистыми, часто неясно замѣтными, жилками.

Употребляется въ пищу и разводится въ огородахъ въ многочисленныхъ разновидностяхъ, изъ которыхъ главнѣйшія суть: кочанная капуста, кольраби, брюссельская или розовидная капуста, савойская капуста или сафой, цвѣтная капуста. (Таб. XVIII, фиг. 101.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Огородная, или кочанная капуста, какъ лекарственное средство, употребляется только въ народной медицинѣ. Врачи даютъ ее въ пищу вмѣстѣ съ другими овощами противъ цынги и запоровъ. Древніе врачи восхваляли капусту, какъ полезную пищу отъ запоровъ, отъ боли въ печени и отъ пьянства. Свѣжая капуста развиваетъ вѣтры въ животѣ, потому ее ѣдятъ въ квашеномъ видѣ, именно ее мелко рубятъ или рѣжутъ, кладутъ въ деревянные кадки, солятъ, прикрываютъ доскою, на которую кладутъ тяжесть. Капуста пропитывается солью, подъ давленіемъ тяжести выпускаетъ содержащуюся въ ней жидкость, дѣлается мягкою и принимаетъ кисловатый вкусъ; для предотвращенія гниенія въ животѣ, а также для вкуса, къ квашеной капустѣ прибавляютъ зеренъ тмина, укропныя верхушки, яблоковъ и рѣзанной ломтиками моркови.

Отъ цынги и также отъ запоровъ ѣдятъ ежедневно одно, два блюдечка кислой капусты. Изъ красной капусты выжимаютъ сокъ, варить его съ медомъ до густоты сиропа и даютъ чахоточнымъ отъ кашля.

Оставшіяся отъ квашенія капусты кочерыжки сжигаютъ и сохраняютъ въ сухомъ мѣстѣ.

Золѣ отъ пережженныхъ кочерыжекъ приписывается свойство убивать наѣдомыхъ и червей.

Капуста савойская или сафой (*Brassica oleracea sabina* L.).

Одна изъ разновидностей капусты огородной (описание см. выше: капуста огородная, *Brassica oleracea* L.), употребляемая въ пищу и разводимая въ огородахъ, съ морщинистыми курчавыми листьями, образующими рыхлый кочанъ. (Рис. 100.)

Капуста сайгачья, см. Залычья капуста (*Sedum Telephium* L.).

Капуста собачья, см. Марь обыкновенная (*Chenopodium album* Moqu.).

Капуста собачья, см. Полѣска однолѣтняя (*Mercurialis annua* L.).

Капуста собачья, см. Полѣска многолѣтняя (*Mercurialis perennis* L.).

Капуста татарская, см. Кислец (*Polygonum polymorphum* Led.).

Капуста цвѣтная (*Brassica oleracea cauliflora*). Цвѣтуха. Одна изъ разновидностей капусты огородной (описание см. выше капуста огородная, *Brassica oleracea* L.), разводимыхъ въ огородахъ и употребляемыхъ въ пищу, отличающаяся мясистымъ соцветіемъ съ недоразвитыми цвѣтами. (Рис. 104.)

Капуста черная, см. Катранъ морской (*Crambe maritima* L.).

Капустка, см. Сурѣница (*Brassica campestris* L.).

Капустка заячья, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).

Капустникъ, см. Чертополохъ полевой (*Cirsium arvense* Scop.).

Капустная пальма (*Areca oleracea* L.). Дерево родомъ изъ Бразиліи, выш. 24 саж., съ длинными листьями, собранными наверху на подобіе короны, подъ которой находится большое вздутіе.

Молодые листья и преимущественно листовыя почки (внутренность листовыхъ влагалищъ) употребляется въ пищу въ вареномъ и въ сыромъ видѣ; въ послѣднемъ случаѣ ихъ приготавливаютъ, какъ салатъ, съ уксусомъ и прованскимъ масломъ. Изъ зрѣлыхъ плодовъ готовится вкусный напитокъ.

Капустное дерево, см. Ангелиновое дерево (*Andira Aubletti* Benth.).

Капуцинъ, см. Настурція (*Tropaeolum majus* L.).

Капшучки, см. Колокольчикъ перенколистный (*Campanula persicifolia* L.).

Караачъ, см. Ильмъ пробковый (*Ulmus suberosa* Ehr.).

Каравинъ, см. Зольникъ калийный (*Salsola Kali* L.).

Карагай, см. Лиственница сибирская (*Larix sibirica* Led.).

Карагачъ, см. Ильмъ пробковый (*Ulmus suberosa* L.).

Карагенъ (*Chondrus crispus* Lyngb. sin. *Tucus crispus* L.). Мохъ каррагенъ. Ирландскій мохъ. Небольшая водоросль изъ класса «водорослей багряныхъ» (*Rhodophyceae* или *Florideae*), такъ какъ окрашена въ ярко-розовый, красный или фіолетовый цвѣтъ особымъ веществомъ фикотриномъ, маскпругущимъ зеленый цвѣтъ хлорофилла (вещества, придающаго растеніямъ зеленую окраску); встрѣчается на камняхъ въ европейскихъ моряхъ, главнымъ образомъ, на сѣверѣ. Она собирается въ большомъ количествѣ, промывается въ прѣсной водѣ и сушится. Полученная безцвѣтная масса растворяется въ кипящей водѣ и даетъ студень, употребляющійся какъ въ медицинѣ, такъ и въ пищу, затѣмъ въ качествѣ клея и. т. п.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ медицинѣ желатина изъ каргена употребляется чахоточными или вообще людьми истощенными для улучшенія питанія; желатину варятъ съ молокомъ, для вкуса прибавляютъ фруктовый сиропъ и другія вещества со слабымъ ароматомъ.

Карагучъ, см. Ильмъ полевой (*Ulmus campestris* Sm.).

Карагучъ, см. Ильмъ пробковый (*Ulmus suberosa* Ehrh.).

Карагучка, см. Ханьки (*Cucurbita ovifera* L.).

Караичъ, см. Тернъ (*Prunus spinosa* L.).

Караичъ, см. Илъмъ полевой (*Ulmus campestris* Sm.).

Карандашное дерево, см. Можжевельникъ красный (*Juniperus Oxycedrus* L.).

Караси, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Карасоля панова, см. Настурция (*Tropaeolum majus* L.).

Карачникъ, см. Копытенъ европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Карачникъ, см. Илъмъ пробковый (*Ulmus suberosa* Ehrh.).

Кардамонъ (*Elettaria cardamomum* White). Травянистое растение съ клубневиднымъ мучнистымъ корневищемъ, произрастающее на Малабарскомъ берегу и культивируемое въ Остѣ-Индіи. Его трехгранные, съ кожистой оболочкой, желтовато-бѣлые, полосатые плоды, содержащіе мелкія зерна, извѣстны подъ названіемъ «настоящаго кардамона». Они содержатъ эфирное маслянистое вещество, придающее имъ запахъ и вкусъ, напоминающій камфору, и называемое «кардамоновымъ масломъ». Плоды кардамона употребляются въ качествѣ вѣсмъ извѣстной пряности для приправы въ различные кушанья и прибавляются въ духи.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Кардамонъ употребляется въ медицинѣ, только какъ ароматическое средство, которое входитъ въ составъ различныхъ ароматическихъ сборовъ, настойки и ароматического порошка. Ароматическій порошокъ состоитъ изъ 5 ч. корицы, 3 ч. кардамона и 2 ч. имбиря; принимается на кончикѣ языка; ему приписываютъ свойство останавливать долго существующія разстройства кишечника.

Кардобенедиктъ (*Cnicus benedictus* Gärtn.). Фармацевтическое названіе: *Herba Cardui sancti s. Centaureae benedictae, s. Cnici benedicti*. Волчепъ кудравый, Дѣдовникъ благодатный, Осотъ итальянскій трава, Богородицкое рѣшье, Крестовый корень, Чертополохъ благословенный, Стоголовникъ, Брылевникъ (Бѣлор.). Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adams.), родомъ изъ южной Европы, слегка мохнатое, выш. 5½ до 7½ вершковъ. Листья блѣдно-зеленые, выемчато-зубчатые, колючіе; нижніе суженные въ черешокъ, стеблевые сидячіе, съ стеблеобхватывающимъ основаніемъ. Корзинки желтоватыхъ цвѣтовъ яйцевидно-шаровидныя, съ двойной оберткой: наружныя листки обертки яйцевидно-продолговатые, листоватые, окутывающіе головку. Внутренніе — паутинистые, яйцевидные, кончаются длинною, крѣпкою, перистою колючкою, цвѣтки же покрыты щетинками; тычинокъ 5, съ пушистыми нитями и при основаніи стрѣловидными пыльникками; завязь нижняя, одногнѣздная, съ однимъ столбикомъ, лопасти котораго короткія и окруженныя при основаніи кольцомъ изъ короткихъ волосковъ. Плодъ — сѣмянка съ хохолкомъ. Цвѣтетъ лѣтомъ; разводится кое-гдѣ на югѣ, какъ лекарственное растение. (Рис. 99.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Кардобенедиктъ въ медицинѣ употребляется рѣдко. Въ настоящее время врачи даютъ его почти исключительно только отъ разстройства желудка у пьяницъ. Для

этого берутъ 5 грм. (1 драхму 16 гранъ) экстракта, смѣшиваютъ его съ 25 грм. (1 унцъ) лавровишневыхъ капель. Смѣсь эту принимаютъ 3 раза въ день по 20-ти капель.

Каркамель, см. Куркума (*Curcuma longa* L.).

Каркаунъ, см. Кирказонъ обыкновен. (*Aristolochia Clematidis* L.).

Карла, см. Береза-стланецъ (*Betula nana* L.).

Карлушина, см. Крушина ломкая (*Rhamnus frangula* L.).

Кармазинъ, см. Падубъ обыкновенный (*Ilex aquifolium* L.).

Кармякъ, см. Кермекъ широколистный (*Statice latifolia* L.).

Карнауба, см. Таллипотное дерево (*Corypha umbraculifera* L.).

Картамусъ, см. Сафлоръ красильный (*Carthamus tinctorius* L.).

Картовка,

Картокія,

Картопли,

Картопля,

Картосы,

Картофель (см. *Solanum tuberosum* L.).

Картофель (*Solanum tuberosum* L.). Бараболя (Малор.), Барабошки (Тул.), Бульба (листь на стеблѣ, Малор.), Барболя (Малор.), Гульба (Пск., Твер.), Гулена (Костр., Ниж., на Ветлугѣ), Гульбовникъ (Мог.), Видилое (травя въ Новг. губ., Тихв. у.), Картокля (Малор.), Картофля. Картохля, Картопля (зап. и южн. Росс.), Картошка (Полт.), Картошки, Картоха (Тулск., Моск.), Картофъ, Картыши (Новг.), Картопли (Полт.), Картосы, Карфеты, Картышки (Вят.), Картовка (Перм.), Гортохли (Полт.), Коконя тр., Тина—картофельная ботва (Пск.), Кина, Кить (Даль), Парфенка, Парфеты (Вятск.), Яблоки (Ирк., Костр., Твер., Яр.), Яблоко (въ Сиб.), Яблочки (Кален.), Земляныя яблоки, Земнякъ (Подол. и Гал.), Содомское яблоко (у расколы. молок.), Чертово яблоко. (Таб. XVIII, фиг. 99.)

Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «пасленовыхъ» (*Solanaceae* Juss.), родомъ изъ Перу и Чили (въ Америкѣ); въ XVI ст. оно было ввезено въ Испанію, потомъ въ Англію, откуда постепенно стало распространяться по остальнымъ странамъ Европы; въ Россіи картофель стали разводить съ половины 18-го столѣтія.

Стебель картофеля травянистый, гранистый, вып. 11—13½ вершковъ, съ растопыренными вѣтвями; листья непарно-вѣтвистые, спирально расположенные, съ яйцевидными заостренными, снизу сѣроватыми листочками. Бѣлые или фіолетовые цвѣты собраны въ верхушечные раздвоенные завитки; чашечка 5-тизубчатая или 5-тилопастная; вѣнчикъ колесовидный, 5-тиугольный, вдвое крупнѣе чашечки; тычинокъ 5, прикрѣпленныхъ къ трубкѣ вѣнчика и чередующихся съ его лопастями; пыльники сложены конусомъ и раскрываются наверху отверстиями; завязь верхняя свободная, двугнѣздная, съ толстымъ сѣмяносцемъ на перегородкѣ и многочисленными сѣмяпочками; столбикъ 1, съ двулопастнымъ рыльцемъ; плодъ—крупный, шаровидный, зеленый ягода. Мясистые клубни (картофель) развиваются на нитевидныхъ подземныхъ побѣгахъ. Картофель

пвѣтеть въ июль и августѣ, созрѣваетъ обыкновенно въ октябрѣ. Какъ извѣстно, картофельъ вмѣстѣ съ остальными хлѣбными злаками (рожью, пшеницей, ячменемъ и проч.) является нашей главною растительною пищею, и воздѣлываніе его распространилось повсемѣстно. Въ пищу мы употребляемъ, собственно, корневыя мясистыя клубни, извѣстные подъ названіемъ «картофель». Они содержатъ большое количество питательнаго крахмалистаго вещества. Приготавливаютъ изъ нихъ вермишель, крупу, добываютъ черезъ растираніе теркой и промываніе мякоти крахмалъ или картофельную муку, которая входитъ въ составъ многихъ блюдъ, употребляемыхъ нами въ пищу, и по употребленію весьма сходна съ крахмаломъ пшеничной муки; разваривъ картофельную муку и высушивъ студенистую массу, получаемъ камедь, отличающуюся всеми свойствами аравійской камеди и могущую вполне замѣнять послѣднюю; самая мякоть картофеля, остающаяся послѣ отдѣленія изъ нея крахмала, содержитъ еще много питательныхъ веществъ и, будучи высушена и обращена въ муку, можетъ служить для печенія хлѣбовъ. Если замѣчено, что картофельъ промерзъ, то, не давая ему оттаять, надо его положить на нѣсколько часовъ въ холодную воду и потомъ протереть, какъ обыкновенно, на теркѣ для полученія крахмала. Изъ оттаявшаго картофеля крахмалъ получается черезъ выжиманіе изъ картофеля влаги, причемъ крахмалъ осаждается на дно и очищается посредствомъ промыванія въ водѣ; оставшіяся выжимки, высушенные въ печи и смолотыя, доставляютъ муку, которую можно прибавлять въ хлѣбы и въ кормъ животныхъ. Наконецъ, изъ перебродившихъ картофельныхъ клубней перегоняютъ винный спиртъ.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ медицину картофельъ самъ по себѣ не употребляется, картофельная мука служитъ для присыпокъ отъ мокнущихъ сыпей, отъ зуда и красноты на кожѣ и отъ опрѣлости у маленькихъ дѣтей.

Картофель земляной, см. Запникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa* L.).

Картофель свиной, см. Дряква европейская (*Cyclamen europeum* L.).

Картофля
Картоха
Картохля
Картошка
Картыши

см. Картофель (*Solanum tuberosum* L.).

Карусъ, см. Осока песчаная (*Carex arenaria* L.).

Крушинникъ, см. Крушина слабикъ (*Rhamnus cathartica* L.).

Карфеты, см. Картофель (*Solanum tuberosum* L.).

Касатикъ, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Касатикъ, см. Серпуха красильная (*Serratula tinctoria* L.).

Касатикъ болотный, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.). Фармацевтическое на-

званіе: *Iris palustris*, *Acorus palustris* s. *vulgaris*, s. *adulterinus*, *Gladiolus luteus*. Касатикъ водяной имѣетъ слѣдующія названія: Ерѣ, Прѣ, Казачекѣ (Вор.), Касатикѣ, Касатикѣ болотный, водяной, желтый, Касатикѣ (Моск. и др.), Косички (Орл.), Косыці (Умань), Кашищѣ (Гродн.). Лепешникѣ (ок. Кіев.), Лузникѣ и пзм. Пузикѣ, Узикѣ (Котел. Сѣвн.), Ужички (Малор.), Огуречникѣ (Кал.), Земляные огурцы (Приарг. кр.), Осока (трав.), Дикіе огурцы (плоды), Пѣтушокѣ (Курск., Яросл.), Пѣвникѣ (Малор.), Болотні півники (Малор.), Рогоза, растеніе, а цвѣты: Косыці (Умань), Разстрѣль (Вор.), Сабельникѣ меньшій, Сердечникѣ (Олон.), Болотный финовникѣ (Кал.), Чистякѣ, Печатонникѣ (Ниж.), Палотникѣ (Ниж.), Лепешнякѣ (Кіев.), Рогоза (Кіев.), Чиканѣ (Тамб.), Чеканникѣ (Астр.), Куга (Вор.), Троста (Твер.), Кукла (Олон.), Лапачуга (Новг.), Луковица (Пет.), Колокольчики (Пет.), Шатарокѣ (Гродн.), Кордовникѣ (Мог.), Желтая водяная лилія (Эк. маг.), Тюльпанѣ дикій (Тамб.). (Табл. XVIII, фиг. 102.)

Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «касатиковыхъ» (*Irideae* Juss.), распространенное почти по всей Европѣ и Россіи. Корневище толстое, горизонтальное, вѣтвистое; стебель выш. 13½ верш.—1 арш. 6 вершк., сплошной (неполый), многоцвѣтковый, длиннѣе широкояйцевидныхъ верхнихъ листьевъ; нижніе столь-же длинны, какъ цвѣточный стебель; прицвѣтники травянистые, на верхушкѣ перепончатые, цвѣты правильные золотисто-желтые, крупныя, верхушечныя. Околоцвѣтникѣ съ короткою или болѣе или менѣе длинною трубчатою, лепестковидный, раздѣльный; три наружныя его доли отогнуты внизъ и значительно крупнѣе трехъ внутреннихъ прамостоячихъ долей; завязь нижняя 3-хлѣздная, съ однимъ столбикомъ и 3-ми лепестковидными рыльцами; плодъ—продолговатая тупо-трехгранная коробочка. Растетъ на болотахъ и по берегамъ рѣкъ. Цвѣтетъ въ маѣ и въ іюнѣ.

Для употребленія собираютъ обыкновенно его корни рано весною, до появленія листьевъ. Въ свѣжемъ сыромъ видѣ корень издаетъ довольно пріятный запахъ дубовой коры, пропадающій при высыханіи; вкусъ его острый, нѣсколько вяжущій; подобно корнямъ другихъ растений того-же семейства, онъ содержитъ въ себѣ остро-горькое летучее масло и вяжущее вещество, благодаря которому отваръ корня въ соединеніи съ желѣзнымъ купоросомъ принимаетъ черный цвѣтъ; изъ подобнаго отвара приготовляютъ перѣдко чернила; корень употребляется также на дубленіе кожъ; изъ высушенныхъ цвѣтковъ водяного касатика извлекается при помощи уксуса желтая краска; сѣмена его, поджаренныя, пробовали употреблять вмѣстѣ кофе.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Касатикъ водяной употребляется только въ народной медицинѣ отъ водянки и отъ круглыхъ глистовъ, въ отварѣ съ краснымъ виномъ—отъ кровотеченій. Для настоя берутъ 4—15 грм. (1 драхмы до ½ унца) сушеннаго корня на стаканъ кипятку или на такое-же количество краснаго вина. Принимаютъ

черезъ два часа по столовой ложкѣ. Отваръ корня служить для полосканія рта отъ цынготныхъ десенъ.

Касатикъ желтый, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Касатикъ низкій (*Iris pumila* L.). Бѣшеная трава. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «касатиковыхъ» (*Iridaceae* Juss.), распространенное въ средней Европѣ, въ средней и южной Россіи. Стебель низкій (выш. 2—2½ вершк.), одноцвѣтный, короче мечевидныхъ листьевъ, достигающихъ въ длину 4—6½ вершк.) Листья голубовато-зеленые, цвѣтокъ фіолетовый, рѣже желтоватый или бѣлый, крупный, верхушечный; околоцвѣтникъ лепестковидный, 6-ти раздѣльный, съ длинной трубкой, наружныя его доли обратно-лапустныя, внутреннія столь-же почти длинныя, но съ болѣе широкою яйцевидною пластинкою; прицвѣтники почти совсѣмъ перепончатые; тычинокъ 3; завязь нижняя 3-хгнѣздная, съ однимъ столбикомъ и 3 лепестковидными рыльцами. Плодъ—неясно-трехгранная коробочка. Растетъ въ степяхъ и на каменистыхъ мѣстахъ. Цвѣтетъ весною. (Рис. 101)

Касатикъ нѣмецкій (*Iris germanica* L.). Фармацевтическое названіе: *Iris nostras*, v. *germanica*, v. *Gladiolus coeruleus* (Radix.). Ирѣ нѣмецкая, Косички (Орл. Тар.), Косина (Балт.), Касатикъ синий, Лилія лазоревая, Садовые півники (Малор.), Пралѣска (Курск.), Сазаны (Вор. Тар.). Касатикъ нѣмецкій представляетъ изъ себя многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «касатиковыхъ» (*Iridaceae* Juss.), распространенное въ южной Европѣ. Стебель его превышаетъ листья; послѣдніе мечевидные, голубовато-зеленые; цвѣтковъ много, всѣ темно-фіолетовые, при основаніи желтоватые, съ фіолетовыми жилками; околоцвѣтникъ лепестковидный, 6-тираздѣльный; доли его обратно-яйцевидныя. Тычинокъ три; завязь нижняя 3-хгнѣздная, съ однимъ столбикомъ и 3-мя лепестковидными рыльцами: плодъ — коробочка. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта; растетъ какъ на сухихъ, такъ и на влажныхъ мѣстахъ, но тѣнистымъ лѣсамъ, кустарникамъ и лужайкамъ, въ оврагахъ и проч. Часто разводится для украшенія въ садахъ, а корни собираются для врачебнаго употребленія или рано весною до появленія листьевъ, или поздно осенью; но лучше сборъ производить весною, когда корни сочныѣ и бѣлѣе. Высушенный бѣлый корень нѣмецкаго касатика вмѣстѣ съ корнемъ флорентійскаго (см. ниже: касатикъ флорентійскій), пзвѣстенъ въ продажѣ подъ именемъ «фіалковаго корня». Въ свѣжемъ состояніи корень отличается сильнымъ, непріятнымъ запахомъ, но при высушиваніи послѣдній переходитъ въ пріятный фіалковый. Вкусъ его острый, горькій, нѣсколько вяжущій, острота его при высушиваніи тоже пропадаетъ. Въ парфюмеріи корень касатика часто употребляютъ вмѣсто флорентійскаго для сообщенія косметическимъ товарамъ легкаго фіалковаго запаха. Сокъ корня, смѣшанный съ квасцами, даетъ зеленую краску, употребляемую иногда вмѣсто зеленыхъ чернилъ. Темносиніе полусгнившіе цвѣты, смѣшанные съ известью, даютъ также си-

песчато-зеленую довольно хорошую краску, известную въ Германіи у живописцевъ подъ именемъ липлейной зелени (Liliengrün).

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Медицинское употребленіе нѣмецкаго касатика ничтожно. Онъ извѣстенъ, только какъ народное средство. Свѣжій сокъ корня касатика ядовитъ, неумѣренное употребленіе его можетъ вызвать рвоту, поносъ и сильныя боли въ животѣ. Въ народѣ свѣжій сокъ касатика употребляется отъ водянки, отъ насморка и кашля; его готовятъ съ молочной сывороткой; для этого смѣшиваютъ 2—4 столовыхъ ложки сока съ двумя фунтами сыворотки и пьютъ по чашкѣ, нѣсколько разъ въ день. На зиму корень сушатъ. Изъ сухого корня дѣлаютъ наливку: на бутылку бѣлаго вина берутъ 15 грм. ($\frac{1}{2}$ унціи) сушеннаго корня. Для наружнаго употребленія корень настаиваютъ на прованскомъ или деревянномъ маслѣ: на бутылку масла—100—120 грм. (3—4 унціи) толченаго корня.

Касатикъ сибирскій (*Iris sibirica* L.). Бубенчики (Влад.), Василекъ боровой (Влад.), Горечавка (въ Якут. области), Калапець (Гродн.), Калачики, Касатики (Приарг. край), Кукушны слезы (на Иртышѣ между Омск. и Семипалат.), Лазоръ (Нижег.), Норичникъ (Орл.), Дикіе огурцы (Симб. Гродн.), Заячьи огурчики (Тамб.), Огурчики (Приарг. кр.), Осока (Перемышль), Плакунъ (Нижег.), Пикульникъ (Енис.), Пѣтушки, Пѣвники боровые (Черн.), Пузикъ (Вятск.), Сибирская трава (Кондр.), Луговая фіалка, Сорочьи цвѣты (Алт.), Чемеяникъ (Алт.), Чистякъ. Касатикъ сибирскій есть многочислѣннѣе растеніе изъ семейства «касатиковыхъ» (*Irideae* Juss.), распространенное въ сѣв. Европѣ, въ сѣверной и средней Россіи, изрѣдка встрѣчающееся въ южной. Корневище при основаніи стебля съ бурими волокнами отъ разрушившихся старыхъ листьевъ; стебель голый, высокій, снабженный только внизу нѣсколькими узколинейными, тонко заостренными листьями; прикорневые—короче стебля; прицвѣтники наверху перепончатые; цвѣтки крупныя, верхушечныя, снабжены цвѣтоножками, ихъ около 2—4; околоцвѣтникъ правильный, лепестковидный, 6-тираздѣльный, съ очень короткой трубкой; наружныя его доли обратно-яйцевидныя, суженныя въ ноготокъ, голубоватыя, съ фіолетовыми жилками, внутреннія доли продолговато-эллиптическія и вмѣстѣ съ долями столбика—фіолетовыя; тычинокъ 3; завязь нижняя 3-хлѣздная, съ однимъ столбикомъ и 3-мя лепестковидными рыльцами; плодъ—овальная или продолговатая коробочка. Растетъ на влажныхъ лугахъ между кустарниками и по берегамъ рѣкъ. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта. Изъ цвѣтовъ добывается краска.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Касатикъ сибирскій употребляется только въ народной медицинѣ. Въ маломъ количествѣ дѣйствуетъ, какъ слабительное, въ большемъ—какъ рвотное средство. Для отвара берется 15 грм. ($\frac{1}{2}$ унціи) сушеннаго корня на 12 столовыхъ ложекъ воды. Корень настаиваютъ также на винѣ; на бутылку вина берется 1 унцъ (30 грм.) толченаго корня. Принимаютъ по рюмкѣ раза два въ день. Корень кусочками кладутъ въ боль-

ные зубы, употребляютъ его также въ отварѣ для полосканія рта и горла.

Касатикъ синій, см. Касатикъ нѣмецкій (*Iris germanica* L.).

Касатикъ флорентійскій (*Iris florentina* L.), Присл. Фармацевтическое названіе *Iris alba s. florentina*. Фіалковый корень. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «касатиковыхъ» (*Iridaceae* Juss.), распространенное въ южной Европѣ, выш. 7—14 вершковъ. Стебель несетъ отъ 1 до 3 бѣлыхъ, часто съ голубоватымъ оттѣнкомъ, душистыхъ цвѣтковъ. Листья широко-мечевидные, сизо-зеленые, короче стебля. Околоцвѣтникъ лепестковидный, 6-тираздѣльный; три наружныя его доли отогнуты внизъ и значительно крупнѣе трехъ внутреннихъ прямостоящихъ долей; тычинокъ 3; завязь нижняя 3-хгнѣздная, съ однимъ столбкомъ и 3-мя лепестковидными рыльцами; плодъ—коробочка. Цвѣтетъ весною. Разводится, какъ декоративное растение и ради душистаго корневища, извѣстнаго въ торговлѣ подъ именемъ «фіалковаго корня» и употребляемаго въ парфюмерномъ производствѣ и въ медицинѣ. Корневище пріобрѣтаетъ пріятный запахъ фіалки лишь съ теченіемъ времени, при медленномъ высыханіи, какъ и корень нѣмецкаго касатика (см. выше: касатикъ нѣмецкій). Лучшій фіалковый корень доставляется изъ окрестностей Флоренціи.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Корень флорентійскаго касатика содержитъ эфирное масло и тѣкую смолу. Онъ обладаетъ слабымъ возбуждающимъ свойствомъ и входитъ въ составъ грудныхъ лепешекъ и нюхательнаго и зубнаго порошка.

Касатики, см. Касатикъ сибирскій (*Iris sibirica* L.).

Касаточная трава, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).

Кастій, см. Бадма (*Nelumbium caspicum* Fisch.).

Кассава (*Manihot utilisima* Pohl). Тапиокка, Бразильскій арорутъ.

Высокій кустарникъ, достигающій 1½ сажени выс., родомъ изъ тропической Америки, культивируемый также въ тропическихъ странахъ Африки и Азии, съ пальчато-раздѣльными листьями и мясистымъ толстымъ клубневиднымъ корневищемъ, содержащимъ большое количество питательнаго крахмальнаго мучнистаго вещества рядомъ съ молочкообразнымъ ядовитымъ веществомъ; однако, при выжиманіи, промываніи водой, при высушиваніи, при вывариваніи и при жареніи на огнѣ, корень теряетъ свое ядовитое свойство, и въ результатъ получается одно питательное мучнистое вещество «кассава», составляющее главнѣйшую пищу жителей южной Америки, замѣняющую имъ хлѣбъ и картофель. Лучшій сортъ «кассавы» очищенной и просѣянной называется «тапошкой», употребляется на печеніе хлѣбовъ, входитъ въ составъ разныхъ кушаньевъ и въ настоящее время составляетъ предметъ торговли. Видомъ своимъ тапиокка напоминаетъ саго и употребляется подобно послѣднему. Листья растения тоже употребляются жителями Америки въ пищу, въ качествѣ салата; корни, между прочимъ, они употребляютъ также на выдѣлываніе спиртныхъ напитковъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Тапиока легко усваивается желудкомъ, потому дается слабымъ, выздоравливающимъ отъ тяжелыхъ болѣзней, больнымъ, маленькимъ дѣтямъ, а также людямъ, страдающимъ расстройствомъ кишечника, поносами. Изъ тапиоки варятъ кашу на молокѣ или-же отвариваютъ ее въ бульонѣ.

Кассинскій чай, см. Ложное чайное дерево (*Jlex paraguayensis* Lamb.).

Кассія библейская, см. Киннамонъ (*Cinnamomum* Burm.).

Кассія гвоздичная, см. Мирта гвоздичная (*Anomis acris* Bg).

Касторовое сѣмя, см. Клепсевина (*Ricinus communis* L.).

Кастульки, см. Настурція (*Tropaeolum majus* L.).

Кастюльки, см. Костерь ржаной (*Bromus secalinus* L.).

Катъ, см. Целастеръ съѣдобный (*Celaster edulis* Vahl.).

Катаночки желыя, см. Клеверъ темноцвѣтный или Хмелекъ (*Trifolium spadicum* L.).

Каташникъ, см. Валериана лекарств. (*Valeriana officinalis* L.).

Катеху-пальма, см. Арековая пальма (*Areca Catechu* L.).

Катиполе, см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.).

Катиполе, см. Качимъ метельчатый (*Gypsophila paniculata* Led.).

Катиполь, см. Зольникъ калийный (*Salsola Kali* L.).

Катичникъ, см. Качимъ метельчатый (*Gypsophila paniculata* Led.).

Катишь, см. Незабудка болотная (*Myosotis palustris* With.).

Катокъ, см. Мелколепестникъ ѣдкій (*Erigeron acris* L.).

Каточки, см. Кровохлебка лекарств. (*Sanguisorba officinalis* L.).

Катръ, см. Серпуха красильная (*Serratula tinctoria* L.).

Катранъ, см. Катранъ морской, капуста морская (*Crambe maritima* L.).

Катранъ, см. Катранъ татарскій (*Crambe tatarica* Jacq.).

Катранъ красный, см. Кермекъ (*Statice Gmelini* Willd.).

Катранъ морской, или Капуста морская (*Crambe maritima* L.).

Капуста черная. Травянистое многолѣтнее растеніе изъ семейства крестоцвѣтныхъ (*Cruciferae* Juss.), распространенное на морскихъ берегахъ западной и южной Европы и на берегахъ Чернаго, Азовскаго, Балтійскаго морей въ Россіи, голое, покрытое голубоватымъ налетомъ, выпш. 6½—13½ вершковъ. Листья большіе, сизо-зеленые, мясистые, перистолопастные. Цвѣты бѣлые. Чашечка 4-листная, вѣнчикъ изъ 4-хъ на-крестъ расположенныхъ лепестковъ; тычинокъ 6; плодъ—стручечекъ, состоятъ изъ 2-хъ члениковъ: одногнѣздный, односѣмянный верхній членикъ яйцевидной формы, а бесплодный нижній членикъ имѣетъ видъ небольшого вздутія цвѣтоножки. Цвѣтетъ въ маѣ и въ іюнѣ. Молодые листья употребляются въ пищу, какъ вкусная овощъ. (Рис. 103.)

Катранъ настоящій, см. Кермекъ (*Statice Gmelini* Willd.).

Катранъ татарскій (*Crambe tatarica* Jacq.). Катранъ. Голубоватое многолѣтнее растеніе изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), встрѣчающееся въ средней Европѣ, въ южной и юго-восточной Россіи, и нерѣдко въ степяхъ, въ Крыму, на Кавказѣ и въ Прикаспійскомъ краѣ. Молодые листья катрана

татарскаго обыкновенно жестко-волосистые и глубоко-перисто-раздѣльные, съ продолговато-линейными зубчатыми или лопастными долями; верхніе листья ланцетные, цѣльные. Бѣлые цвѣты образуютъ вѣтвистое метельчатое соцвѣтіе. Чашечка 4-хлестная; вѣнчикъ изъ 4-хъ накрестъ расположенныхъ лепестковъ; тычинокъ 6; нити ихъ съ длиннымъ зубцомъ пониже пыльника; плодъ—почти шаровидные, шероховато-морщинистые стручечки, состоящіе изъ 2-хъ члениковъ: нижній—безплодный, имѣетъ видъ вздутія цвѣтоножки; верхній—одногнѣздный, односѣмянный, съ почти сидячимъ рыльцемъ. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта. Корни въ Моравіи и Венгріи употребляются въ пищу, какъ салатъ.

Катунъ, см. Качимъ метельчатый (*Gypsophila paniculata* Led.).

Катунъ, см. Зольникъ Калійный (*Salsola Kali* L.).

Катыкъ, см. Смородина красная (*Ribes rubrum* L.).

Катышка, см. Кошачья лапка (*Antennaria dioica* Gärtn.).

Катышки, см. Кровохлебка лекарств. (*Sanguisorba officinalis* L.).

Каунъ, см. Арбузъ (*Cucumis Citrullus* Lering.).

Каучукъ, см. Смоковница каучуковая (*Ficus elastica* Roxb.).

Каучуковое дерево (*Hevea guayanensis* Aubl. sin. *Siphonia elastica* Pers.). Высокое дерево, достигающее нѣсколько саженъ высоты, изъ семейства «молочайныхъ» (*Euphorbiaceae* Kl. Geke), растущее въ лѣсахъ Бразиліи и Гвианы. Дерево выдѣляетъ во всѣхъ частяхъ острый молочный сокъ, доставляющій каучукъ. Добываютъ его слѣдующимъ образомъ. Надрѣзавъ кору дерева и собравъ вытекшій сокъ, производятъ надрѣзы все глубже и глубже, пока дерево не истощитъ всего своего запаса. Въ полученный такимъ образомъ млечный сокъ, быстро отвердѣвающій на воздухѣ, погружаютъ глиняныя формы изъ необожженной глины. Каучуковый покровъ, которымъ облекаются, спустя нѣсколько времени, погруженные формы, высушиваютъ посредствомъ дыма (чѣмъ объясняется темный цвѣтъ каучука) и снимаютъ его съ формъ.

Каучукъ отличается при обыкновенной средней температурѣ необыкновенной эластичностью, которая, однако, пропадаетъ при температурѣ 0°. При треніи каучукъ выдѣляетъ электричество; въ водѣ онъ нерастворимъ и съ трудомъ пропускаетъ черезъ свою среду воду. Последнее качество въ соединеніи съ другими, напр., его способностью растворяться въ эфирѣ, въ бензинѣ, въ сѣрнистомъ углеродѣ, являются причиной его широкаго примѣненія въ области техники. Долгое время каучукъ употребляли только на изготовленіе резинокъ для стиранія карандаша, дѣтскихъ мячиковъ, и т. п., но мало-по-малу примѣненіе его дѣлается обширнѣе: съ 1820 г. изъ него научились готовить эластичныя, упругія ткани, изъ которыхъ выдѣлываютъ подтяжки, подвязки, костяные корсеты и проч., немного позже Макинтошъ изобрѣлъ непрмокаемыя ткани, употребляемыя на верхнее платье и названныя его именемъ «макинтошъ».

Въ 1815 г. изъ вулканизированнаго, т. е., каучука, соединеннаго съ сврой, стали готовить различные приборы, служащіе для химическихъ и хирургическихъ цѣлей. Твердый каучукъ, напоминающій своей крѣпостью слоновую кость, употребляется также на всевозможныя издѣлія, какъ, напр., для изготовленія пуговицъ для платья, рукоятокъ для ножей, цѣпочекъ для часовъ и т. п.

Качимъ, см. Качимъ стѣнной (*Gypsophila muralis* L.).

Качимъ, см. Качимъ метельчатый (*Gypsophila paniculata* Led.).

Качимъ, см. Зольникъ калийный (*Salsola kali* L.).

Качимъ метельчатый, (*Gypsophila paniculata* Led.). Въ свѣжемъ видѣ: Шатерьъ, въ сух. видѣ: Катинше (Ставр.), Перекатинше, Покатинше Перекачиникъ (Вор.), Покатинъ (Самар.) Катунъ, Катичникъ, Покатунъ (Оренб.), Покатникъ, Перекатунъ (Даль), Перекатитель (Полт., Екат., Ворон., Саратов.), Кучеравка (Вор.), Бабій умъ, Бабій разумъ (Пенз., Саратов.), Стоголовникъ (Хар.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «гвоздичныхъ» (*Сагуорфиллацеае* Juss.), распространенное въ ср. Европѣ, преимущественно въ Австріи, и на югѣ Россіи. Корень весьма толстый; стебель къ основанію весьма вѣтвистый, съ раскидистыми вѣтвями, голый; листья острые, ланцетные, съ 3—5 жилками; соцвѣтіе широко-раскидистое, съ многочисленными мелкими бѣлыми цвѣтами; цвѣтоножки въ 2—3 раза длиннѣе чашечки; чашечка колокольчатая, 5-тилопастная, почти перепончатая, съ 5 зелеными полосками; лепестковъ 5, при основаніи постепенно клиновидно-суженныхъ; тычинокъ 10; завязь одногнѣздная; плодъ—коробочка, раскрывающаяся 4 створками. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на открытыхъ, преимущественно степныхъ, мѣстахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Качимъ метельчатый былъ въ медицинѣ въ большемъ ходу въ прежнее время, теперь оставленъ, и только иногда слабый отваръ его употребляется, какъ слабительное, при запорахъ и чувствѣ боли въ области печени. Лошадямъ дается, какъ рвотное.

Качимъ стѣнной (*Gypsophila muralis* L.). Алебастренникъ стѣнной, Качимъ, Корьякъ, Лисица, Лышца, Лисица, Лыщица (Малор.), Мышьи глазки (Сл. Церк.), Мыло (Вор., Тар.), Мыло утиное (Ниж.), Птичье зелье (Хар.). Качимъ стѣнной представляетъ изъ себя небольшую (выш. 1—4 верш.) однолѣтнюю травку изъ семейства «гвоздичныхъ» (*Сагуорфиллацеае* Juss.), распространенную почти повсемѣстно въ Европѣ и въ Россіи. Стебель развѣсистовѣтвистый, листья линейные; розовые, мелкіе цвѣты сидятъ по одному на длинныхъ цвѣтоножкахъ въ развилинахъ стебля. Чашечка колокольчатая, 5-тилопастная, почти перепончатая, съ 5 зелеными полосками; вѣнчикъ 5-тилопастный, розовый, съ темными жилками; тычинокъ 10; завязь одногнѣздная, съ 2-мя столбиками; плодъ—коробочка, раскрывающаяся 4 створками. Цвѣтетъ лѣтомъ. Стѣнной качимъ растетъ на поляхъ, около дорогъ.

Каша рѣчная, см. Медунца (*Spiraea ulmaria* L.).

- Кашешникъ, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).
 Кашики, см. Базиликъ (*Ocimum Basilicum* L.).
 Кашинникъ, см. Репяшокъ обыкнов. (*Agrimonia Eupatorium* L.).
 Кашица, см. Тысячелистникъ обыкнов. (*Achillea millefolium* L.).
 Кашица воробьиная, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris* Moench.).
 Кашка, см. Тысячелистникъ обыкнов. (*Achillea millefolium* L.).
 Кашка, см. Икотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* Dc.).
 Кашка, см. Рыжикъ полевный (*Camelina sativa* Crantz.).
 Кашка, см. Очанка лекарственная (*Euphrasia officinalis* L.).
 Кашка, см. Деревей (*Ptarmica* (*Cartilaginea* Dc.).
 Кашка, см. Земляные орѣшки (*Spiraea filipendula* L.).
 Кашка, см. Медунца (*Spiraea ulmaria* L.).
 Кашка, см. Пупырникъ обыкновенный (*Torilis Anthriscus* Gärtn.).
 Кашка, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).
 Кашка, см. Виноградъ обыкновенный (*Vitis vinifera* L.).
 Кашка, см. Зостера морская, морская трава (*Zostera marina* L.).
 Кашка бѣлая, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea millefolium* L.).
 Кашка бѣлая, см. Бѣлоголовка (*Trifolium montanum* L.).
 Кашка бѣлая, см. Клеверъ бѣлый или ползучій (*Trifolium repens* L.).
 Кашка бѣлоголовикъ, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea millefolium* L.).
 Кашка воробьева, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris* Moench.).
 Кашка грудная } см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea*
 Кашка дикая } *millefolium* L.).
 Кашка дикая } см. Клеверъ полевой (*Trifolium agrarium* L.).
 Кашка желтая }
 Кашка желтая } см. Подмаренникъ желтый (*Gallium ve-*
 Кашка желтенька } *rum* L.).
 Кашка зеленая, см. Лапчатка норвежская (*Potentilla norvegica* L.).
 Кашка красная, см. Клеверъ средний (*Trifolium medium* L.).
 Кашка красная, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).
 Кашка красная, см. Клеверъ краснющій или красный колосо-
 видный (*Trifolium rubens* L.).
 Кашка краснобѣлая, см. Клеверъ краснобѣлый (*Trifolium hybridum* L.).
 Кашка лѣсная, см. Икотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* L.).
 Кашка медовая, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).
 Кашка мелкая, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea millefolium* L.).
 Кашка полевая, см. Цминъ (*Helychrisum arenarium* Dc.).
 Кашка розовая, см. Кошачья лапка (*Antennaria dioica* Gärtn.).
 Кашка сорочья, см. Икотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* Dc.).
 Кашки, см. Клеверъ пашенный (*Trifolium arvense* L.).

Кашнавица, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Кашникъ, см. Клеверъ бѣлый или ползучій (*Trifolium repens* L.).

Кашникъ, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Кашникъ, см. Клеверъ краснобѣлый (*Trifolium hybridum* L.).

Кашникъ, см. Пикотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* L.).

Кашникъ, см. Ренішокъ обыкновен. (*Agrimonia Eupatorium* L.).

Каштанъ дикій, см. Каштанъ конскій обыкновенный (*Aesculus Hippocastanum* L.).

Каштанъ желтый (*Aesculus lutea* Wangenh.). Каштановое дерево, одинъ изъ сѣверо американскихъ видовъ, разводимое у насъ, какъ декоративное растеніе, съ желтыми цвѣтами.

Каштанъ конскій обыкновенный (*Aesculus Hippocastanum* L.), Дикій каштанъ. Красивое, высокое, достигающее нѣсколько саженъ высоты, дерево изъ семейства «конско-каштановыхъ» (*Hippocastanaceae*), родомъ изъ Греціи, но въ настоящее время распространенное во всѣхъ садахъ и паркахъ по всей Европѣ и Россіи. Супротивные пальчатые листья образуютъ густую листву; неправильные бѣлые или розовые цвѣты собраны вверхъ-стоящими пирамидальными метелками, находящимися на верхушкѣ вѣтвей; чашечка колокольчатая, пушистая, съ неодинаковыми лопастями; лепестковъ 4, снабженныхъ ноготками; верхніе 2 крупнѣе остальныхъ и отогнуты. Тычинокъ 7—8, согнутыхъ дугою внизъ; завязь 3-хлѣздная, съ 2 сѣмяпочками въ каждомъ хлѣздѣ, съ 1 или нѣсколькими столбиками; плодъ—коробочка, покрытая шипами, раскрывающаяся 2—3 створками и заключающая крупныя шаровидныя сѣмена. Цвѣтетъ въ маѣ и въ іюнѣ. Въ защищенныхъ мѣстахъ выдерживаетъ даже климатъ Петербурга. Плоды употребляются въ кормъ овцамъ и свиньямъ. (Таб. XVIII, фиг. 100.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ народной медицинѣ употребляются кора и плоды дикаго каштана. Кора содержитъ дубильную кислоту, горькое вещество и особенное вещество, присущее только этому растенію; она полезна при хроническихъ поносахъ, слизетеченіяхъ и кровотеченіяхъ, иногда замѣняетъ хинную корку. Плоды имѣютъ тѣ-же свойства; ихъ обжариваютъ и употребляютъ, вмѣсто кофе, при маточныхъ и геморроидальныхъ кровотеченіяхъ, обильномъ отдѣленіи слизи изъ различныхъ органовъ, такъ, напр., при кашлѣ съ болышимъ отдѣленіемъ мокроты и при чахоткѣ легкихъ. Полторы унціи (45 грм.) истолченныхъ ягодъ заливаютъ 6-ю чашками горячей воды, хорошо кипятятъ, процеживаютъ и пьютъ утромъ и вечеромъ по 2 чашки. Кору толкутъ въ порошокъ и принимаютъ вмѣстѣ съ касатикомъ и горечавкою. На пріемъ берутъ 4—10 гранъ (0, 4—0, 8 грм.) часа черезъ два. При перемежающейся лихорадкѣ порошокъ каштана принимаютъ въ свободные отъ лихорадки дни раздѣльными пріемами отъ $\frac{1}{2}$ унціи до 1 унціи (15—30 грм.) съ бѣлымъ виномъ. Отваръ коры дикаго каштана готовится изъ 1—1½ унціи (30—45 грм.) истолченной сушеной коры, которую заливаютъ 16 унциями (32 стол. ложками) воды

и кипятятъ до 12-ти столовыхъ ложекъ. На пріемъ дается по малой чайной чашкѣ.

Каштанъ красный (*Aesculus Pavia* L.). Одинъ изъ сѣвероамериканскихъ видовъ каштана, съ красными цвѣтами, разводимое у насъ, какъ декоративное растение. Корень его, извѣстный подъ именемъ «ядовитаго», содержитъ особое вещество «санонинъ» и употребляется для мытья шерсти. Корень, вѣтви, листья и всѣ части растенія ядовиты. Вѣда, посредствомъ которой извлекаютъ крахмалъ изъ плодовъ, тоже ядовита и дѣйствуетъ наркотически. Кора дѣйствуетъ, какъ опіумъ.

Каштанъ настоящий (*Castanea vesca* Gärtn. vulgaris Lam.). Каштанъ, Каштанъ сладкій. Настоящій каштанъ представляетъ изъ себя высокое дерево, достигающее нѣсколько сажень выс., изъ семейства «сережчатыхъ» (Amentaceae) и подсемейства «плосконосныхъ» (Cupuliferae), произрастающее въ южной Европѣ и въ Закавказьѣ. Кора свѣтло-бурая, листья перемѣнные, продолговато-ланцетные, зеленые, гладкіе, по краямъ крупно и остро-пильчатые, дл. 5 вершковъ. Цвѣты однодомные въ клубочкахъ, собранные пазушными прямостоячими колосьями. Плоды (каштаны) заключены по 2—3 въ кожистую очень кожучую плюску (обертку), распадающуюся на 4 створки.

Растетъ каштанъ на мѣстахъ почти пустыхъ и безплодныхъ, очень быстро разрастаясь и принося въ обилии плоды, которые считаются питательной и здоровой пищей. Приготавливаютъ ихъ различнымъ образомъ: пекутъ, сушатъ, поджариваютъ, мелятъ въ крупу, муку и проч. Каштаны собираютъ въ теплое солнечное время; собравши, ихъ раскладываютъ на прутьяныхъ плетенкахъ тонкимъ слоемъ и провяливаютъ на солнцѣ въ теченіе жедѣли или восьми дней, унося каждый вечеръ въ теплое помѣщеніе дома. Заготовленные такимъ образомъ каштаны сохраняются долгое время, даже во время перевозки не теряя, ни вкуса, ни способности давать ростки. Древесина каштана цѣнится въ столярномъ дѣлѣ наравнѣ съ дубовой, употребляется такъ-же, какъ строевой лѣсъ. Кора дерева доставляетъ иногда хорошую камедь; наконецъ, кожучая оболочка плодовъ употребляется красильщиками. (Таб. XVIII, фиг. 98.)

Каштанъ сладкій, см. Каштанъ настоящій (*Castanea vesca* Gärtn.).

Каштановое дерево, см. Каштанъ настоящій (*Castanea vesca* Gärtn.).

Катырь, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Каюкъ, см. Ястребинка зонтичная (*Hieracium umbellatum* L.).

Каютина, см. Бѣлогловка (*Trifolium montanum* L.).

Каяпутное дерево (*Melaleuca*). Больше вѣчно зеленящее кустарники и деревья изъ семейства «миртовыхъ» (*Myrtiflorae*), родомъ изъ Остъ-Индіи и Нов. Голландіи, съ приятно пахнущими цвѣтами и узкими иглообразными листьями; множество видовъ ихъ разводится у насъ въ оранжерейхъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ настоящее время добываю-

щесся изъ растенія капутовое масло употребляется только снаружи и то очень рѣдко. Его прежде клали на ватку въ больной зубъ и отъ боли въ уху на ватку въ наружный слуховой проходъ.

Квасецъ, см. Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.).

Квасецъ, см. Щавель обыкновенный (*Rumex acetosa* L.).

Квасецъ, см. Щавель малый (*Rumex acetosella* L.).

Квасецъ горьбиный } см. Щавель малый (*Rumex acetosella* L.).

Квасецъ горобьячий }

Квасецъ, см. Щавель малый (*Rumex acetosella* L.).

Квасница, см. Барбарисъ обыкновенный (*Berberis vulgaris* L.).

Квасникъ } см. Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.).

Квасоля пита, см. Фасоль низкорослая (*Phaseolus compressus* Dc.).

Квассія (*Quassia amara* L.). Высокій (отъ 1 сажени и выше) кустарникъ, съ перистыми листьями, изъ семейства «бальзамныхъ» (*Terebinthineae*), родомъ изъ Суринама, произрастающее также въ Востъ-Индіи, въ сѣв. части Бразиліи и Гвианѣ. Настоя квассіи употребляется для умерщвленія мухъ и прочихъ наѣдокъ. Прежде изъ древесины выжимали стаканы и бокалы, отъ которыхъ налитое въ нихъ вино и жидкость получали горькій вкусъ; въ настоящее время подобную посуду употребляютъ въ Англіи для пива.

МЕДИЦИНСКАЯ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Древесина квассіи въ прошломъ столѣтіи славилась, какъ прекрасное средство отъ кроваваго поноса. Въ настоящее время квассія почти совершенно не употребляется въ медицинѣ, иногда только экстрактъ ея или порошокъ входятъ въ пилюльную массу. Квассія принадлежитъ къ сильно горькимъ веществамъ. Большіе приемы квассіи вызываютъ рвоту, а у животныхъ—параличъ конечностей. Вообще вещество это далеко не безразличное, можетъ принести вредъ, и потому совѣтуютъ лучше замѣнить его другими горькими веществами, какъ-то: горечавкою, исландскимъ мохомъ, одуванчикомъ и горькимъ коломбо.

Квинта, см. Марь Квиноа (*Chenopodium Quinoa* Willd.).

Квитъ } см. Айва (*Cydonia vulgaris* Pers.).

Квитовое дерево }

Кебака, см. Тыква кухонная (*Cucurbita maxima* Duch.).

Кедръ, см. Кедръ ливанскій (*Pinus Cedrus* L.).

Кедръ бѣлый, см. Кипарисъ бѣлый (*Chamaecyparis sphaerol-dea* Sp.).

Кедръ бѣлый (*Bignonia Lencoxylon* L.). Бѣлое эбеновое дерево, Антильское зеленое эбеновое дерево, желтое эбеновое дерево, Гуаякъ ложный. Дерево, произрастающее на о-въ Ямайки; тяжелая древесина служитъ для обшивки судовъ и употребляется также въ столярномъ производствѣ.

Кедръ гималайскій, см. Можжевельникъ обыкновенный (*Juniperus communis* L.).

Кедръ итальянскій, см. Сосна каменная (*Pinus Pinca* L.).

Кедръ красный, см. Можжевельникъ обыкновенный (*Juniperus communis* L.).

Кедръ красный, см. Можжевельникъ красный (*Juniperus Oxycedrus* L.).

Кедръ ливанскій (*Pinus Cedrus* L., sin. *Cedrus libanotica* Lk.). Кедръ (въ Библ.), Кипарисъ, Ель. Ливанскій кедръ есть дерево изъ отдѣла «голосѣмянныхъ» (*Gymnospermae* P.), изъ семейства «елевыхъ» (*Abietineae* Rich.), ближе всего подходящее къ нашимъ лиственницамъ, съ тою разницей, что не теряетъ осенью свою листву; весьма красивое дерево, образующее лѣса, покрывающіе горы Сиріи и Малой Азіи. Древесина его высоко цѣнится; изъ нея былъ выстроенъ храмъ Соломона. Доставляетъ кедровую манну, употребляемую на бальзамированіе труповъ.

Кедръ сахарный, см. Сосна калифорнская сахарная (*Pinus Lambertiana* Dugl.).

Кедръ сибирскій (*Pinus Sembra* L.), Лимбовое дерево (Слав.), Орѣховое дерево (Приарг. кр.), Карпатская сосна (въ Польшѣ), Кедровые орѣхи — Мелёда (Костр.). Сибирскій кедръ есть дерево изъ отдѣла «голосѣмянныхъ» (*Gymnospermae* P.), изъ семейства «елевыхъ» (*Abietineae* Rich.), образующее лѣса на Аляскахъ, Карнатахъ, въ сѣверо-восточной Россіи и въ Сибири; вышиной въ нѣсколько саженъ, съ коричневато-сѣрою корой и длинными темно-зелеными жесткими хвоями, сидящими по 5 вмѣстѣ; молодые побѣги покрыты бархатистымъ рыжеватымъ пушкомъ. Шишки сидячія, яйцевидныя, тупыя, дл. 1—2 вершк., сѣмена безкрылыя; извѣстны подъ именемъ «кедровыхъ орѣшковъ», составляютъ извѣстное лакомство, изъ нихъ также добываютъ масло. Прочная древесина пригодна для токарныхъ и столярныхъ издѣлій. Цвѣтетъ лѣтомъ. Изъ сибирскаго кедра добывается терпентинъ, извѣстный подъ именемъ карпатскаго. (Рис. 105.)

Келекейка } см. Грушанка одноцвѣтная (*Pirola uniflora* L.).
Келикейка }

Кельшникъ } см. Стальникъ пахучій (*Ononis hircina* Jacq.).
Кенишникъ }

Кербель, см. Кервель обыкновенный (*Anthriscus Cerefolium* Hoffm.).

Кербель } см. Бутень клубненосный (*Chaerophyllum bulbosum* L.).
Кервель }

Кервель, см. Кервель обыкновенный (*Anthriscus Cerefolium* Hoffm.)

Кервель, см. Купыръ лѣсной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.).

Кервель, см. Кервель гребневидный (*Scandix Pecten* W.).

Кервель гребневидный (*Scandix Pecten Veneris* L.). Фармацевтическое названіе *Scandix* s. *Pecten Veneris* (Herba). Венеринъ гребень, Игольникъ, Игольникъ, Пряслица венерина. Однолѣтнее травянистое пушистое растение изъ семейства «зонтичныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, Прикаспійскомъ краѣ, въ Крыму и на Кавказѣ. Листья тройко-перистые, съ перисто-раздѣльными сегментами и короткими линейными долями; бѣлые цвѣты въ зонтичныхъ соцвѣтіяхъ безъ покрывала, изъ 3—5 лучей; покрывальце

изъ 5 ланцетныхъ листочковъ; зубцы чашечки незамѣтные; вѣнчикъ 5-тилепестный. Лепестки продолговаго-обратно-яйцевидные, съ загнутою верхушкой, почти не выемчатые; краевые нѣсколько увеличенныя. Тычинокъ 5; завязь нижняя двугнѣздная, съ 1 повислою сѣмяпочкой въ каждомъ гнѣздѣ; столбиковъ 2, расширенныхъ при основаніи въ дискъ, покрывающій верхушку завязи; плодъ состоитъ изъ 2-хъ сѣмянокъ, почти сидячій, сжатый немного съ боковъ, продолговатый, по краямъ остро-шероховатый, съ длиннымъ линейнымъ носикомъ и толстыми ребрами. Растетъ между посѣвами. Цвѣтетъ лѣтомъ. Въ медицинѣ кервель не употребляется. (Рис. 106.)

Кервель дикий, см. Купырь лѣсной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.).

Кервель обыкновенный (*Anthriscus Cerefolium* Hoffm.). Фармацевтическое названіе *Cerefolium* s. *Chaerophyllum chaerophyllum*. Обыкновенный кервель имѣетъ слѣдующія мѣстные названія: Журица, Кербель, Кервель трава, Бутель, Спѣдокъ, Гребунья трава, Требула (пол.), Десна. Онъ представляетъ изъ себя однолѣтнюю траву съ сильнымъ ароматическимъ запахомъ, изъ семейства «зонтичныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), распространенную въ средней и южной Европѣ, въ Привислянскомъ краѣ и въ южной Россіи. Стебель выш. 7—14 верш., надъ узлами пушистый. Листья въ общемъ очертаніи 3-угольные, тройко-перистые, съ широко-овальными, перисто-надрѣзанными долями. Бѣлые цвѣты образуютъ сложные зонтики о 3—5 лучахъ, обыкновенно безъ обвертокъ, но съ односторонними обверточками, состоящими изъ 1—4 прицвѣтниковъ. Чашечка о 5 мало-замѣтныхъ зубчикахъ; вѣнчикъ 5-тилепестный; тычинокъ 5; завязь нижняя двугнѣздная, съ однимъ яичкомъ въ каждомъ гнѣздѣ, наверху завязь несетъ железистый дискъ, выделяющій сладкій сокъ; столбиковъ 2; плодъ—двусѣмянка, продолговатый, сжатый съ боковъ, линейный, гладкій, черный, на верхушкѣ клювообразный, вдвое длиннѣе клюва. Растетъ въ лѣсахъ, между кустарниками, въ садахъ. Цвѣтетъ съ апрѣля до іюня, созреваетъ въ августѣ и сентябрѣ. Употребляется въ пищу, какъ овощъ, и разводится въ нѣсколькихъ сортахъ въ огородахъ, черезъ посѣвъ сѣмянъ, подобно ниннату и петрушкѣ, любитъ хорошо удобренную почву и открытыя солнечныя мѣста. Чтобы имѣть его молодымъ и свѣжимъ все лѣто, нужно сѣять его, по крайней мѣрѣ, разъ въ мѣсяцъ.

Трава кервели отличается приятнымъ, ароматическимъ запахомъ и нѣсколько жгучимъ, подобно анису, вкусомъ, который въ супахъ и соусахъ совершенно незамѣтенъ, но весьма ощутителенъ въ салатахъ, винигретахъ и даже настойкахъ. Многія животныя, особенно кролики, чрезвычайно любятъ кервель. (Таб. XIX, фиг. 103.)

Кервель рѣпный, см. Бутень клубненосный (*Chaerophyllum bulbosum* L.).

Кермекъ, см. Кермекъ широколистный (*Statice latifolia* L.).

Кермекъ, см. Кермекъ татарскій (*Statice tatarica* L.).

Кермекъ (*Statice Gmelini Willd.*). Желтокорень лимонный, Катранъ красный, Катранъ настоящий. Кермекъ луговой, Кермекъ лиловый, Черекати-поле (Екат.), Солонен, Солонечникъ (Уфимск.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «свинцовыхъ» (*Plumbaginaceae Juss.*), распространенное въ средней Европѣ, въ южной Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ, въ Туркестанѣ и Прикаспійскомъ краѣ. Корень несетъ розетку прикорневыхъ листьевъ, обратно яйцевидныхъ или продолговатыхъ, тупыхъ, обыкновенно съ остроконечіемъ, при основаніи суженныхъ въ короткій черешокъ; цвѣточный стебель съ середины или выше середины виллообразно вѣтвистый, несущій щиткообразно-метельчатое соцвѣтіе; верхушечные листья бурые, кожистые, яйцевидные; колоски обыкновенно двуцвѣтковые, собранные густыми односторонними колосьями на отогнутыхъ вѣточкахъ соцвѣтія; чашечка ворончатая, пушистая по жилкамъ, съ 5 короткими и 5 болѣе длинными, островатыми или тупыми, городчатыми лопастями; вѣнчикъ фіолетовый, глубоко-пятираздѣльный; тычинки 5, супротивныхъ долямъ вѣнчика; завязь одногнѣздная, односѣмянная; столбиковъ 5. При цвѣткахъ обхватывающіе, но снизу кожистые по краямъ перепончатые прицвѣтники. Плодъ—односѣмянный мѣшечекъ, заключенный въ остающейся чашечкѣ; сѣмена бѣловатая, съ прямымъ зародышемъ. Растетъ на солончакахъ. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Корень кермека употребляется, главнымъ образомъ, для дубленія и на краску.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ медицинѣ. растение это известно подъ именемъ краснаго бегена; употребляется оно крайне рѣдко, какъ вяжущее средство, отъ кроваваго поноса, маточныхъ кровотеченій и обильнаго отдѣленія слизи.

Кермекъ луговой, см. Кермекъ (*Statice Gmelini Willd.*).

Кермекъ лимонный (*Statice Limonium L.*). Фармацевтическое названіе: *Behen rubrum s. Limonium (Radix, Herba et Semen)*. Звонъ земляной, Колокольчикъ земляной, Свекла дикая, Честъ, Луговая трава, Бегень красный. Лимонный кермекъ есть многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «свинцовыхъ» (*Plumbaginaceae Juss.*), распространенное въ западной Европѣ. Короткое, толстое корневище несетъ пучокъ продолговатыхъ обратно-яйцевидныхъ, остроконечныхъ, одношервныхъ прикорневыхъ листьевъ. Цвѣточный стебель, выш. 7—12 вершковъ, снабженъ чешуйчатыми листьями; многочисленные цвѣтки въ короткихъ, рыхлыхъ колосьяхъ, собранныхъ почти щитковидною метелкой. Чашечка трубчатая, съ 5-тилопастнымъ отгибомъ, при основаніи зеленая, наверху фіолетовая; вѣнчикъ фіолетовый, съ 5-ю, часто при основаніироссыпавшимся, лепестками; тычинокъ 5, завязь одногнѣздная, односѣмянная. Плодъ—мѣшечекъ, помѣщающійся въ остающейся чашечкѣ. Растетъ по морскимъ берегамъ. Цвѣтетъ въ августѣ и сентябрѣ. (Рис. 107.)

Кермекъ лиловой, см. Кермекъ (*Statice Gmelini Willd.*).

Кермекъ татарскій (*Statice tatarica L.*). Вязникъ, Желтый ко-

репъ, Жовтило (Херс.), Кермекъ (въ б. ч. южн. Росс.), Кирмакъ, Кирмякъ (Екат.), Курякъ (Херс.), Туланъ, Неумирающій цвѣтъ (Херс.). Многолѣтнее травянистое голубовато-зеленое растеніе изъ семейства «свинцовковыхъ» (Plumbaginaceae Juss.), распространенное въ южной Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ, въ Туркестанѣ, въ южной и средней Европѣ. Корневище несетъ пучокъ обратно-яйцевидныхъ, остроконечныхъ, при основаніи суженныхъ въ корешокъ, прикорневыхъ листьевъ; цвѣточный стебель невысокій; многочисленные цвѣтки образуютъ густое метельчатое соцвѣтіе. При каждомъ цвѣткѣ 2 прицвѣтника, изъ которыхъ нижній обратно-яйцевидный, съ однимъ колючимъ остроконечіемъ; верхній съ 3-мя, почти одинаковыми, довольно длинными остроконечіями; чашечка трубчатая, 5-тилопастная, пушистая, вѣнчикъ фиолетовый 5-тираздѣльный, тычинокъ 5; завязь одногнѣздная, односѣмянная; столбиковъ 5; плодъ—мѣшечекъ, заключенный въ остающуюся чашечку. Цвѣтетъ лѣтомъ. Корень употребляется на краску и на дубленіе кожъ.

Кермекъ широколистный (*Statice latifolia* L. sin *Statice coriaria* Pers.). Дубильникъ, Дубильный корень, Желтокорень завязный, Кармякъ, Кермекъ, Кермякъ, Кормякъ (Ставр.), Кирмякъ (Донъ), Киромакъ, Кирмакъ, Тушекъ, Чембарникъ, Ченбарникъ (Даль), Чиббарникъ. Широколистный кермекъ есть многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «свинцовковыхъ» (Plumbaginaceae Juss.), распространенное въ южной Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ, въ средн. Европѣ. Корневище этого кермека несетъ розетку прикорневыхъ крупныхъ, продолговатыхъ, тупыхъ, суженныхъ при основаніи въ довольно длинный черешокъ, листьевъ; цвѣточный стебель высокій, весьма вѣтвистый; многочисленные фиолетовые цвѣты образуютъ широкое раскидистое метельчатое соцвѣтіе; чашечка трубчатая, съ 5-тилопастнымъ отгибомъ, усаженная по жилкамъ рѣдкими волосками; вѣнчикъ 5-тираздѣльный; тычинокъ 5; завязь одногнѣздная, односѣмянная; столбиковъ 5; плодъ—мѣшечекъ, заключенный въ остающуюся чашечку. Растетъ въ степяхъ; цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Употребляется на дубленіе кожъ и служитъ для добыванія соды.

Кермякъ, см. Кермекъ широколистный (*Statice latifolia* L.).

Кивухъ, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).

Кизиль, см. Кизиль настоящий (*Cornus mas* L.).

Кизиль, см. Кизильникъ обыкновен. (*Cotoneaster vulgaris* Lindl.).

Кизиль настоящий (*Cornus mas* L.). Деренъ, Дерень, Кизиль, Кизиль (Малор.), Ягода дехановая, Роговикъ. Настоящій кизиль есть кустарникъ или дерево (выш. нѣсколько саженъ) изъ семейства «кизиловыхъ» (Cornaceae Dc.), распространенное въ средней и южной Европѣ, встречающееся въ юго-западной Россіи, въ Крыму и на Кавказѣ; съ супротивными, яйцевидными, длинно-заостренными, цельнокрайними, темно-зелеными листьями. Золотисто-желтые цвѣты собраны зонтиками, снабженными 4-хлестной оберткой. Цвѣтки правильные. Чашелистиковъ, ле-

пестковъ и тычинокъ по 4; завязь нижняя двугнѣздная, съ 1-мъ столбикомъ. Плодъ—продолговатый красный (рѣже желтый) костянки. Растетъ между кустарниками и въ рощахъ. Часто разводится для украшенія на югѣ Россіи въ садахъ. Настоящій кизиль цвѣтетъ рано весной, до появленія листьевъ. Древесина его весьма цѣнится въ столярномъ и токарномъ производствахъ. Кисловатые, пріятные на вкусъ, плоды идутъ на варенье, для приправы кушаній и для приготовленія ликеровъ и наливокъ. Кизиль въ медицинѣ теперь не употребляется. (Таб. XIX, фиг. 105 и 106.)

Кизиль, см. Кизиль настоящій (*Cornus mas* L.).

Кизиль } см. Мушмула обыкновенная (*Mespilus germanica* L.).

Кизиль дикій }

Кизиль нѣмецкій, см. Мушмула обыкн. (*Mespilus germanica* L.).

Кизильникъ, см. Кизильникъ обыкнов. (*Cotoneaster vulgaris* Lindl.).

Кизильникъ обыкновенный (*Cotoneaster vulgaris* Lindl.).

Ирга, Кизильникъ (Перм.), Кизиль, Курслѣпъ (Симб.), Грай, Тяжкое дерево (Гродн.), Чашковое дерево, Цвѣтникъ, Цвѣчникъ (Перм.), Шампольникъ. Обыкновенный кизильникъ есть низкій (выш. 1 арш.—2 арш.) очень вѣтвистый кустарникъ изъ семейства «яблоневыхъ» (*Rosaceae* Lindl.), распространенный почти по всей Европѣ и встрѣчающийся въ Россіи только по западной окраинѣ, во всей-же остальной Россіи онъ замѣненъ чернымъ кизильникомъ (*Cotoneaster nigra* Woblbg.), отличающимся отъ настоящаго только черными плодами. Листья кизильника очередные, коротко черешковые, округло-яйцевидные, цѣльно-крайніе, снизу бѣло-войлочные, снабженные прилистниками. Цвѣты мелкіе, блѣдно-розовые, одиночные или 2—3 на одной цвѣтоножкѣ. Чашечка 5-тираздѣльная; 5 лепестковъ и многочисленныя тычинки сидятъ на кольцѣ (дискѣ), находящемся на краѣ выгнутаго цвѣтоложа. Завязь 2—5-тигнѣздная, съ такимъ-же количествомъ столбиковъ; срастающаяся съ цвѣтоложемъ и разрастаясь съ нимъ вмѣстѣ, она даетъ костячковый, шаровидный, красный, величиною съ горошину, плодъ. Растетъ между кустарниками на известковыхъ склонахъ. Цвѣтетъ весною. (Рис. 108.)

Кизильникъ, см. Свидина (*Cornus sanguinea* L.).

Кики, см. Кукуруза обыкновенная (*Zea Mays* L.).

Киликейка }

Килитейка }

Киллетекъ }

Киллетена }

см. Грушанка одноцвѣтная (*Pirola uniflora* L.).

Килунъ, см. Бухарникъ мягкій (*Holeus mollis* L.).

Килька, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).

Кильная трава, см. Фиалка опушенная (*Viola hirta* L.).

Кильная трава }

Кильникъ }

см. Грыжникъ голый (*Herniaria glabra* L.).

Кина, см. Картофель обыкновенный (*Solanum tuberosum* L.).

Киннамонъ, см. Корица китайская (*Cinnamomum Cassia* Blum.).

Киннамонъ, см. Корица настоящая (*Cinnamomum seylonicum* Nees.).

Кипарисъ, см. Кипарисъ обыкновенный (*Cupressus sempervirens* Tournef.).

Кипарисъ обыкновенный (*Cupressus sempervirens* Tournef.).

Кипарисъ. Вѣчно-зеленое, въ нѣсколько саж., дерево изъ отдѣла «голосѣмянныхъ» (*Gymnospermae* P.), изъ семейства «кипарисныхъ» (*Cupressineae* Rich.), съ чешуйчатыми, расположенными кольцами, мелкими листьями и вверху стоящими или испускающимися вѣтвями. Обыкновенный кипарисъ ведетъ свое происхожденіе изъ Малой Азіи, сѣверной Африки и южной Европы, а у насъ разводится, какъ комнатное и декоративное растеніе. Кипарисъ считался у древнихъ, считается и нынѣ, символомъ смерти и служитъ украшеніемъ гробницъ и храмовъ; прямая, красивая древесина пригодна для тонкихъ токарныхъ работъ. Смола, выделяемая древесиной, отличается пріятнымъ ароматическимъ запахомъ и считалась у древнихъ цѣлебнымъ средствомъ отъ грудныхъ болѣзней, почему доктора посылали больныхъ въ Кандію, гдѣ росли кипарисовые лѣса. Эфирное масло, добываемое изъ древесины, древніе употребляли для бальзамированія труповъ. Плоды и кора, отличающиеся вяжущимъ свойствомъ, употребляются и до сего времени въ Турціи, какъ лекарство.

Видъ кипариса (*Cupressus trioides* L.), находящійся въ Канадѣ, въ сѣв. Америкѣ, доставляетъ цѣнную по своей прочности и крѣпости древесину, употребляемую, какъ строительный матеріалъ, и извѣстную подъ названіемъ «бѣлаго кедра». У насъ этотъ видъ кипариса разводится тоже въ качествѣ декоративнаго растенія.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Плоды кипариса имѣютъ вяжущее свойство и потому прежде употреблялись противъ перемежающихся лихорадокъ и при обильныхъ кровотеченияхъ и отдѣленіяхъ слизи. За послѣднее время кипарисное масло врачи предлагали противъ глистовъ. Иглы кипариса, настоенныя на винѣ, даются старикамъ отъ недержанія мочи.

Кипарисъ, см. Кедръ ливанскій (*Pinus Cedrus* L.).

Кипарисникъ, см. Параличная трава (*Ajuga Chamaepltyls* L.).

Кипарисная, см. Вшивица болотная (*Pedicularis palustris* L.).

Кипарисная трава (*Santolina Chamaecyparissus* L.). Фармацевтическое названіе кипарисной травы—*Santolina s. Abrotanum* femina. Невысокая войлочкообразная трава, растущая на берегахъ Средиземнаго моря. Изъ нея выделяютъ свѣтлыни; кромѣ того, ее употребляютъ для истребленія моли.

Кипарисное сѣмя, см. Канарейное сѣмя (*Phalaris canariensis* L.).

Киперъ, см. Ковыль волосистый (*Stipa capillata* L.).

Киперы, см. Алканна настоящая (*Lawsonia alba* Lam.).

Кипецъ, см. Ковыль перистый (*Stipa pennata* L.).

Кипрей, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Кипрей волосистый (*Epilobium hirsutum* L.). Жидра (Орл.), Расщепъ (Курск.), и др. общ. съ *Epilobium angustifolium*, Иванъ-чай

(см. выше: Иванъ-чай, *Epilobium angustifolium* L.). Кипрей есть многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «онагриковыхъ» (*Onagraceae* Juss.), распространенное почти по всей Европѣ и Россіи. Стебель до 2 арш. выш., цилиндрический, вѣтвистый, мохнатый. Листья продолговато-ланцетные, стебле-объемлющіе, немного низбегающіе, зубчатые, мохнатые; верхніе очередные, нижніе супротивные. Цвѣты довольно крупныя, пурпуровыя. Чашечка 4-храздѣльная; вѣнчикъ воронковидный, 4-хлепестный; тычинокъ 8; завязь нижняя, 4-хгнѣздная. Плодь—длинная 4-хгранная, 4-створчатая коробочка; сѣмена снабжены хохолкомъ. Растетъ на влажныхъ мѣстахъ, по берегамъ рѣкъ, по канавамъ, въ рощахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. (Рис. 109.)

Кипрей горный (*Epilobium montanum* L.). Брытокъ (Полт.), Купена (Могил.). Травянистое многолѣтнее растеніе изъ семейства «онагриковыхъ» (*Onagraceae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и Россіи. При основаніи стебля короткія побѣги съ розетками листьевъ; стебель прямой, цилиндрический, покрытъ короткими, прижатыми волосками; листья яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, неровно-зубчатые, нижніе—супротивные, черешковые, верхніе—очередные. Свѣтло-розовые цвѣты въ верхушечныхъ кистяхъ. Чашечка глубокая, 4-храздѣльная, послѣ цвѣтенія отпадающая, съ туповатыми долями; лепестковъ 4; тычинокъ 8; 4 длиннѣе и 4 короче. Завязь нижняя, 4-хгнѣздная; плодь—4-хгранная, 4-створчатая коробочка; сѣмена при основаніи утолщенные, снабженные хохолкомъ. Растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками, около провѣзныхъ дорогъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. (Рис. 110.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Всѣ виды кипрея имѣютъ вяжущее свойство; поэтому въ народѣ чай изъ кипрея пьютъ для остановки кровотеченія, также изъ него дѣлаютъ припарки на воспалительныя опухоли.

Кипрейникъ, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.)

Кипри, см. Алканна настоящая (*Lawsonia alba* Lam.)

Кипѣка, см. Тыква обыкновенная (*Cucurbita Pepo* L.)

Киркажунъ, см. Кирказонъ обыкнов. (*Aristolochia clematitis* L.)

Кирказонъ, см. Кирказонъ обыкнов. (*Aristolochia clematitis* L.)

Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia clematitis* L.). Фармацевтическое названіе *Aristolochia vulgaris*, s. *tenuis*. Злая трава (Каз.), Змѣевникъ, Кирказонъ (Двиг.), Киркажунъ, Киркашунъ (Северг.), Кокорнакъ, Кокорникъ, Кокорнякъ, Кокорва, Куколь (Астр.), Кумашникъ, Кумашныя яблоки (Каз.), Кутяшныя яблоки, Кутяшныя ягоды (Нижег.), Лихорадочная трава (Нижег.), Мечъ трава (Кал.), Мячь трава, Пухлянка (Бесс.), Плиновникъ, Пхиновникъ, Хиновникъ (Ур.), Филовникъ (Вор.), Финовникъ (Тамб., Вор., Саратов., Астр.), Филильникъ, Филѣльникъ (Мал. Кален.), Филѣйникъ (Херс., Сам.), Пховникъ, Пхиховникъ, Филонникъ (Полт.), Филоникъ (Курск., Вор.), Филоникъ стеной (Екат.), Филникъ (Екат.), Фелоникъ (Курск.), Фіона (Вор.), Хвилонникъ, Хвалильникъ (Харьк.), Хвелинникъ, Хвалинникъ, Хвойлѣчникъ, Растъ,

Ростъ, Ластъ, Расторошша, Рожальница, Смольникъ, Смольнякъ Царская борода (Полтавск. губ.), Целильникъ (Винд.), Шипковникъ (Северг.), Щиковикъ, Яблоко земное. (Таб. XIX, фиг. 107.) Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «кирказоновыхъ» (*Aristolochiaceae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ средней и южной Россіи, свѣтло-зеленое, съ ползучимъ, изгибающимся корневищемъ; стебель простой, прямостоящій. Листья очередные, сердцевидные, снизу сизые. Желтые цвѣты сидятъ пучками въ углахъ листьевъ; околоцвѣтникъ правильный, 3-хлопастный, непадающій, трубчатый, на верхушкѣ продолженный въ языковидный отгибъ. Тычинокъ 6, сросшихся со столбикомъ; завязь нижняя 6-тигыздная, съ многочисленными сѣмяпочками; столбикъ короткій, съ лучистымъ 6-тилопастнымъ рыльцемъ. Плодъ—коробочка, раскрывающаяся щелями вдоль перегородокъ съ многочисленными сплюснутыми сѣменами. Растетъ обыкновенно по берегамъ рѣкъ, между кустарниками и на опушкѣ рощъ лѣсовъ. Цвѣтетъ лѣтомъ.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Кирказонъ употребляется почти исключительно только въ народной медицинѣ, хотя можно найти въ аптекахъ масло изъ корней кирказона, также порошки изъ его корней и водную вытяжку. Кирказону приписываютъ свойства дѣйствовать мочегонно и вызывать мѣсячныя очищенія, разжижать мокроту и вызывать нешарину, потому корни кирказона принимаютъ внутрь отъ водянки, отъ кашля, въ особенности при чахоткѣ легкихъ, отъ простуды и ломоты въ суставахъ, также отъ цынги и подагры. Порошокъ корней кирказона настаиваютъ на винѣ и пьютъ настойку передъ ѣдою. Винная настойка кирказона имѣетъ послабляющее дѣйствіе.

Кирмакъ } см. Кермакъ татарскій (*Statice tatarica* L.).
Кирмякъ }

Кирмакъ, см. Кермакъ широколистный (*Statice latifolia* L.).

Кирпичникъ, см. Норичникъ водяной (*Scrophularia aquatica* L.)

Киселица, см. Смородина красная (*Ribes rubrum* L.).

Киселица, см. Щавель обыков., кислый (*Rumex acetosa* L.).

Киселка, см. Щавель малый (*Rumex acetosella* L.).

Киселка } см. Щавель обыкновенный, кислый (*Rumex acetosa* L.).
Киследь }
Кисленица }

Кисленица, см. Смородина красная (*Ribes rubrum* L.).

Кисленица заячья, см. Кислица обыкн. (*Oxalis acetosella* L.).

Кисленка, см. Щавель малый (*Rumex acetosella* L.).

Кисленка заячья, см. Кислица обыков. (*Oxalis acetosella* L.).

Кислецъ, см. Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.).

Кислецъ (*Polygonum polymorphum* Led.). Капуста башкирская, Капуста татарская (Оренб.), Кислица (Перм.). Кислецъ есть многолѣтнее растение изъ семейства «гречишныхъ» (*Polygonaceae* Juss.), распространенное въ южной и юго-восточной Россіи, на Кавказѣ, въ Сибири, въ М. Азій. Стебель пря-

мой. вѣтвистый, съ линейно-ланцетными или ланцетными, спиральными листьями, съ расщепленными и усаженными длинными волосами влагалищами, снизу прижато-пушистые. Красноватые или бѣлые пѣты образуютъ многоцвѣтковые кисти, собранныя метельчатымъ соцвѣтjemъ; околоцвѣтникъ при основаніи часто железистый, глубоко-4—5-тираздѣльный, съ почти одинаковыми долями, остающійся при плодѣ. Тычинокъ 8; завязь свободная, при основаніи съ железистымъ кольцомъ, зубцы котораго чередуются съ тычинками; столбиковъ 2—3, съ головчатыми рыльцами; плодъ — трехгранный гладкій сѣмянки. Растетъ на влажныхъ лугахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Употребляется, какъ шавель.

Киселецъ, см. Шавель обыкновенный, кислый (*Rumex acetosa* L.).

Киселецъ цвѣтушій, см. Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.).

Киселиница, см. Смородина красная (*Ribes rubrum* L.).

Киселинка, см. Шавель обыкнов., кислый (*Rumex acetosa* L.).

Кислицъ, см. Дурнишникъ обыкновенный (*Xanthium strumarium* L.).

Кислица, см. Барбарисъ обыкновенный (*Berberis vulgaris* L.).

Кислица, см. Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.).

Кислица, см. Киселецъ (*Polygonum polymorphum* Led.).

Кислица, см. Яблоня (*Pirus Malus* L.).

Кислица, см. Ревень французскій (*Rheum undulatum* L.).

Кислица, см. Смородина красная (*Ribes rubrum* L.).

Кислица, см. Шавель обыкновенный, кислый (*Rumex acetosa* L.).

Кислица заячья, см. Кислица обыкнов. (*Oxalis acetosella* L.).

Кислица заячья, см. Василистникъ голубковый (*Thalictrum aquilegifolium* L.).

Кислица коневья } см. Шавель конскій или домашній (*Rumex domesticus* L.).

Кислица конская }

Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L. sin. *Oxalis vulgaris* Rupr.). Фармацевтическое названіе кислицы *Acetosella* s. *Lujula*, s. *Alleluje* v. *Trifolium acetosum*, v. *Oxytriphylum* (Herba). Аллилуія трава, Борщовка (Вѣлор.), Волосатикъ, Воробьева кислота, Дидиль, Заячья капуста (Могил., Кал., съ нѣм.), Заячья кислица (Могил.), Заячья кисленка (Вят.), Заячья кисленица (Вят.), Заячья соль (Волог., Костр.), Заячья травка (Мог.), Заячій шавель (Екат., Мог.), Заячій шавухъ (Малор.), Квасецъ (Мог.), Квасокъ (Вит.), Кислица трава, Кислица шавельная, Кислушка (Вят.), Кисличка (Яр.), Киселецъ (Костр.), Киселецъ цвѣтушій, Оробинецъ, Солошки, Трилистникъ кислый, Шавель благовонный, Шавель мелкій, Шавель гусиный (Кал.), Шавель троцкій (Влад., Нѣж.), т. е., трилиственный. (Таб. XIX, фиг. 109.)

Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «кисличныхъ» (*Oxalideae* DC.), распространенное почти во всей Европѣ и Россіи. Корневище ползучее, покрытое мясистыми чешуйчатыми листьями и длинно-черешковыми, тройчато-сложными, зелеными листьями, съ обратно-сердцевидными листочками.

Воздушнаго стебля нѣтъ. Все растение вып. 2—3 верш. Розовато-бѣлые цвѣты на длинныхъ цвѣтоножкахъ, одиночныя, пазушныя; чашелистиковъ 5; лепестки остающіеся, въ числѣ 5, длиннѣе чашелистиковъ въ 4 раза, обратно-яйцевидные, бѣлые, съ розовыми жалками, рѣже розовые. Тычинокъ 10, при основаніи сросшихся. 5—находящихся противъ лепестковъ, длиннѣе прочихъ; столбиковъ 5 свободныхъ; завязь 5-тигнѣздная, съ осевымъ сѣмяносомъ и нѣсколькими сѣмяпочками въ каждомъ гнѣздѣ; плодъ — продолговатая коробочка, раскрывающаяся гнѣздоразрывно или вдоль перегородокъ щелями, изъ которыхъ выбрасываются сѣмена. Растетъ въ тѣнистыхъ лѣсахъ. Цвѣтетъ весною.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Кислица обыкновенная употребляется въ народной медицинѣ. Она имѣетъ сильный кислый вкусъ и очень богата солями калия, потому можетъ замѣнять щавелевую кислоту. Она принадлежитъ къ числу противоцинготныхъ травъ. Изъ свѣжей травы кислицы завариваютъ чай и пьютъ его чашками. Кисличинный чай утоляетъ жажду, исправляетъ дурной вкусъ во рту и уменьшаетъ поносъ. Изъ кислицы также приготовляютъ салатъ и различныя похлебки. Ее кладутъ въ молоко для приготовления сыворожки.

Кислица рогатая (*Oxalis corniculata* L.). Однолѣтняя трава изъ семейства «кисличныхъ» (*Oxalideae* Dc.), родомъ изъ Америки, распространенная въ средней и южной Европѣ, въ Крыму и на Кавказѣ; покрыта рѣдкими волосками; стебель, дл. 3—7 верш., съ распростертыми вѣтвями; листья очередные, сложные, снабженные двумя маленькими прилистниками, приросшими къ черешкамъ. Блѣдно-желтые цвѣты (по 2—5) собраны зонтиками, сидящими на длинныхъ, тонкихъ цвѣтоносахъ. Чашелистиковъ и лепестковъ по 5; тычинокъ 10, сросшихся при основаніи; столбиковъ 5 свободныхъ; завязь 5-тигнѣздная, съ осевымъ сѣмяносомъ и нѣсколькими сѣмяпочками въ каждомъ гнѣздѣ. Плодъ — продолговатая коробочка, раскрывающаяся гнѣздоразрывно или вдоль перегородокъ щелями, изъ которыхъ выбрасываются сѣмена. Растетъ на поляхъ и сорныхъ мѣстахъ; принадлежитъ къ числу сорныхъ травъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. (Рис. 111.)

Кислица собачья, см. Частуха обыкновенная (*Alisma Plantago* L.).

Кислица собачья, см. Чертополохъ разнолистный (*Cirsium heterophyllum* L.).

Кислица трава, см. Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.).

Кислица трава } см. Щавель малый (*Rumex acetosella* L.).

Кислица щавельная } см. Щавель малый (*Rumex acetosella* L.).

Кислица щавельная, см. Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.).

Кисличка, см. Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.).

Кисличка, см. Грушанка однобокая (*Pirola secunda* L.).

Кисличка, см. Щавель обыкновенный, кислый (*Rumex acetosa* L.).

Кисличная, см. Щавель малый (*Rumex acetosella* L.).

Кислота боровая, см. Плауны сплюснутый (*Lycopodium complanatum* L.).

Кислота воробьева, см. Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.).

Кислота воробьева } см. Щавель малый (*Rumex acetosella* L.).

Кислуха } см. Щавель обыкновенный, кислый (*Rumex*

Кислушка } *acetosa* L.).

Кислушка, см. Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.).

Кислядь } см. Щавель обыкновенный, кислый (*Rumex ace-*

Кислядки } *tosa* L.).

Кислянка, см. Барбарис обыкновенный (*Berberis vulgaris* L.).

Кислянка, см. Бересклет европейский (*Evonymus europaeus* L.).

Кислянка, см. Смородина красная (*Ribes rubrum* L.).

Кислянка, см. Щавель обыкновенный, кислый (*Rumex acetosa* L.).

Кисточки полевые, см. Истодъ обыкновенный (*Polygala vulgaris* L.).

Кисточникъ, см. Кисточникъ стрелистный (*Adenostyles albifrons* Rehb.).

Кисточникъ стрелистный (*Adenostyles albifrons* Rehb.). Многолетнее травянистое растение из семейства «сложноцветныхъ» (*Compositae* Adams.), распространенное въ средней Европѣ. Стебель выш. 1—1½ арш. Листья почковидные, съ неравными крупными зубцами. Розовые, рѣже бѣлые, цвѣты по 3—6 въ корзинкахъ. Цвѣтетъ въ июлѣ и августѣ.

Китайскій огонекъ (*Senna indica* L.). Извѣстное любимое садовое декоративное растение, выш. 1½—2½ арш., съ красными цвѣтами и большими листьями, родомъ изъ Востъ-Индіи. Сѣмена растенія идутъ, какъ суррогатъ кофе, вообще-же употребленіе его совсѣмъ оставлено.

Китайская трава, см. Чай китайскій или настоящій (*Thea chinensis* Sims.).

Китка, см. Кукуруза обыкновенная (*Zea Mays* L.).

Китъ, см. Картофель (*Solanum tuberosum* L.).

Китятки полевые, см. Истодъ хохлатый (*Polygala comosa* Schk.).

Кихавецъ, см. Чихотная трава (*Ptarunica vulgaris* Dc.).

Кичилибуха, см. Рвотные орѣхи, Нуксъ-вомика (*Strychnos Nuxvomica* L.).

Кишекъ, см. Вербейникъ обыкновенный (*Lysimachia vulgaris* L.).

Кишечки, см. Опарестъ кормовой (*Onobrychis sativa* Lam.).

Кишка горобьяча, см. Перечникъ широколистный (*Lepidium latifolium* L.).

Кишка козья, см. Рута козья трава (*Galega officinalis* L.).

Кишмишъ, см. Виноградъ обыкновенный (*Vitis vinifera* L.).

Кишнець } см. Кишнець огородный (*Coriandrum sativum* L.).

Кишнець }

Кишнецъ огородный (*Coriandrum sativum* L.). Кишнецъ (Вел. Росс.), Кишнецъ (Малор.), Коляндр, Колендра (Малор.), Воюнчее зелье (Тавр.), Клоповникъ, Сѣмя Коріандрово (Слов.), Кишнецовое сѣмя. Огородный кишнецъ представляетъ изъ себя однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «зонтичныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), распространенное въ Южной Европѣ, встречающееся въ Закавказьѣ и въ Туркестанѣ. Стебель круглый, полосатый, голый. Нижніе листья перистые, съ округлыми, надрѣзанными или глубоко-раздѣльными, по краямъ пильчатыми, долями. Бѣлые или красноватые цвѣты образуютъ сложные зонтики о 5—8 лучахъ, безъ обвертокъ, но съ обверточками, состоящими изъ небольшого числа узкихъ прицвѣтничковъ. Чашечка о 5 зубчикахъ; лепестковъ и тычинокъ по 5; у красивыхъ цвѣтовъ наружные лепестки крупнѣе внутреннихъ. Завязь нижняя, 2-хлѣздная, съ однимъ яичкомъ въ каждомъ гнѣздѣ; на верхушкѣ несетъ железистую подушечку (дискъ), выделяющую сладкій сокъ; столбиковъ 2; плодъ шаровидный, при созрѣваніи нераспадающійся, съ 10 извилистыми главными, 12 примыми, болѣе выдающимися, вторичными промежуточными ребрами. Растетъ по краямъ полей, между хлѣбами, въ садахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Разводится на югѣ Россіи на огородахъ и на поляхъ ради сладковатыхъ ароматическихъ плодовъ, употребляющихся, главнымъ образомъ, въ ликерномъ производствѣ. Для употребленія собираютъ зрѣлыя сѣмена, изъ которыхъ добываютъ желтоватое эфирное благовонное масло. Сѣмена запекаютъ также въ хлѣбы вмѣсто аниса и тмина и прибавляютъ иногда въ пиво, для сообщенія послѣднему большей пряности. Въ Англіи употребляютъ даже свѣжіе листья кишнеца ввидѣ салата.

Все растение издаетъ сильный, непріятный, отзывающійся клонами, запахъ, которымъ пользуются для изгнанія мышей изъ амбаровъ и житницъ. (Рис. 112.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Сѣмена кишнеца дѣйствуютъ возбуждающимъ образомъ на желудочно-кишечный каналъ и потому употребляются въ народѣ, какъ средство противъ застарѣлыхъ разстройствъ органовъ пищеваренія, также противъ обильнаго отдѣленія жидкости слизистыми оболочками. Сѣмена кишнеца вмѣстѣ съ бузиновымъ цвѣтомъ настаиваютъ на винѣ. Для воднаго отвара кишнеца берутъ 2 драхмы (8 грм.) сѣмени и заливаютъ ихъ 12-тью столовыми ложками кипящей воды. Обахаренныя сѣмена кишнеца употребляются вмѣсто конфетъ и служатъ для уничтоженія непріятнаго запаха изо рта. Домашнимъ животнымъ сѣмя кишнеца, истолченное въ порошокъ, дается отъ глистовъ.

Кишнецовое сѣмя. см. Кишнецъ огородный (*Coriandrum sativum* L.).

Кизилъ, см. Свидина (*Cornus alba* L.).

Кизиль, см. Кизиль настоящий (*Cornus mas* L.).

Кирмакъ, см. Кермакъ широколистный (*Statice latifolia* L.).

Кіюшки
 Кіаки
 Кіяхъ
 Кіяхъ
 Кіашокъ } см. Кукуруза обыкновенная (*Zea Mays* L.).
 Кладонія } см. Рогоза узколистная (*Typha angustifolia* L.).

Кладонія красноголовая (*Cladonia coccifera* L.) Фармацевтическое название: *Herba Ignis Musci s. Lichen cocciferus*. (Таб. XIX, фиг. 108). Боровия трубки, Ягель красноголовый. Ягель или лишайникъ изъ семейства «дискомицетовъ» (*Discomicetes*), встречающийся въ сосновыхъ борахъ, преимущественно на песчаной почвѣ. На мелкомъ листовидномъ ростѣъ возвышаются низыя кубковидныя колонки съ яркочерными апотеціями (т. е., блюдцевидными вѣстиплннами сумокъ со спорами).

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ Вологодской губерніи употребляется отваръ кладоніи красноголовой для полосканія отъ боли во рту.

Кладъ, см. Дубровка (*Veronica Chamaedrys* L.).

Клатца, см. Черёда трехраздѣльная (*Bidens tripartita* L.).

Клеверъ бѣлый, см. Клеверъ бѣлый ползучій (*Trifolium repens* L.).

Клеверъ бѣлый ползучій (*Trifolium repens* L.). Фармацевтическое название бѣлаго ползучаго клевера: *Trifolium album* (Flores). Хрепатый барвинокъ (Мамор.), Бѣлоголовка (Олон.), Бѣлый дятельникъ или дятловникъ (Тамб.), Бѣлая дятлина или дятловпа (разн.), Бѣлая кашка, Кашникъ (Моск.), Бѣлый клеверъ (Сел. Хоз.) Бѣлая коврижка (Олон.), Бѣлый куньякъ (Нижег.) Лтки (Мамор.), Медовикъ (Вят.), Медовникъ бѣлый (Сарат.), Медокъ, Медунца (Вят.), Бѣлая мякушка (Олон.), Бѣлые орѣшки (Полт., Екат.), Горішки (Полт.), Сѣрое зелье (Полт.), Сіре-зелле (Мамор.), Тройнячокъ (Екат.), Полевой хлѣбникъ (Сарат.), Хрестикъ (Мамор.), Яблучка (Кіевск.). Бѣлый клеверъ есть травянистое многолѣтнее растеніе изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.), весьма обыкновенное во всей Европѣ и Россіи. Стебель его вѣтвистый, длинный (дл. 6 1/2—11 1/2 вершк.), съ ползучими укореняющимися побѣгами; листья тройчатые, съ обратно-яйцевидными, мелко-пильчатыми, болышею частью съ подковообразнымъ свѣтлымъ пятномъ по срединѣ листочками; прилистники перепончатые, яйцевидные, вдругъ переходящіе въ остріе. Бѣлые или розоватыя цвѣты въ шаровидныхъ головкахъ, сидящихъ на длинныхъ ножкахъ, превышающихъ листья и находящихся въ углахъ маленькихъ ланцетныхъ прицвѣтничковъ. Чашечка голая, вдвое короче вѣнчика, 5-зубчатая; вѣнчикъ сростно-лепестный, неотпадающій, 5-тиленестный, мотыльковый (верхній образуетъ флагъ, 2 боковые—крылья, 2 нижніе—срастаются на подобіе лодочки); 10 тычинокъ срастаются своими нитями въ 2 пучка (двубратственные), причемъ 9 тычинокъ снаиы вмѣстѣ, а одна свободна. Плодъ—линейно продолговатый 3—6-ти сѣмянный бобъ, перепончатый, разрывающійся не-

правильно. Растетъ на поляхъ, лугахъ, около дорогъ. Цвѣтетъ съ конца мая по сентябрь, созрѣваетъ съ августа до октября. Разводится въ большомъ количествѣ, какъ хорошая кормовая трава. Родится на всякой землѣ, но особенно любитъ глинистую, нѣсколько известковую, черноземную почву. Принадлежитъ къ числу медоносныхъ растений. (Рис. 113.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Клеверъ бѣлый употребляется въ народной медицинѣ. Настой цвѣтовъ пьютъ отъ ломоты, чай изъ травы—отъ женскихъ болѣзней, отъ грыжи, отъ удушья и отъ чахотки.

Клеверъ желтый, см. Люцерна серповид (Medicago falcata L.).

Клеверъ желтый заячій, см. Язвенникъ обыкновенный (Anthyllis Vulneraria L.).

Клеверъ красно-бѣлый (Trifolium hybridum L.). Дятловникъ (Тамб., Пенз.), Дятловникъ, Дятловина бѣлая (Ниж.), Дятлина (Яр.), Кашка красно-бѣлая. Камникъ (Моск.), Клеверъ шведскій (съ пѣм.), Краснобай (Могил.), Красноголовникъ (Екат.), Мордашка (Сарат.), Свертки (Полт.), Светлебай (Вятск.), Суховерника (Тавр.), Трехлисточникъ ползучій. Красно-бѣлый клеверъ есть многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «могильковыхъ» (Papilionaceae L.), распространенное въ Европѣ и въ Россіи. Стебель приподнимающійся, вѣтвистый, съ полыми междоузліями (выш. отъ 1½—2 футъ); листья тройчатые, съ ромбически-эллиптическимъ, тупымъ, мелко-пильчатымъ листочками и ланцетными тонко-заостренными прилистниками. Соцвѣтіе въ шаровидныхъ розовыхъ головкахъ на цвѣтоножкахъ, превышающихъ въ 2—3 раза листья; цвѣтоножки въ углахъ маленькихъ прицвѣтничковъ; чашечка 5-тизубчатая, втрое короче вѣнчика, съ шиловидными зубцами, изъ которыхъ верхніе длиннѣе трубочки, нижній почти равенъ ей. Вѣнчикъ неотпадающій, мотыльковый, 5-гипелестный (верхній — образуетъ флагъ, боковые—крылья, 2 нижніе—лодочку). Тычинокъ 10, двубратственныхъ. Плодъ—2—4-хвѣстанный продолговатый бобъ. Растетъ на поляхъ и лугахъ, преимущественно сырыхъ. Любитъ черноземную, нѣсколько глинистую почву. Цвѣтетъ съ іюня по сентябрь. Созрѣваетъ въ августѣ и сентябрѣ. Воздѣлывается, какъ прекрасное кормовое и медоносное растеніе.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Клеверъ красно-бѣлый употребляется въ народной медицинѣ. Въ Московской губерніи изъ него готовятъ чай, который пьютъ отъ простуды, лихорадки и ломоты во всѣхъ членахъ, а также отъ боли въ горлѣ. Сушеную траву распариваютъ и дѣлаютъ изъ нея припарки, которыя прикладываютъ на различныя воспалительныя опухоли.

Клеверъ красный, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L.).

Клеверъ красный колосовидный, см. Клеверъ краснющій (Trifolium rubens L.).

Клеверъ краснющій (Trifolium rubens L.). Живокость (Бесс.) Красная канка. Клеверъ красный колосовидный. Заяча кривия, Заячьи лапки (Малор.). (Та б. XIX, фиг. 104.) Краснющій клеверъ

есть многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.), распространенное въ средней Европѣ и въ юго-западной Россіи, выши. 7 — 13 вершк., съ прямостоящимъ голымъ стеблемъ, тройчатыми листьями, состоящими изъ ланцетовидныхъ, заостренныхъ, мелко-зубчатыхъ листочковъ. Соцвѣтія образуютъ колосовидныя продолговато-цилиндрическія пурпуровыя головки, расположенныя по двѣ вмѣстѣ и снабженныя оберткой. Чашечка голая, съ 20 жилками, съ длиннорѣсничатыми, нитевидными зубцами, изъ которыхъ верхніе 4 въ 2—3 раза короче трубочки, а нижній почти въ два раза длиннѣе ея и немного короче вѣничка. Вѣничикъ 5-тилепестный, остающійся, мотыльковый (2 нижніе лепестка сростаются на подобіе лодочки, 2 боковые образуютъ крылья, верхній — флагъ). Тычинокъ 10, сросшихся въ 2 пучка своими нитями, т. е., двубратственные, причемъ изъ 10 тычинокъ, спаянныхъ вмѣстѣ, одна свободна. Плодъ—линейный продолговатый 3—6-ти сѣмянный бобъ, перепончатый и разрывающійся неправильно. Растетъ на лѣсистыхъ лугахъ. Цвѣтетъ съ іюня по августъ, созрѣваетъ въ августѣ и сентябрѣ. Молодой употребляется въ кормъ скоту, но, старѣя, становится жесткимъ и не годится для корма. Любитъ глинистую и рыхлую известковую почву. Въ Бессарабіи изъ этого вида клевера дѣлаютъ ванны.

Клеверъ луговой или посѣвной (*Trifolium pratense* L.). Валашокъ (Черн., Микл., Гродн.), Визиль (Малор.—травя), Гоголечки (цвѣты въ Нижегород. губ.), Головокъ (Полт.), Красноголовка (Олон.), Красноголовкинъ (Вят.), Дятло (Пск., Тв.), Дятликъ (Арх.), Дятлина, Дятлица (Арх.), Дятлина красная (Мог., Моск., Кіев.), Дятельникъ (Тамб., Вят., Влад., Вор.), Дятельникъ красный (Арх., Костр.), Дятельникъ лѣсной, Дятельникъ-подорожникъ (Тамб.), Дятлевина (Пск., Твер.), Дятловина (Кондр., Черн., Малор.), Дзенцѣлена (Вил., Гродн.), Желтушка (Вор.), Жеребецъ (Харьк.), Жеребчикъ (Кал.), Золотушная трава (Олон.), Ивасикъ, Ивасикъ (Малор.), Измѣтникъ, Калачики (Яросл., Нижегород.), Караси (Кал.), Кашика, Кашика красная (Вол. ч. губ.), Капка медовая (Каз.), Капникъ (Моск.), Капешникъ (Костр.), Клеверъ красный, Клеверъ испанскій, Козине око (Малор.), Коврижка (Смол.), Красная коврига (Смол.), Коневникъ, Коничина (Умань), Конюшина (Мал.), Кукласъ (Новг.), Красный купякъ (Ниж.), Лапушка (Моск., Двинг.), Лихорадочная трава (Арх.), Макушка (Волог.), Макушникъ (Олон.), Медовикъ (Каз., Сар., Вят.), Медовникъ (Арх., Вол.), Медокъ (Вят.), Медъ (Тул.), Медовая трава, Медовый цвѣтъ (Каз.), Медунца (Твер.), Медунчикъ (Олон.), Мятлика, Матлика, Митлина, Орѣшекъ полевой, Орѣшки-волошки (Курск.), Горники (Полт.), Попки (Малор.), Свѣтлебей солодка (Влад., Орл.), Сосунчикъ, Суховершки (Курск.), Треушникъ (Тамб.), Трехлистникъ луговой (Ниж.), Трилистникъ, Троелистка (Спб.), Троезелье, Тройзелье (Малор.), Троица (Смол.), Троянь (Малор.), Хлѣбушка (Перм.), Вабочикъ хлѣбъ, Божій хлѣбъ (Пск., Твер.), Пчельный хлѣбикъ, Цауки (Смол.), Яблучка (Кіев.). (Таб. XX, фиг. 110)

Травянистое многолѣтнее растеніе, изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Rapionaceae* L.), весьма обыкновенное въ Европѣ и въ Россіи, выш. 7—13 вершк. Стебель тонкій, прямой, обыкновенно вѣтвистый; листья тройчатые изъ эллиптическихъ или обратно-яйцевидныхъ, часто выемчатыхъ, листочковъ; при черешкахъ широкие, яйцевидные, кверху сразу суженные въ пиловидное остріе, прилистники. Соцвѣтіе — шаровидная головка, снабженная оберткой (тройчатые листья при основаніи соцвѣтія); цвѣты блѣдно-красные или темно-пурпуровые, рѣдко бѣлые. Чашечка съ 5 щетиновидными зубами, превышающими вѣнчикъ, мохнато-волосистая, съ 10 жилками; вѣнчикъ сростно-лепестный, остающійся, мотыльковый, 5-тилепестный (верхній лепестокъ образуетъ флагъ, два боковые — крылья, 2 нижніе, сростаясь, образуютъ тупую лодочку). Тычинокъ 10, сростнившихся въ 2 пучка своими нитями, изъ 10 сростнившихся вмѣстѣ одна свободная. Плодь — продолговатый 1—2-хѣмянный нерепончатый неправильно разрывающійся, бобъ. Растетъ на лугахъ. Цвѣтетъ съ апрѣля до октября. Одна изъ лучшихъ воздѣлываемыхъ кормовыхъ травъ. Родится хорошо на всякой почвѣ, хотя любитъ глинистую. Для наилучшаго урожая хорошо распахивать землю, заѣваемую клеверомъ, возможно глубже и притомъ 2 раза — осенью и весною. Такъ какъ сѣмена ихъ мелки, то, чтобы ихъ удобно и ровно сѣять, надо ихъ смѣшивать съ ровнымъ количествомъ песка. На каждую десятину полагается 30 фунтовъ сѣмянъ. Заборонивать посѣянные сѣмена глубоко не слѣдуетъ, такъ какъ это мѣшаетъ всходу. Время посѣва различно по климату; начинается оно съ первой постоянной весенней погодой: нѣкоторые земледѣльцы совѣтуютъ посѣвъ производить въ августъ до наступленія холодной осени, что можетъ быть, дѣйствительно, выгодно при употребленіи подъ клеверъ паровой земли. Клеверъ очищаетъ совершенно землю, на которой часто сѣется, отъ всякихъ другихъ травъ, дѣлаетъ ее рыхлой и вмѣстѣ съ тѣмъ удобряетъ ее. Извѣстно, что земля, которая была заѣяна клеверомъ, не требуетъ упавоженія, когда хотятъ сѣять на ней ленъ или горохъ, даже для посѣва пшеницы на 2-ой и 3-ой годъ требуется навоза менѣе обыкновеннаго. Клеверъ удобенъ для нашихъ земледѣльцевъ еще тѣмъ, что не особенно боится морозовъ, требуетъ небольшого ухода и скоро поспѣваетъ.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Клеверъ луговой въ медицинѣ употребляется, какъ народное средство. Въ Олонецкой губерніи отваромъ клевера лугового моютъ уши и впускаютъ отваръ его въ уши при боляхъ въ ухѣ, также этимъ отваромъ моютъ глаза. Въ Тверской губерніи отваръ растения употребляется внутрь отъ кашля, въ Минской — отъ болей во время менструацій, въ Архангельской губерніи — отъ лихорадки и простуды.

Клеверъ лѣсный, см. Клеверъ средній (*Trifolium medium* L.). Клеверъ пашенный или кошачій (*Trifolium arvense* L.).

Фармацевтическое названіе этого вида: *Lagopus* (*Herba et*

Florges). Волошечьи бѣленки (Харьк.), Жаба (Ниж.), Жеребець, Заячники (Моск.), Заячьи ланки (Твл.), Заячьи мѣд...ки (Твл.), Заячьи ножки, Заячьи ячкы (Нижег.), Котки, Котыкы, Котки (Минск., Влад.), Кытки, Кыточникъ, Котятникъ (Волог.), Котовникъ (Вор., Тар.), Котовы мѣд...ки, Котовы ячкы (Вят., Пск., Ниж.), Котовы уши (Влад.), Боровыя котовыя м.ды (Ниж.), Котовы яйца, Кашки (Тул.), Кошачьи (Гродн.), Кошачья тр. (Моск.), Кашурникъ (Мог.), Конюшки (Гродн.), Летучка, Огірочна тр., Огірошникъ (Малор.), Агурникъ (Вил.), Опуховая трава (Вят.), Пуховая головница (Тул.), Пуховая трава, Пушки (Вятск.), Орляка-трава, Пушники (Бесс.), Спорышникъ (Мог.). Пшениный клеверъ есть однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «мотыльковыхъ» (Papilionaceae L.), встрѣчающееся почти во всей Россіи. Это—пушистая травка выш. 2—6 вершковъ, съ тонкимъ, прямымъ, обыкновенно вѣтвистымъ стеблемъ; листья тройчатые изъ линейно-продолговатыхъ, спереди мелкопильчатыхъ и часто выемчатыхъ, листочковъ. Прилистники яйцевидные, заостренные; головки соцветій одиночныя, мохнато-волосистыя, въ началѣ цвѣтенія почти шаровидныя, а потомъ продолговато-цилиндрическія, безъ обертки; цвѣты тѣльнаго цвѣта или бѣловатые. Чашечка мохнато-волосистая, съ зубцами, превышающими вѣнчикъ. Вѣнчикъ остающійся, сростнолепестный, мотыльковый (флагъ, крылья и лодочка); тычинокъ 10, двубратственныхъ. Плодъ—1—2-хлѣбный перепончатый неправильно разрывающійся бобъ. Растетъ на поляхъ и лугахъ, преимущественно на песчаной почвѣ. Цвѣтетъ съ іюня до октября. Скотъ охотно ѣстъ молодую траву, которая съ теченіемъ времени становится жесткой и непригодной для корма.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Клеверъ пшениный употребляютъ въ народной медицинѣ. Чай изъ пшенинаго клевера даютъ отъ боли и коликовъ въ животѣ, отъ сухого кашля кладутъ на грудь сухую припарку изъ травы. Кромѣ того, его даютъ животнымъ внутрь отъ кашля и отваромъ травы обмываютъ затгноившіяся раны.

Клеверъ средній (*Trifolium medium* L.). Валохъ (Курск.), Длкая ветловица, Вязъ (Полт.), Вязиль, Головникъ, Головишки (Черниг.), Пшанова голова (Екат.), Красноголовникъ (Ворон.), Дергожникъ (Кал.), Дятлина боровая, лѣсная, луговая, Дятловникъ, Дятловина (разн. губ.), Черноголовникъ (Шерм., Уфим.), Жеребчикъ, Жеребець (Курск.), Жеребятникъ (Ворон.), Живая трава лѣсовая (Черн.), Красная кашка, Красная трава (Влад.), Клеверъ лѣсной (Влад.), Коврижка красная (Олон.), Конючина (Минск.), Кукушьи слезки (Сар.), Медовикъ красный (Моск.), Красный орѣшекъ (Полт.), Горешокъ (Бесс.), Дикая рябина (Новг.), Лѣсной трилистникъ, Троелистка (Вят.), Три брата (Полт.), Триперстень (Волог.), Тройникъ (Екат.). Клеверъ средній представляетъ изъ себя многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «мотыльковыхъ» (Papilionaceae L.), распространенное почти повсемѣстно въ Европѣ и въ Россіи, рѣже встрѣчаемое на югѣ, весьма по-

хожес на клеверъ луговой или полевнѣй (*Trifolium pratense* L.), см. выше, отъ котораго отличается только лепестовидными прилистниками. Стебель часто узловато-изгибистый, вмѣстѣ съ листьями покрытый рѣдкими волосками; листья тройчатые изъ эллиптическихъ продолговатыхъ листочковъ. Головки соцветій шаровидныя или овальныя, безъ обертки, пурпуровыя. Чашечка 5-тизубчатая, съ нитевидными длинно-рѣсничатыми зубцами, съ 10 жилками, вдвое короче вѣтчика. Вѣтчикъ неотпадающій, сростно-пятилепестный, мотыльковый (верхній лепестокъ образ. флагъ, два боковые—крылья, нижніе 2—лодочку). Тычинокъ 10, двубратствен. (т. е., сросшихся нитями въ 2 пучка), причемъ 9 тычинокъ стоятъ вмѣстѣ, а верхняя 10-ая свободная. Плодъ—1—2-хвѣстанный, продолговатый, неправильно разрывающійся бобъ. Растетъ на лугахъ и между кустарниками. Цвѣтетъ лѣтомъ. Любитъ глинистую и песчаную почву. Иногда воздѣлывается въ сѣверныхъ странахъ Европы Россіи, такъ какъ въ молодомъ состояніи является хорошимъ и питательнымъ кормомъ для скота, съ теченіемъ же времени становится менѣе жесткимъ, чѣмъ остальные виды клевера. (Рис. 114.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ народѣ клеверъ средній—очень употребительное лекарственное средство. Въ Пермской губерніи его пьютъ отъ головной боли подъ именемъ черноголовника, въ Калужской губерніи его прикладываютъ на папцы отъ парывовъ, въ Орловской губерніи пьютъ отъ запоровъ, въ Новгородской—отъ лихорадки, въ Владимирской губерніи—отъ горячки, въ Казанской даютъ дѣтямъ отъ грыжи, а въ Воронежской губ. — для укрѣпленія нервовъ. Обыкновенно изъ всѣхъ видовъ сушенаго клевера завариваютъ отваръ, какъ чай. Берутъ маленькую горсточку травы, заливаютъ ее стаканомъ кипятка и пьютъ: взрослые по чашкѣ раза два въ день, дѣтямъ даютъ ложками.

Клеверъ шведскій, см. Клеверъ красно-бѣлый (*Trifolium hybridum* L.).

Клеверъ шпанскій, см. Клеверъ луговой или полевнѣй (*Trifolium pratense* L.).

Клей сорочій, см. Дрема кукушкинъ цвѣтъ (*Lychnis flos-culi* L.).

Клей сорочій, см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).

Клей стручечный, см. Ледвенецъ рогатый (*Lotus corniculatus* L.).

Клейкая липкая трава, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).

Клекачка, см. Клекачка перистая (*Staphylea pinnata* L.).

Клекачка перистая (*Staphylea pinnata* L.). Дерево клекачка, Клокичка (Малор.), Ключичка, Клокица, Ключница, Клопецъ, Клокица, Клопичка, Колокитина, Фисташки лѣсныя. Вѣтвистый кустарникъ изъ семейства «бересклетовыхъ» (*Celastrineae*); выш. 1—2 сажени, съ суротными, цѣнно-перистыми листьями, распространенный въ средней Европѣ, въ юго-за-

падной Россіи, на Кавказѣ. Соцвѣтіе—яйцевидная кисть бѣлыхъ цвѣтовъ, висячая на длинной ножкѣ. Цвѣтки обоеполовые, съ бѣлымъ 5-тилепестнымъ вѣнчикомъ и 5-листной опадающей чашечкой; чашелистики яйцевидные, тупые; лепестки продолговато-лопастчатые, столь-же длинные, какъ и чашелистики, снаружи часто красноватые. Тычинокъ 5, прикрѣпленныхъ къ подпестичному диску; завязь 2—3-хгнѣздная, съ свободными столбиками. Плодъ—2—3-хлопастная пузыревидная коробочка съ сходящимися верхушками, лопастями и раскрывающаяся на верхушкѣ съ внутренней стороны лопастей. Клекачка растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками. Цвѣтетъ весною и въ началѣ лѣта. Въ Закавказьѣ нераспустившіеся цвѣты квасять, какъ капусту, а твердые, богатые масломъ, сѣмена ѣдятъ, какъ лакомство (вкусомъ напоминають фиستانки). Въ Греціи цвѣточные почки употребляютъ вмѣсто канареевъ. (Таб. XX, фиг. 112.)

Кленъ, см. Кленъ полевой (*Acer campestre* L.).

Кленъ, см. Кленъ обыкновенный, остролистный (*Acer platanoides* L.).

Кленъ, см. Кленъ татарскій или русскій (*Acer tataricum* L.).

Кленъ американскій, см. Грудничникъ (*Abutilon Avicennae* Gärtn.).

Кленъ бѣлый, см. Кленъ серебряный (*Acer dasycarpum* Ehrh.).

Кленъ виргинскій (*Negundo fraxinifolium* Nutt.). Кленъ китайскій. Высокое дерево въ нѣсколько саж. высоты изъ семейства «кленовыхъ» (*Acerineae* DC.), родомъ изъ Сѣв. Америки содержитъ, подобно сахарному клену, много сахарнаго сока, употребляемаго американцами для фабрикаціи сахара.

Кленъ китайскій, см. Кленъ виргинскій (*Negundo fraxinifolium* Nutt.).

Кленъ красный (*Acer rubrum* L.). Дерево изъ семейства «кленовыхъ» (*Acerineae* DC.), родомъ изъ Сѣв. Америки. Отличается красными цвѣтами, распускающимися раннею весною, до появленія листьевъ. Культивируется у насъ нерѣдко въ качествѣ декоративнаго растенія.

Кленъ нѣмекскій, см. Яворъ (*Acer pseudoplatanus* L.).

Кленъ обыкновенный, или остролистный (*Acer platanoides* L.). Амаръ (юго-зап. Росс.), Кленъ, Кленовина, Клинина (Малор.), Кленъ (зап. Росс.), Пакленъ (Вор.). Дерево изъ семейства «кленовыхъ» (*Acerineae* DC.), распространенное почти во всей Европѣ и Европейской Россіи на сѣверъ до Финляндіи, выпл. въ нѣсколько саж., съ супротивными пальчато-пятилопастными листьями; лопасти острые, съ тонко-заостренными зубцами. Желтовато-зеленые цвѣты расположены прямостоящими вѣткovidными вѣтвями. Цвѣтки разнородные. Чашечка 5-тираздѣльная, лепестковъ и тычинокъ столь-же. Въ мужскихъ цвѣтахъ тычинки столь-же длинныя, какъ лепестки. Завязь обыкновен. клека 2-хгнѣздная, съ 2-мя столбиками. Плодъ—двукрылатка, распадающаяся при созрѣваніи на 2 плодика. Крылья плода

расходятся подъ тупымъ угломъ. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. Древесина желтовато-бѣлая, твердая и плотная, отлично подируется, употребляется въ столярномъ и токарномъ производствахъ и служитъ для приготовленія разныхъ музыкальных инструментовъ. (Таб. XX, фиг. 111.)

Кленъ полевой (*Acer campestre* L.). Пакленъ, Кленъ (Бесс., Курск.), Пекленъ (Кіев.), Пакленокъ, Паклина, Чернокленина, Черноклень (Мог. Бор.), Джугастро, Жугастро (Подол. г. съ магд.), Кустарникъ или дерево, достигающее нѣсколько саж. выс., изъ семейства «кленовыхъ» (*Acerineae* DC.), распространенное почти во всей Европѣ, средней и южной Россіи. Листья супротивные, 5-тилопастные, съ притупленными лопастями, цѣльно-крайними или съ нѣсколько крупными, тупыми зубцами. Мелкіе зеленоватые цвѣты въ примостоящихъ шитковидныхъ кистяхъ. Цвѣты разнородные. Чашечка 5-тираздѣльная; лепестковъ и тычинокъ столько-же. Въ мужскихъ цвѣтахъ тычинки столь-же длинныя, какъ и лепестки. Завязь 2-хнѣздная, съ 2-мя столбиками. Плодъ—двукрылатка, распадающаяся при созрѣваніи на 2 плодика. Крылья плода почти горизонтальныя. Растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками. Цвѣтетъ въ маѣ и юнѣ. Древесина цѣлится въ токарномъ дѣлѣ, а молодые побѣги идутъ на чубуки. (Рис. 115.)

Кленъ сахарный (*Acer saccharinum* L.). Дерево родомъ изъ Сѣв. Америки, изъ семейства «кленовыхъ» (*Acerineae* DC.). Древесина выдѣляетъ сахарный сокъ, который собираютъ обыкновенно весной посредствомъ буравливанія коры и изъ котораго фабрикуютъ сахаръ (ежегодно съ cadaго дерева получаютъ 6—7 фунтовъ сахара), вполне замѣняющій бѣдному классу населенія настоящій свекловичный сахаръ.

Кленъ серебряный (*Acer dasycarpum* Ehrh.). Кленъ бѣлый. Дерево изъ семейства «кленовыхъ» (*Acerineae* DC.), родомъ изъ Сѣв. Америки; доставляетъ также сахаръ, подобно сахарному клену (см. выше). Культивируется у насъ, какъ декоративное растеніе, въ паркахъ, садахъ, на бульварахъ и проч.

Кленъ татарскій, или русскій (*Acer tataricum* L.). Язына, Кленъ (Вятск.), Красносережникъ, Лимокъ (Тамб.), Пекленъ (въ разныхъ губ.), Пакленъ (Малор.), Паклинокъ (Сам., Саратов.), Свидя (Орл.), Сережникъ (Орл., Симб.), Черноклень (Кіев., Екат., Курск.), Чернокленина (Укр.), Чернокленикъ (Тамб.), Крушина. Кустарникъ или дерево, выс. 1½—2 сажени, изъ семейства «кленовыхъ» (*Acerineae* DC.), распространенный преимущественно въ Россіи, на Кавказѣ и въ Сибири. Отличается сердцевидными, заостренными, цѣльными или слегка 3-хлопастными листьями, спизу, вдоль жилокъ, пушистыми. Бѣловатые цвѣты въ яйцевидныхъ, вѣтвистыхъ кистяхъ; цвѣтики разнородные, чашечка 5-тираздѣльная; лепестковъ и тычинокъ столько-же. Тычинки въ мужскихъ цвѣткахъ вдвое длиннѣе лепестковъ. Завязь 2-хнѣздная, съ 2 столбиками. Плодъ—двукрылатка, распадающаяся при созрѣваніи на два плодика. Крылья плода

вверхъ стоящій, почти параллельный между собою, краснаго цвѣта. Растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками. Цвѣтетъ въ маѣ и юнѣ. Древесина обладаетъ такими-же качествами, какъ древесина выше описанныхъ клена остролистнаго, или обыкновеннаго и клена полеваго.

Кленъ Французскій (*Acer monspessulanum* L.). Кустарникъ изъ семейства «кленовыхъ» (*Acerineae* DC.), произрастающій въ средней и южной Европѣ, выш. 1—2 саж., съ трехлопастными, супротивными, цѣльнокрайними листьями; зеленовато-желтые цвѣты въ висячихъ кистяхъ. Чашелистиковъ, тычинокъ и лепестковъ по 5; тычинки въ мужскихъ цвѣткахъ вдвое длиннѣ лепестковъ. Плоды—двукрылатка, при созрѣваніи распадающаяся на 2 плодика. Растетъ въ лѣсистыхъ мѣстахъ. Разводится у насъ въ паркахъ и садахъ, какъ декоративное растение.

Кленовина, см. Кленъ обыкновенный, или остролистный (*Acer platanoides* L.).

Кленовый цвѣтъ, см. Лютикъ ѣдкій (*Ranunculus acer* L.).

Клещевина обыкновенная (*Ricinus communis* L.). Фармацевтическое названіе обыкновенной клещевины *Palma Christi* s. *Ricinus vulgaris* s. *Cataputia major* (Semina), *Cerva major* s. *Grana regia*. Бобъ дрисливый (Екат.). Дивное дерево, Касторовое сѣмя, Дерево клещевое, Клещевинное дерево, Конопля турецкая, Христова пальма, Рай дерево, Райское дерево, Рицина, Рицинь. Скачокъ великій тр. Обыкновенная клещевина представляетъ изъ себя травянистое, въ нѣкоторыхъ случаяхъ деревянистое, многолѣтнее растение изъ семейства «молочайниковыхъ» (*Euphorbiaceae* Juss.), родомъ изъ тропическихъ странъ Америки, Азій и Африки. Корень ея вѣтвистый, развѣтвляющійся; стебель прямой, выс. до 5 и болѣе фут., нѣсколько трубчатый, гладкій, цилиндрический, зеленовато-сѣрый, мѣстами красноватый, наверху вѣтвистый. Листья поперебънные, сидящіе на длинныхъ цилиндрическихъ и полыхъ черешкахъ, щитовидные, 7—9-тилопастные; лопасти ланцетовидныя, заостренныя, зубчатыя. Цвѣты однодомные; женскіе цвѣты занимаютъ верхнюю часть, мужскіе—нижнюю часть стебля. Мужскіе цвѣты состоятъ изъ чашечки съ 5-ю вогнутыми овальными, заостренными и отогнутыми назадъ, долями; тычинки срастающіяся кистями въ нѣсколько толстыхъ пучковъ; женскіе цвѣты имѣютъ также чашечку съ 5 узкими, ланцетовидными, сходящимися долями, иногда срастающимися своими краями. Завязь верхняя о 2—3 гнѣздахъ, содержащихъ по 1—2 яичка; столбикъ 2—3-храздѣльный. Плоды—коробочка, съ тремя круглыми синевадозелеными гранями. Разводятъ клещевину въ садахъ (гдѣ она дѣлается однолѣтней), посредствомъ разсаживанія сѣмянъ рано весною, сперва въ парникахъ; когда молодыя растенія достаточно окрыпнутъ, ихъ пересаживаютъ на гряды или клумбы. Цвѣтетъ клещевина въ юнѣ и августѣ, сѣмена созрѣваютъ въ сентябрѣ. Для употребленія собираютъ одни сѣмена. Послѣднія не имѣютъ запаха, но заключаютъ внутри маслянистое сладко-

ватоз, острое и жгучее на вкусъ, ядро, вещество котораго довольно плотно, похоже на миндаль и содержитъ большое количество жирнаго масла, которое добываютъ или выжиманіемъ, или настанваніемъ ядеръ въ горячей водѣ. Надо замѣтить, что ядро сѣмянъ клещевины, изъ которыхъ не удаленъ зародышъ—ядовиты, такъ какъ послѣдній отличается острыми, раздражающими и производящими тошноту, свойствами; поэтому и жирное масло, добываемое изъ сѣмянъ, также обнаруживаетъ различныя свойства, смотря по тому, добывается оно изъ цѣлыхъ ядеръ или нѣтъ. Въ послѣднемъ случаѣ оно сладко, пріятно на вкусъ и отличается смягчающими, нѣсколько слабющими, свойствами; въ первомъ случаѣ оно остро, производитъ тошноту, сильно раздражаетъ пищеварительные органы и отличается сильно слабющимъ свойствомъ. Но, такъ какъ масло изъ зародыша выходитъ не такъ легко и требуетъ для выжиманія сильнаго давленія, то можно, подвергая сѣмена клещевины легкому давленію или погружая ихъ въ горячую воду, получать изъ нихъ весьма сладкое масло. Кроме того, получаемое изъ сѣмянъ масло можно очищать отъ остраго начала многократнымъ перемываніемъ въ водѣ, содержащей небольшое количество сѣрной кислоты, и легкимъ кипяченіемъ. Полученное и очищенное такимъ образомъ масло совершенно безцвѣтно, прозрачно, безъ малѣйшаго дурнаго запаха; оно растворяется въ холодномъ винномъ спиртѣ. Но таковое масло рѣдко можно встрѣтить въ нашихъ аптекахъ, гдѣ оно привозное, иногда красноватаго цвѣта, весьма непріятнаго запаха и всегда почти остро и непріятно на вкусъ, что происходитъ отчасти отъ небрежнаго приготовленія, отчасти отъ продолжительнаго храненія безъ употребленія. Въ нѣкоторыхъ странахъ клещевинное масло употребляютъ для освѣщенія; тщательно очищенное и приготовленное, оно даже употребляется въ пищу; жители Явы и Малакки готовятъ изъ него лакъ, которымъ, вмѣсто эмали, покрываютъ свои суда.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ медицинѣ клещевинное, или, какъ принято въ обществѣ называть, «касторовое масло» имѣетъ обширное примѣненіе.

Касторовое масло, какъ легко и вѣрно дѣйствующее слабительное, находитъ примѣненіе въ очень многихъ болѣзняхъ, преимущественно лихорадочныхъ, частью при заболѣваніяхъ въ кишечникѣ и въ органахъ таза. Оно почти не раздражаетъ стѣнокъ кишекъ и не дѣйствуетъ вредно на общее состояніе больныхъ; поэтому употребленіе его не противопоказывается при воспаленіяхъ матки, почекъ и мочевого пузыря; также его даютъ при кровавомъ поносѣ и при кровотеченіяхъ изъ матки. Продолжительное употребленіе кастороваго масла разстраиваетъ пищевареніе и вызываетъ запоры.

Касторовое масло при дизентеріи (кровавомъ поносѣ) дается въ началѣ болѣзни для освобожденія кишечника отъ слизи и всѣхъ остатковъ пищи, присутствіе которыхъ вредно дѣйствуетъ.

на слизистую оболочку толстых кишок. Касторовое масло считается въ этомъ случаѣ лучшимъ слабительнымъ, вслѣдъ за которыми успокаиваются болѣзненные позывы на нязъ и уменьшается отдѣленіе крови. Въ первую недѣлю брюшнаго тифа врачи иногда даютъ касторовое масло. Со второй недѣли брюшнаго тифа приемы слабительныхъ не должны быть даваемы больнымъ. Всякое слабительное усиливаетъ передвиженія кишечника, которое можетъ повести за собою разрывъ стѣнки кишки на мѣстѣ образующихся при тифѣ кишечныхъ язвъ и вызвать смертельное кровотеченіе.

При свинцовой коликѣ, которая выражается сильными болями и запоромъ у людей, работающихъ на свинцовыхъ фабрикахъ, касторовое масло дѣйствуетъ вѣрно и скоро. После приѣма различныхъ глистогонныхъ средствъ для скорѣйшаго выведенія глисты и лекарственнаго вещества изъ кишечнаго канала употребляютъ касторовое масло. Всевозможныя засоренія желудка дурною пищею или избыткомъ пищи, выражающіяся обложеннымъ языкомъ, чувствомъ боли и вздутости живота, тошнотою, поносомъ или запоромъ, лечатся принятіемъ кастороваго масла. Взрослые люди принимаютъ одну столовую ложку на приемъ, двѣ—отъ чайной до десертной. Касторовое масло имѣетъ очень непріятный вкусъ и запахъ, потому рѣдко кто можетъ принимать его въ чистомъ видѣ. Въ аптекахъ касторовое масло вливаютъ въ желатинныя капсулы различной величины. Средней величины капсулы содержатъ полный приемъ кастороваго масла въ 8-ми капсулахъ. Есть большія капсулы, ихъ приходится брать 4 на приемъ, но ихъ очень трудно глотать. Вообще и въ капсулахъ касторовое масло принимается съ трудомъ. Многие принимаютъ его въ черномъ кофе или съ чаемъ, въ пѣнѣ чернаго пива; двѣ-три касторовое масло подогреваютъ и даютъ съ теплымъ молокомъ; также его даютъ въ винѣ. Для этого въ рюмку наливаютъ вина (хереса, портвейна или мадеры), сверху вина—касторовое масло, затѣмъ опять приливаютъ вина, касторовое масло съ виномъ не смѣшивается, и при проглатываніи остается во рту вкусъ вина. Также натираютъ ложку или рюмку лимономъ, сверху масла выжимаютъ лимонный сокъ и въ этомъ видѣ проглатываютъ масло, обтирая ротъ отъ приставаго къ нему жира кусочкомъ чернаго хлѣба съ солью.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ необходимости въ быстромъ слабительномъ дѣйствіи кастороваго масла, а, напротивъ, полезно медленное и постепенное очищеніе кишечника отъ слизи и вредныхъ веществъ въ немъ, изъ масла приготовляютъ эмульсію. Маленькимъ дѣтямъ при засореніи желудка касторовое масло дается только въ эмульсіи. Для приготовленія эмульсіи изъ кастороваго масла берется чисто вымытый и высушенный фарфоровый ступка, въ которую наливаютъ $\frac{1}{2}$ унца (1 стол. ложку=15 грм.) кастороваго масла; на масло насыпаютъ 2 драхмы (7,5 грм.) порошка гумми-арабика и начинаютъ растирать, прибавляя понемногу воды; масло растирается съ гумми-арабикомъ и принимаетъ видъ молока, воды прибавляютъ постепенно больше и

больше, пока не получится порція въ 5 унцъ (150 грм.—10 стол. л.). Въ приготовленную такимъ образомъ эмульсію прибавляютъ для вкуса какого-нибудь сиропа (лучше всего обыкновеннаго сахарнаго сиропа); для того, чтобы приемы эмульсии не вызывали болѣе, къ ней прибавляютъ отъ 20-ти до 30-ти капель воды горькихъ миндалей и также для улучшенія вкуса и какъ вѣтрогонное средство—1—2 столовые ложки укропной или мятной воды. Взрослые принимаютъ такую эмульсію черезъ 2 часа по столовой ложкѣ, дѣти по чайной ложкѣ. Такую эмульсію принимаютъ два-три дня подрядъ, тогда какъ чистое касторовое масло принимаютъ только одинъ разъ, и, если желудокъ не подѣйствовалъ, помогаютъ ему клизмой. Снаружи касторовое масло идетъ въ различныя мази и масла для роженія волосъ (см. перувианскій бальзамъ).

Кромѣ того, если не могутъ больные принять внутрь касторовое масло, имъ ставятъ изъ него клистиры, для чего одну или двѣ столовые ложки кастороваго масла смѣшиваютъ съ отваромъ ромашки и небольшимъ количествомъ глицерина (для этого подогрѣтое касторовое масло предварительно хорошо смѣшиваютъ съ одною или двумя чайными ложками глицерина и смѣсь заливаютъ 2-мя—3-мя стаканами отвара процеженной теплою ромашки), или же касторовое масло смѣшиваютъ съ теплымъ отваромъ льняного семени. Больного кладутъ на лѣвый бокъ и ставятъ ему такую клистирь; дѣтямъ берется на клизму не болѣе стакана этой жидкости.

Клещевинное дерево, см. Клещевина обыкновенная (*Ricinus communis* L.).

Клещевница, см. Жгунъ корень (*Cnidium venosum* L.).

Клещевникъ, см. Бересклетъ бородавчатый (*Evonymus verrucosus* L.).

Клещевье дерево, см. Клещевина обыкновенная (*Ricinus communis* L.).

Клещинецъ, см. Аройникъ пятнистый (*Arum maculatum* L.).

Клинина, см. Кленъ обыкновенный, или остролистный (*Acer platanoides* L.).

Клинчукъ, см. Дербенникъ прутняковый (*Lythrum virgatum* L.).

Клионъ, см. Кленъ обыкновенный, или остролистный (*Acer platanoides* L.).

Клобукъ, см. Клобучекъ (*Erimegium alpinum* L.).

Клобуки

Клобуки поповскіе } см. Роза узколистная (*Typha angustifolia* L.).

Клобучекъ (*Erimegium alpinum* L.). Безцвѣтъ, Безцвѣтъ-трава,

Безцвѣтникъ, Горянка, Клобукъ, Дурачья шалва, Пересклетъ.

Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «барбарисовыхъ» (*Berberideae* Vent.), произрастающее въ средней Европѣ, преимущественно въ Альпахъ южнаго Тироля. Стебель выш. въ 1 фск. вершковъ; листья супротивные, тройко-перисто-разсѣченные. Чашечка и вѣтчики темно красные; прицвѣтники окрашены въ желтый цвѣтъ и соединены другъ съ другомъ на подобіе клобука. Разводится, какъ декоративное растеніе.

Клодъ, см. Чина черная (*Orobus niger* L.).

Клодъ, см. Вероника лекарственная (*Veronica officinalis* L.).

Клокичка } см. Клекачка перистая (*Staphylea pinnata* L.).

Клокица

Клокотино дерево, см. Фисташковое дерево (*Pistacia vera* L.).

Клопецъ, см. Трясунка средняя (*Briza media* L.).

Клопецъ, см. Ленъ дикий (*Linaria vulgaris* L.).

Клопецъ, см. Погребомъ обыкновенн. (*Rhinanthus Crista Galli* L.).

Клопецъ, см. Ярутка полевая (*Thlaspi arvense* L.).

Клопецъ, см. Клекачка перистая (*Staphylea pinnata* L.).

Клопикъ, см. Ярутка полевая (*Thlaspi arvense* L.).

Клопики, см. Трясунка средняя (*Briza media* L.).

Клопики, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris* Moench.).

Клопица, см. Клекачка перистая (*Staphylea pinnata* L.).

Клопичка, см. Клекачка перистая (*Staphylea pinnata* L.).

Клопникъ, см. Ярутка полевая (*Thlaspi arvense* L.).

Клоповецъ, см. Чернокорень обыкновенный (*Cynaglossum officinale* L.).

Клоповица, см. Погребомъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista Galli* L.).

Клоповная, см. Душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.).

Клоповникъ, см. Желтоцвѣтъ пахучій (*Barbarea vulgaris* R. Br.).

Клоповникъ, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris* Moen.).

Клоповникъ, см. Кипянецъ огородный (*Coriandrum sativum* L.).

Клоповникъ, см. Синеголовникъ плосколистный (*Eryngium planum* L.).

Клоповникъ, см. Ситникъ жабный (*Juncus bufonius* L.).

Клоповникъ (*Lepidium ruderale* L.). Вонючка. Вонючее зельечко (Полт.), Вѣники (Орл.), Вѣнички (Кал., Тв., Екат., Смолен., Хар.), Вѣничники, Метелка (Тв.), Метелочка (Малор.), Метелинникъ (Укр.), Жеруха, Дикая жеруха, Вонючая жеруха, Зайчаки (Малор.), Дикій крессъ, Лихорадочная трава, Собачій пометъ (Арх.), Собачьи пометки (Подол.), Свиноупникъ, Рыжуха (Вол., Под.). Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), распространенное повсемѣстно въ Европѣ и въ Россіи. вып. 4—7 вершковъ. Стебель растопыренно-вѣтвистый. Нижніе листья перисто-разсѣченные, верхніе цѣльные. линейные. Чашечка 4-хлестная; лепестковъ нѣтъ; тычинокъ 2. Плодъ—кругло-овальный стручковъ, съ лодкообразными створками, безъ крыльевъ, съ узкой окраиной на верхней ихъ части. Цвѣтетъ въ продолженіе всего теплаго времени. Растетъ на сорныхъ мѣстахъ и около домовъ. Издастъ сильный неприятный запахъ, изгоняющій клоповъ.

Клоповникъ, см. Погребомъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista Galli* L.).

Клоповникъ, см. Гулявникъ лекарственный (*Sisymbrium officinale* L.).

Клоповникъ, см. Папортникъ черный (*Struthiopteris germanica* L.).

Клоповникъ, см. Ярутка полевая (*Thlaspi arvense* L.).

Клоповникъ большой } см. Багульникъ болотный (*Ledum pa-*
Клоповникъ-трава } *lustre* L.).

Клочида }
Клочичка } см. Клекачка перистая (*Staphylea pinnata* L.).

Клубника (*Fragaria collina* Ehrh.). Земляника испанска (у сад.), Клубника, Клубничникъ (повсюду въ вел. Росс.), Глубенка (Ирк.), Глубинга (Вятск.), Голубника (Кавк.), Полевница, Полуница, Полуница, Полуниця (Малор.), Половница, Полуничникъ (Малор.), Полуница, Полуницы (Екат.), Поланцы (Малор.), Поленица (Балта), Трусовка (Кiev.), Крупнижная трава (Влад.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), распространенное почти по всей Европѣ и Россіи, съ нитевидными, стелющимися на почвѣ и укореняющимися въ углахъ, побѣгамъ съ тройчатыми листьями. Листочки сверху темнозеленые, по обѣимъ сторонамъ, преимущественно-же снизу, серебристо-пушистые. Цвѣточные стебли темного превышаютъ листья. Цвѣтки не вполне двудомные, въ полузонтикахъ, бѣлые; одни—плодущіе, съ тычинками, столь-же длинными, какъ и пестикъ, другіе—безплодные, съ тычинками, вдвое превышающими пестикъ. Чашечка 5-тираздѣльная, приросшая къ полусферовидному цвѣтоложу, доли ея прижаты къ плоду; лепестковъ 5, обратно-яйцевидныхъ, прикрѣпленныхъ подъ краемъ цвѣтоложа; тычинокъ неопредѣленное число; плодолостики съ короткимъ боковымъ столбикомъ, расположенные на мясистой выпуклости цвѣтоложа, становящейся при плодахъ сочною; красный ягообразный плодъ состоитъ изъ сѣмянокъ, заключенныхъ въ мясистомъ цвѣтоложѣ, при основаніи суженный и на нижней своей части безъ сѣмянокъ; употребляется въ пищу, хотя не столь мягкій и вкусный, какъ плодъ земляники или садовой клубники. Растетъ на холмахъ между кустарниками. Цвѣтетъ весною и въ началѣ лѣта.

Клубника садовая (*Fragaria elatior* Ehrh.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), встрѣчающееся въ дикомъ состояніи въ средней и южной Россіи, между кустарниками и въ рощахъ, съ нитевидными, стелющимися и укореняющимися въ углахъ, побѣгамъ, съ прикорневыми, длинно-черешковыми тройчатыми листьями, снизу слегка мелколистными и вѣтвистой стрѣлкой, несущей бѣлые, въ полузонтикахъ, цвѣты. Цвѣты двудомные; чашечка 5-тираздѣльная; чашелистики при плодахъ отвороченные или отстоящіе; лепестковъ 5; тычинокъ неопредѣленное количество; въ плодущихъ цвѣткахъ тычинки столь-же длинныя, какъ пестикъ. Пестикъ состоитъ изъ нѣсколькихъ плодниковъ. Ложный яйцевидный крупный плодъ красного цвѣта; сѣмянки до половины погружены въ мякоть выпуклаго мясистаго сочнаго цвѣтоложа. Клубника разводится, подобно земляникѣ, во многихъ сортахъ почти повсюду въ Россіи въ садахъ и огородахъ. Цвѣтетъ въ маѣ и началѣ юня.

Клубника } см. Клубника (*Fragaria collina* Ehrh.).
Клубничникъ }
Клубочная трава, см. Ежа сборная (*Dactylis glomerata* L.).
Клюкъ лягушечій, см. Ряска маленькая (*Lemna minor* L.).
Клюква, см. Линнея сѣверная (*Linnaea borealis* L.).
Клюква болотная (*Oxycoccus palustris* Pers. sin. *Vaccinium* *Oxycoccus* L.). Брусничникъ журавлиный, Веснянка (Пск.), Журавина (Вел. и Мал. Росс.), Журавиха (Мал. Росс.), и изм. Жаравина, Жаравика (Волог., Костр., Инж.), Жаровика (Новг.), Жарава (Костр.), Жаравиха (Вятск., Костр., Перм., Арх.); Жаравица (Волог.), Жаровица (Арх.), Жеровина, Жеревика, Жиравина (Новг., Пск., Твер.), Жиравина (См. Церк.), Жиравинина (Новг., Пск., Тв.), Жиравины (Смол.), Журава, Журавина (Новг.), Журавлины (Пск.), Журавина (Полтв.), Журавика (Пет. Вл. К.), Журовина (Гродн.), Журовинникъ (Черн.), Клюква (периоду въ Вел. Росс.), Клюковникъ, Поденжница (Даль). (Таб. XX, фиг. 113 и 114.)

Вѣчно-зеленый стелющійся кустарничекъ, дл. 7 вершк., изъ семейства «вересковыхъ» (*Ericaceae* Lindl.), съ нитевидными вѣтвями, распространенный въ сѣв. и средн. Европѣ, въ сѣверной и средней Россіи, въ Малороссіи и въ Сибири. Листья продолговато-яйцевидные, острые, съ загнутыми краями, снизу пенельные. Пурпуровые цвѣты, поникшіе на длинныхъ цветоножкахъ, снабженныхъ 2-мя прицвѣтниками, выходящихъ изъ узловъ чешуйчатыхъ верхушечныхъ листьевъ и собранныхъ по 1—4 на концахъ прошлогоднихъ вѣтвей. Чашечка 4-хзубчатая; вѣнички 4-хлепестный, раздѣльный, съ отогнутыми долями; тычинокъ 8—10, свободныхъ, прикрытыхъ вокругъ надпестичнаго диска. Гнѣзда пыльниковъ удлинены наверху въ трубочку, открывающуюся на верхушкѣ отверстиями, завязь нижняя 4—5-тигнѣздная, со срединнымъ сѣмяноцемъ и многочисленными сѣмяпочками; столбикъ нитевидный съ цѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ—сравнительно крупная, шаровидная, темнокрасная ягода, кислая на вкусъ. Растетъ на торфяныхъ болотахъ. Цвѣтетъ въ іюнѣ. Изъ ягодъ, тронутыхъ морозомъ, приготовляютъ очень вкусное и пріятное варенье, питье, и проч.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Листья клюквы употребляются крестьянами, вмѣсто чая. Въ медицинѣ отваръ клюквы дается, какъ прохладительное питье, при лихорадкѣ; кроме того, клюква считается хорошимъ противоцинготнымъ средствомъ.

Клюковникъ, см. Клюква болотная (*Oxycoccus palustris* Pers.).

Ключъ, см. Земляные орѣшки (*Spiraea spiraeoides* L.).

Ключъ-трава, см. Гроздовникъ обыкновенный (*Bothrychium Luparia* Sw.).

Ключевая, см. Вероника ключевая (*Veronica Anagallis* L.).

Ключевикъ (*Anthriscum Orontium* L.), Лынный зѣвъ полевой.

Однолистая трава изъ семейства «норичниковыхъ» (*Scrophula-*

riaceae R. Br.), распространенная въ средней и южной Европѣ и на югѣ Россіи, выш. 4—8 верш., съ прямымъ, тонкимъ, болѣею частью съ самого основанія вѣтвистымъ, стеблемъ и узкими, линейно-ланцетными, спиральными листьями; верхушечные листья значительно превышаютъ цвѣтки. Красноватые цвѣты сидятъ поодинокѣ въ углахъ верхнихъ листьевъ. Чашечка глубоко-пятираздѣльная, железисто-шершавая, съ линейными долями, превышающими вѣничикъ и коробочку; вѣничикъ двугубый; трубочка его при основаніи съ полымъ бугромъ; верхняя его губа двулостная, нижняя—трехлопастная и при основаніи сверху выпуклая, закрывающая такимъ образомъ зѣвъ вѣничка. Тычинокъ 4, изъ нихъ 2 короче и 2 длиннѣе; при основаніи пестика болѣе или менѣе замѣтный дискъ; завязь верхняя 2-гнѣздная, съ 2 стѣжчатыми сѣмяносцами. Плодъ—мохнатая, косо-яйцевидная коробочка, съ 2-мя неравными гнѣздами, изъ которыхъ переднее раскрывается двумя зубчатыми отверстіями, а заднее—однимъ. Сѣмена овальные, на наружной сторонѣ выпуклыя и съ ребрышкомъ, на внутренней вогнутыя, съ загнутымъ зубчатымъ краемъ. Растетъ на поляхъ между посѣвами. Цвѣтетъ лѣтомъ. Прежде считалась среди народа волшебной травой, предохраняющей отъ колдуновъ и русалокъ. (Рис. 116.)

Ключики, см. Колокольчикъ раскидистый (*Campanula patula* L.).

Ключики, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* L.).

Ключики } см. Норемокъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista Galli* L.).

Ключники }

Ключъ, см. Желтоцвѣтъ пахучій (*Barbarea vulgaris* R. Br.).

Кминъ, см. Тминъ обыкновенный (*Carum carvi* L.).

Кминъ водяной, см. Укропъ конскій (*Oenanthe Phellangrium* L.).

Кминъ черный, см. Чернушка (*Nigella sativa* L.).

Кмѣнъ, см. Тминъ обыкновенный (*Carum carvi* L.).

Кнафликъ (*Verbascum Blattaria* L.). Кнафличка, Мольная трава,

Мольнякъ, Звѣрбой степной, Семилстникъ, Скипетръ царскій.

Двулѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «норичниковыхъ» (*Scrophulariaceae* R. Br.), распространенное въ средней и южной Европѣ, встрѣчающееся въ средней и южной Россіи, въ Туркестанѣ, на Альпахъ. Стебель выш. 11—22½ верш.; листья спиральные, голые, крупно-зубчатые; нижніе—черешковые, продолговато-обратнояйцевидные, средніе—сидячіе, продолговатые, верхніе—почти сердцевидные. Желтые, рѣдко бѣлые, цвѣты собраны длинною, рыхлою кистью; цвѣтоножки вдвое длиннѣе чашечки. Чашечка 5-тираздѣльная, съ линейно-продолговатыми долями; вѣничикъ колесовидный, съ короткою трубкой и 5-ю не совсѣмъ одинаковыми лопастями; тычинокъ 5, неодинаковыхъ, переднія изъ нихъ длиннѣе; нити тычинокъ фиолетовыя, мохнатыя отъ волосковъ; пыльники почковидные, одностѣздные, раскрывающіеся поперекъ; завязь верхняя, двугнѣздная, съ однимъ столбикомъ и булавовиднымъ рыльцемъ. Плодъ—почти шаровидная коробочка, почти вдвое превышаю-

щая чашечку. Растетъ на поляхъ, лугахъ и каменистыхъ мѣстахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. (Р и с. 117.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Травя кнафлика прежде употреблялась въ медицинѣ, теперь совсѣмъ оставлена. Растеніе это называется мольникомъ вслѣдствіе того, что ему приписывалось свойство истреблять моль.

Кнафличка, см. Кнафликъ (*Verbascum Blattaria* L.).

Книль простая, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).

Кнѣль, см. Вишвица болотная (*Pedicularis palustris* L.).

Княжанка, см. Смородина красная (*Ribes rubrum* L.).

Княжанка } см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).

Княженика } см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).

Княженика, см. Смородина красная (*Ribes rubrum* L.).

Княжениха, см. Куманика (*Rubus caesius* L.).

Княженица см. Смородина красная (*Ribes rubrum* L.).

Княженица } см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).

Княженичка } см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).

Княженичникъ } см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).

Княжика } см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).

Княжика } см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).

Княжина } см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).

Княжиха } см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).

Княжица } см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).

Княжица, см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).

Княжника } см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).

Княжница } см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).

Княжница } см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).

Княжница красная } см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).

Кобылій стець, см. Подорожникъ ланцетный (*Plantago lanceolata* L.).

Кобылій стець, см. Подорожникъ большой (*Plantago major* L.).

Кобылья трава, см. Марьяшникъ лѣсной (*Melampyrum silvaticum* L.).

Ковальникъ, см. Ослиникъ двулѣтній (*Oenothera biennis* L.).

Ковиль, см. Ковыль волосистый (*Stipa capillata* L.).

Ковиль, см. Ковыль перистый (*Stipa pennata* L.).

Коврига бѣлая, см. Бѣлоголовка (*Trifolium montanum* L.).

Коврига красная, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Коврижка бѣлая, см. Клеверъ бѣлый, ползучій (*Trifolium repens* L.).

Коврижка красная, см. Клеверъ средний (*Trifolium medium* L.).

Коврижка, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Ковыла, см. Ковыль волосистый (*Stipa capillata* L.).

Ковылка, см. Ковыль волосистый (*Stipa capillata* L.).

Ковыля, см. Ковыль перистый (*Stipa pennata* L.).

Ковыль, см. Ковыль перистый (*Stipa pennata* L.).

Ковыль, см. Ковыль волосистый (*Stipa capillata* L.).

Ковыль, см. Ковыль перистый (*Stipa pennata* L.).

КОВЫЛЬ ВОЛОСИСТЫЙ (*Stipa capillata* L.). Иголка, Камышъ, Ки-Ковыль (Вел. Росс.), Ковиль (Малор.), Кавыла (Ставр.), Ковыла, Ковылка (Вор.), Степчина (Херс.), Овечья смерть, Тирза, Тирса, Тырса, Шелковая трава. Волосистый ковыль представляет жесткую, многолѣтнюю траву изъ семейства «злаковыхъ» (Gramineae Juss.), распространенную въ средней и южной Европѣ, въ средней и южной Россіи, въ Туркестанѣ и Сибири, вып. 7—13 вершк., образующую густыя дерновинки. Листья узкіе, щетинообразные. Метелка состоитъ изъ однолѣтнихъ колосковъ, наружная пленка которыхъ продолжена въ длинную, голую, колычатую, при основаніи скрученную ость. Цвѣты мелкіе, невзрачные, обоеполовые. Двѣ нижнія чешуи колоска образуютъ прицвѣтники, называемые створками, изъ которыхъ наружная сидитъ немного ниже внутренней. За створками слѣдуетъ цвѣтокъ, снабженный двумя пленками: наружной и внутренней. Околоцвѣтъ замѣненъ 2 нѣжными пленочками. Тычинокъ 3; завязь однолѣздная, однолѣмянная, съ 2-мя столбиками, несущими перистыя рыльца. Плодъ—зерновка.

Растетъ на горахъ и въ степныхъ мѣстахъ преимущественно на сухой известковой почвѣ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Принадлежитъ къ вреднымъ кормовымъ травамъ. (Рис. 118.)

КОВЫЛЬ ПЕРИСТЫЙ (*Stipa pennata* L.). Волоски, Кило (Херс.), Кипецъ (по Ирт., когда зеленый, а во время зрѣлости Ковыль), Ковыла (Екат.), Ковыль (Сам., Саратов.), Ковыль (Вел. Росс.), Ковиль (Малорос.), Марынъ лень, Любима (сѣмена ковыля въ Сибири), Овечья смерть, Перпикъ, Свистуха (молод. кусты въ Херс.), Степчина, Тирса (Херс.), Шелковая трава (Курск.), Шовкова трава (Малор.). Отличается отъ ковыля волосистаго, см. описаніе выше: ковыль волосистый (*Stipa capillata* L.), болѣе длинною остью, которая внизу голая, а въ верхней части перистая. Область распространенія и пора цвѣтенія тѣ-же, что у ковыля волосистаго.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Ковыль перистый употребляется изрѣдка въ народной медицинѣ. Въ Пермской губерніи собираютъ растеніе съ плодами и безъ корня, распариваютъ въ молокѣ и прикладываютъ распаренное растеніе къ зубу, а молоко, которымъ распаривали ковыль, пьютъ.

КОВЫЛЬНИКЪ, см. Дымянка лекарственная (*Fumaria officinalis* L.).

КОЖЕВЕННОЕ ДЕРЕВО, см. Сумахъ красильный (*Rhus coriaria* L.).

КОЖЕВЕННОЕ ДЕРЕВЦО, см. Скомпия (*Rhus Cotinus* L.).

КОЖЕЦВѢТЪ, см. Дивала однолѣтняя (*Scleranthus annuus* L.).

КОЖУЧЕЧКИ, см. Репяшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).

КОЖУЧКИ } см. Липучка репейчатая (*Echinospermum Lappula* Lehm.).

КОЖУШКА } см. Репяшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).

КОЗАКЪ, см. Репейникъ ланцетный (*Plantago lanceolata* L.).

КОЗАКЪ, см. Березовый грибъ (*Boletus scaber* Bull.).

- Козакъ**, см. Купальница европейская (*Trollius europaeus* L.).
- Козаки**, см. Подорожникъ средний (*Plantago media* L.).
- Козелъ**, см. Масленникъ (*Boletus luteus* L.).
- Козель**, см. Борщевикъ сибирскій (*Heraclium sibiricum* L.).
- Козель**, см. Бедренецъ обыкновенный (*Pimpinella saxifraga* L.).
- Козелокъ**, см. Козлобородникъ луговой (*Tragopogon pratensis* L.).
- Козелѣкъ**, см. Козлобородникъ луговой (*Tragopogon pratensis* L.).
- Коз-лекъ**, см. Бедренецъ обыкновенный (*Pimpinella saxifraga* L.).
- Козелецъ**, см. Вѣтренница лютиковая (*Anemone ranunculoides* L.).
- Козелецъ**, см. Дигиль лѣсной (*Angelica silvestris* L.).
- Козелецъ**, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).
- Козелецъ**, см. Борщевикъ сибирскій (*Heraclium sibiricum* L.).
- Козелецъ**, см. Пастернакъ огородный (*Pastinaca sativa* L.).
- Козелецъ**, см. Бедренецъ обыкновенный (*Pimpinella saxifraga* L.).
- Козелецъ**, см. Лютикъ ѣдкій (*Ranunculus acer* L.).
- Козелецъ**, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).
- Козелецъ**, см. Козелецъ приземистый (*Scorzonera humilis* L.).
- Козелецъ**, см. Козлобородникъ луговой (*Tragopogon pratensis* L.).
- Козелецъ заячій**, см. Латука дикій или дикій салатъ (*Lactuca scariola* L.).
- Козелецъ приземистый** (*Scorzonera humilis* L.). Змѣдушникъ низкій. Змѣевъ обѣдъ, Козелецъ, Косматикъ, Масленки, Перелотъ (Могил.), Бѣлый пушекъ (Волог.), Ранникъ (Кіев.), Трицуфель (Черн.), Ужовникъ. Преземистый козелецъ представляетъ многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное преимущественно въ средней Европѣ и въ западной Россіи, встречающееся также почти по всей Россіи и въ Крыму, съ толстымъ отвѣснымъ корнемъ и прикорневыми эластическими листьями, образующими розетку при основаніи стебля. покрытаго бурыми влагалищами отсохшихъ листьевъ. Стеблевыхъ листьевъ 2—3 уменьшенныхъ. Желтые цвѣты въ довольно крупныхъ головкахъ съ шерстистой, при основаніи, оберткой, наружные листочки которой яйцевидные, внутренне—узколанцетные, заостренные, но на самой верхушкѣ туповатые. Язычковые цвѣтки вдвое превышаютъ обертку. Тычинокъ 5, прикрѣпленныхъ нитями къ трубчкѣ вѣнчика; пыльники линейные, соединенные въ трубочку, черезъ которую проходитъ столбикъ; столбикъ нитевидный, въ мужскихъ цвѣтахъ нераздѣльный, въ плодущихъ на верхушкѣ двулопастный. Завязь нижняя, одногнѣзная, съ одною сѣмянкой, прямостоячею на двѣ завязи. Плодъ—сѣмянка съ перистымъ хохолкомъ. Растетъ на лугахъ, между кустарниками, въ рощахъ. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Козелецъ приземистый употребляется въ народной медицинѣ и носитъ названіе «ужовника», потому что свѣженстолченные листья растенія прикладываются къ ранамъ отъ укушенія змѣй. Отъ зубной боли изъ растенія дѣлають припарки. Отваръ корня служитъ охлаждающимъ напиткомъ, онъ дѣйствуетъ немного слабительно, также помогаетъ отдѣленію мокроты. Для того, чтобы приготовить отваръ, берутъ 1 унцѣ (30 грм.) корня, заливають однимъ фунтомъ воды и кипятятъ, пока не останется 8 унцѣ (16 стол. л.=240 грм.). Свѣжевыжатый сокъ въ количествѣ 1—2 унца дается съ молочною сывороткою. Свѣжій молодой корень кладутъ въ супы, сухіе корни толкутъ въ муку и прибавляютъ къ обыкновенной мукѣ въ случаѣ недостатка въ пищѣ.

Козелецъ, см. Лютикъ ѣдкій (*Ranunculus acer* L.).

Козелецъ) см. Козлобородникъ луговой (*Tragopogon pratensis* L.).

Козелки)

Козелки, см. Васильки рогаые (*Delphinium consolida* L.).

Козелки, см. Пастернакъ огородный (*Pastinaca sativa* L.).

Козелки, см. Лютикъ ѣдкій (*Ranunculus acer* L.).

Козелки, см. Бѣлогловка (*Trifolium montanum* L.).

Козелокъ, см. Козлобородникъ луговой (*Tragopogon pratensis* L.).

Козелокъ, см. Осотъ огородный (*Sonchus oleraceus* L.).

Козелокъ, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Козелька, см. Голубки обыкновенные (*Aquilegia vulgaris* L.).

Козельчикъ, см. Пастернакъ огородной (*Pastinaca sativa* L.).

Козельчики, см. Горная петрушка (*Peucedanum Oreoselinum* Moench.).

Козельчики, см. Васильки рогаые (*Delphinium consolida* L.).

Козельникъ, см. Пижма обыкновенная (*Tanacetum vulgare* L.).

Козельци, см. Козлобородникъ луговой (*Tragopogon pratensis* L.).

Козельцовый корень, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Козюлки, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Козлецъ, см. Бедренецъ обыкновенный (*Pimpinella saxifraga* L.).

Козлечникъ, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* L.).

Козли, см. Стрѣлолистъ обыкновенный (*Sagittaria sagittifolia* L.).

Козлики, см. Васильки рогаые (*Delphinium consolida* L.).

Козлики, см. Бедренецъ обыкновенный (*Pimpinella saxifraga* L.).

Козлики, см. Подорожникъ ланцетный (*Plantago lanceolata* L.).

Козлики малые, см. Истодъ хохлатый (*Polygala comosa* Schk. L.).

Козлиникъ вояучій, см. Стальникъ пахучій (*Ononis hircina* Jacq.).

Козлыны, см. Козлобородникъ луговой (*Tragopogon pratensis* L.).

Козличка, см. Васильки рогаые (*Delphinium consolida* L.).

Козлобородъ луговой, см. Козлобородникъ луговой (*Tragopogon pratensis* L.).

Козлобородникъ луговой (*Tragopogon pratensis*). Фармацевтическое названіе: *Tragopogon v. Barba Hirci* (Rad.). Борода козья, Борода козлова, козлиная, Козлобородъ луговой, Чертова борода, Бычокъ (Курск.), Какишъ (Херс., Хр.), Козелецъ (южн. Росс., Тамб., Курск.), Козелецъ (Малор.), Козельци (Малор.), Козелокъ, Козелёкъ, Козелки (Малор.), Козлы (Малор.), Козлицы, Козлолокъ (Мог.), Коченда (Илиз. Урала), Кочетокъ, Косматникъ (Самар.), Косматикъ (Сарат.), Кудрявецъ (Курск.), Кудрявникъ (Нижег.), Кудрявка (Вор.), Кудрявущки, Кудряшокъ (Перемышль), Кудрявчаки (Орл.), Молочайникъ, Молочайникъ козлобородый, Молочникъ (Ворон.), Чехмерица, Шеломайникъ. Двудѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное почти во всей Европѣ и Россіи. Все растеніе сѣровато-зеленое. Стебель прямо-стоящій, слабо-вѣтвистый, выш. 7—13 вершковъ. Листья линейные, дѣльно-крайніе, заостренные, при основаніи влагалищные. Желтые цвѣты въ корзинкахъ, снабженныхъ обертками. Листья обертки (большію ч. въ числѣ 8) расположены въ одинъ рядъ. Всѣ цвѣты язычковые. Тычинокъ 5; нити ихъ свободны, пыльники-же сныаны въ трубочку, черезъ которую проходить столбикъ. Завязь нижняя, одногнѣздная, односѣмянная, съ однимъ столбикомъ и раздвоеннымъ рыльцемъ. Плодъ—сѣмянка съ перистымъ хохолкомъ. Корзинки смыкаются уже около 9 ч. утра. Растетъ на лугахъ и въ степяхъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. (Таб. XX, фиг. 115.)

Козловка, см. Тминъ обыкновенный (*Carum carvi* L.).

Козловникъ, см. Пастернакъ огородный (*Pastinaca sativa* L.).

Козловникъ дикій, см. Бедренецъ обыкновенный (*Pimpinella saxifraga* L.).

Козлы, см. Стрѣлолистъ обыкновенный (*Sagittaria sagittae-folia* L.).

Козлы, см. Василистникъ голубковый (*Thalictrum aquilifolium* L.).

Козлы, см. Козлобородникъ луговой (*Tragopogon pratensis* L.).

Козлятникъ, см. Рута козья трава (*Galega officinalis* L.).

Козодрозь бѣлая, см. Вѣтреница тѣлистая (*Anemone nemorosa* L.).

Козодрозь желтая, см. Вѣтреница лютиковая (*Anemone ranunculoides* L.).

Козольчекъ, см. Плакунъ-трава (*Lythrum salicaria* L.).

Козыль морской (*Ambrosia maritima* L.). Дикое божье дерево, Безсмертная трава. Однодѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), произрастающее въ южной Европѣ и извѣстное еще у древнихъ, какъ лекарственное растеніе. Они употребляли его, какъ возбуждательное и укрѣпляющее средство, теперь оно совершенно оставлено. Сухая трава имѣетъ пріятный запахъ, ее кладутъ въ сундуки между платьями для сохраненія ихъ отъ моли и для придачіи имъ пріятнаго запаха.

Козяча борода, см. Аройникъ пятнистый (*Arum maculatum* L.).
Кокель, см. Мыльнянка лекарственная (*Saponaria officinalis* L.).
Кокиль, см. Хлопушка (*Silene inflata* Smith.).
Кокись, см. Ятрыжникъ широколистный (*Orehis latifolia* L.).
Кокишь, см. Шалфей луговой (*Salvia pratensis* L.).
Коконя, см. Картофель (*Solanum tuberosum* L.).
Кокорва, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematidis* L.).
Кокоричка, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).

Кокорнакъ } см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clema-*
Кокорникъ } *titis* L.).

Кокорникъ, см. Хохлатка плотная (*Corydalis solida* Smith.).

Кокорникъ, см. Дымянка лекарственная (*Fumaria officinalis* L.).

Кокорышъ, см. Петрушка собачья (*Aethusa Cynapium* L.).

Кокорышъ, см. Дымянка лекарственная (*Fumaria officinalis* L.).

Кокосовая пальма (*Cocos nucifera* L.). Кокосовые орѣхи. Это—высокое, въ нѣсколько сажень вышины, пальмовое дерево, съ перистыми длинными листьями и громадными, величинами съ дѣтскую голову, и тяжелыми плодами—«кокосовыми орѣхами», родомъ изъ Остѣ-Индіи, гдѣ образуетъ цѣлые лѣса; распространено въ настоящее время во всѣхъ тропическихъ странахъ и весьма цѣнится туземцами, такъ какъ приносить имъ неисчислимыя разнообразныя выгоды. Незрѣлые плоды содержатъ молочкообразный сокъ—кокосовое молоко, изъ котораго готовится пріятное, освѣжающее питье. Изъ молока особымъ образомъ получаютъ спиртный напитокъ, не уступающій по крѣпости и по вкусу пуншу. Зрѣлые молодые плоды употребляются въ пищу какъ въ сыромъ видѣ, такъ и въ видѣ различныхъ кушаньевъ. Изъ зрѣлыхъ зеренъ добываютъ кокосовое, или пальмовое масло, составляющее весьма важный предметъ торговли; оно употребляется и на свѣчныхъ заводахъ, въ очищенномъ видѣ употребляется въ пищу. Зерна, изъ которыхъ выжато масло, идутъ въ кормъ скоту. Изъ твердой оболочки плодовъ готовятъ различную утварь, посуду, лампы, пуговицы и проч. Пережженная, она доставляетъ превосходный древесный уголь, употребляется на приготовленіе зубныхъ порошковъ и т. п. Цвѣточныя почки употребляются въ пищу, какъ овощъ, сокъ-же, вытекающій изъ нихъ, доставляетъ очень пріятное на вкусъ пальмовое вино, изъ котораго готовятъ крѣпкій спиртный напитокъ «аракъ». Кромѣ того, прокипяченный сокъ доставляетъ сиропъ, изъ котораго добываютъ сахаръ. Изъ ствола дерева вытекаетъ родъ гумми, употребляющагося, какъ дубильное вещество. Изъ листьевъ дѣлаютъ навѣсы, зонтики, разные плетенья, покрывки и проч. Высушенные листья могутъ даже замѣнять бумагу. Волокна и первые листья употребляются на выдѣлываніе веревокъ, канатовъ, веревъ для ловли рыбъ и птицъ. Плотное, толщиною въ нѣсколько сантиметровъ, околоплодіе чрезвычайно волокнистое, мочать въ водѣ, колотятъ, мнутъ и расчесываютъ, какъ

наипъ легъ, и изъ обработанныхъ такимъ образомъ волоконъ приготавливаютъ грубые мѣшки, употребляютъ для набиванія подушекъ, на всевозможныя щетки, кисти, метелки и проч. Необработанныя волокна употребляются, какъ половыя тряпки; болѣе нѣжныя волокна идутъ на пряжу. Древесина, въ продолженіе того, какъ дерево приноситъ плоды, т. е. около 35 лѣтъ, совершенно непригодна, какъ строительный матеріалъ, но послѣ цѣнится весьма дорого, употребляется на постройку домовъ, доставляетъ крѣпкія балки и бревна, дрова и также употребляется въ столярномъ и токарномъ производствахъ. Изъ корней дерева плетутъ корзины, лоханки и проч.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Сокъ кокосовыхъ плодовъ славится, какъ хорошее противовоспалительное средство. Изъ цвѣтущихъ головокъ приготавливаютъ кокосовое вино. Кокосовое масло иногда замѣняетъ оливковое масло или свиное сало, по качеству оно все-таки гораздо хуже ихъ. Иногда его употребляютъ вмѣсто рыбьяго жира. Всего болѣе кокосовое масло идетъ на приготовление различныхъ сортовъ мыла.

Кокосовые орѣхи, см. Кокосовая пальма (*Cocos nucifera* L.).

Кокотъ орловъ, см. Чина весенняя (*Orobis verius* L.).

Кокотники, см. Ятрышникъ широколистный (*Orchis latifolia* L.).

Кокурки, см. Вересклетъ бородавчатый (*Evonymus verrucosus* L.).

Кокутъ, см. Дягиль лѣсной (*Angelica silvestris* L.).

Кокущечникъ, см. Колокольчикъ сборный (*Campanula glomerata* L.).

Кокушка, см. Кокушникъ (*Gymnadenia conopsea* Rich.).

Кокушникъ, см. Сердечникъ полевой (*Cardamine pratensis* L.).

Кокушникъ, см. Фиалка ночная (*Platanthera bifolia* Rich.).

Кокушникъ (*Gymnadenia conopsea* Rich.). Фармацевтическое названіе: *Palma Christi major*. Кокушникъ имѣетъ слѣдующія мѣстные названія: Стрѣнькая зюзюля, Зозульки, Зозулены слезки (Укр.), Кокушка (Орл.), Крестовикъ, Крестовый корень, Заячьи лапки (Олон.), Ласъ, Пѣтушки (Урал.), Похребетная (Олон.), Персопъ, Похвостень, Прошибень (Курск.), Ручка (Арх.), Ручники (Гродн.), Старчикъ (Гродн.), Ядрушки (Могил.), Плакунъ (Олон.). Кокушникъ—многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «орхидейныхъ» (*Orchideae* Juss.), распространенное почти по всей Европѣ, въ средней, юго-зап. Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ и въ Сибири, съ пальчато-раздѣльными корневыми шишкками. Стебель выш. 4—13 вершк., съ передними цѣльными, длинными, линейно-ланцетными листьями и цилиндрическимъ не очень густымъ соцвѣтлемъ. Прицвѣтники травянистые, съ 3-мя жилками, столь же длинныя, какъ цвѣтки. Цвѣты пурпуровые. Лепестковидный околоцвѣтникъ состоитъ изъ 3-хъ наружныхъ и 3-хъ внутреннихъ листочковъ; одинъ изъ внутреннихъ образуетъ губу, неглубоко трехлопастную, обращенную внизъ и снабженную нитевиднымъ шпорцемъ въ 1½—2 раза длиннѣе завязи; три верхніе листочка околоцвѣтника сходятся налетомъ; боковые 2 отстоятъ отъ нихъ. Тычинка одна; нить ея срастается со

столбикомъ завязи въ колонку «гиностелій», съ приросшимъ двугнѣзднымъ пыльникомъ; пыльцевыя массы порошковатыя, снабженныя болѣе или менѣе длинными ножками и железками; завязь нижняя одногнѣздная, обыкновенно скрученная; рыльце находится на колонкѣ подъ пыльникомъ; плодъ—коробочка. Растетъ на лугахъ, между кустарниками. Цвѣтетъ лѣтомъ (Рис. 119.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Кокушникъ употребляется только въ народѣ: въ Гродненской губерніи — отъ зубной боли, въ Архангельской отваръ даютъ коровамъ отъ кахла, въ Орловской губерніи отваръ растения считается любовнымъ напиткомъ.

Колъ, см. Чертополохъ ланцетолістный (*Cirsium lanceolatum* L.).

Колбочки, см. Купальница европейская (*Troilus europaeus* L.).

Колдовская трава } см. Колдунъ трава (*Circaea lutetiana* L.).

Колдуница }

Колдунникъ, см. Дрема, Кукушкинъ цвѣтъ (*Lychnis flos cuculi* L.).

Колдуница парижская, см. Колдунъ-трава (*Circaea lutetiana* L.).

Колдунъ-трава (*Circaea lutetiana* L.). Волшебная или Колдовская трава, Колудуха, Колдуница, Колудунова трава (Вят.), Колдуница парижская, Вѣдьмино зелье, Вѣдьмино зѣло (Малор.), Ренейникъ дикій, Осоть, Липта (Могил.). Чернокувитъ, Степанова трава. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «кнпрейниковыхъ» (*Onagraceae* Juss.), распространенное въ Европѣ, въ южной и юго-западной Россіи, встрѣчающееся въ среднихъ и сѣверныхъ губерніяхъ. Стебель мягко-волосистый, часто невѣтвистый; листья супротивные, съ округлымъ основаніемъ, яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, отдаленно-зубчатые, заостренные, черешокъ внизу желобчатый. Мелкіе бѣлые или розоватыя цвѣты въ верхушечныхъ кистяхъ.

Колокитина, см. Клекачка перистая (*Staphylea pinnata* L.).

Колоколъ, см. Голубки обыкновенныя (*Aquilegia vulgaris* L.).

Колоколець, см. Колокольчикъ перенколистный (*Campanula persicifolia* L.).

Колоколуша, см. Черемуха (*Prunus Padus* L.).

Колокольня луговая, см. Горечавка крупная (*Gentiana pneumonanthe* L.).

Колокольцы, см. Голубки обыкновенныя (*Aquilegia vulgaris* L.).

Колокольчикъ большой, см. Колокольчикъ крапиволистный (*Campanula Trachelium* L.).

Колокольчикъ боровой, см. Колокольчикъ сборный (*Campanula glomerata* L.).

Колокольчикъ боровой (*Campanula rapunculoides* L.). Вѣлокренникъ, Курятина, Куринка (Укр.), Боровой колокольчикъ представляетъ многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «колокольчиковыхъ» (*Campanulaceae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ и почти во всей Россіи, съ ползучими подземными побѣгами. Стебель выпн. 7—14 вершковъ, съ тупыми углами, вѣтвь съ листьями коротко-шершавый;

листья спирально-расположенные, неровнопильчатые, нижніе длинно-черешковые, сердцевидные, верхніе—сидячіе, широко-ланцетовидные. Поникшіе лазоревые или сине-лиловые цвѣты расположены однобочною кистью; цвѣты обоополовые; чашечка глубокопятираздѣльная; вѣнчикъ колокольчатый; 5-тило-пастный, сростчато-лепестный, до $\frac{1}{3}$ надрѣзанный, лопасти его по краямъ рѣсничатые. Чашечка глубоко-двураздѣльная, лепестковъ 2, при основаніи округлыхъ, столь-же длинныхъ, какъ доли чашечки; тычинокъ 2; завязь нижняя, грушевидная; столбикъ нитевидный, съ головчатымъ рыльцемъ; плодъ двусемянный, обратно-яйцевидный, покрытый волосами. Растетъ въ тѣнистыхъ лѣсахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. (Таб. XXI, фиг. 116.)

Колендра, см. Кишнець огородный (*Corlandrum sativum* L.).

Колесникъ, см. Астргалъ солодколистный (*Astragalus glycyphillus* L.).

Колесница, см. Гречиха птичья, Гречиха спорышъ (*Polygonum aviculare* L.).

Колечки, см. Гусиная лапка (*Potentilla anserina* L.).

Колинджанъ, см. Калганъ (*Alpinia Galanga* Sw.).

Колколець, см. Погремокъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista Galli* L.).

Коловатникъ, см. Дурнишникъ обыкновенный (*Xanthium Strumarium* L.).

Коловѣй, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).

Колокольчикъ боровой, см. Колокольчикъ крапиволистный (*Campanula Trachelium* L.).

Колокольчикъ жестковолосый (*Campanula Cervicaria* L.).

Балаболка, Вѣшавъ (Вятск.), Дзвонецъ (Гродн.), Синій звѣробой (Волог.), Звонокъ кудлатый, Квашня, Колокольчикъ оленій, Куцавей (Черн.), Мужикій, т. е., мужской переполохъ (Сиб.), Петровъ батыжекъ (Екат.), Декабрь (Орл.), Дурманъ (Новг.), Полевой желѣзникъ (Екат.), Заря (Смол.), Христовъ застыль (Костр.), Змѣиная (Олон.), Вѣлый звѣробой (Уф.), Лѣсная крапива (Курск.), Лишайникъ (Волин.), Маковникъ (Костр.), Мутная трава (Твер.), Христовъ посохъ (Костр.), Ужовникъ (Гродн.), Укрымъ (Нижег.). Жестковолосый колокольчикъ представляетъ изъ себя многолѣтнее жестко-шершавое травянистое растеніе изъ семейства «колокольчиковыхъ» (*Campanulaceae* Juss.), распространенное въ сѣверной и средней Европѣ и весьма обыкновенное въ Россіи, съ толстымъ, мясистымъ корнемъ и прямымъ гранистымъ стеблемъ; листья спирально-расположенные, мелкогородчатые, линейно-ланцетные, нижніе—сужены постепенно въ черешокъ, верхніе—сидячіе, съ немного стеблеохватывающимъ основаніемъ. Голубые цвѣты скучены головками на верхушкѣ стебля и въ углахъ верхнихъ листьевъ. Чашечка глубокопятираздѣльная, съ тупыми яйцевидными долями. Вѣнчикъ колокольчатый, 5-тилопастный, по краю рѣсничатый. Тычинокъ 5, завязь нижняя 3-хлѣздная, съ однимъ столбикомъ, выдающимся изъ вѣнчика и заканчивающимся 3-храздѣльнымъ рыль-

цемъ. Плодъ — прямостоячая 3-хгнѣзная коробочка, раскрывающаяся отверстіями при верхушкѣ или около середины. Растетъ на влажныхъ лугахъ, въ рощахъ и между кустарниками. Цвѣтетъ лѣтомъ, въ іюль и въ августѣ.

Колокольчикъ земляной, см. Кермекъ лимонный (*Statice Limonium* L.).

Колокольчикъ зеркальцевый (*Campanula Speculum* L.). Это — однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «колокольчиковыхъ» (*Campanulaceae* Juss.), произрастающее въ средней Европѣ. Стебель выш. 3—6 вершковъ, съ растопыренными вѣтвями и продолговатыми, обратно-яйцевидными, спирально расположенными листьями. Чашечка глубоко-пятираздѣльная. Вѣнчикъ 5-тираздѣльный, колосовидный, фіолетовый. Тычинокъ 5; завязь нижняя, 3-хгнѣзная, съ однимъ столбикомъ, заканчивающимся 3-храздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ — коробочка, раскрывающаяся отверстіями. Цвѣтетъ лѣгомъ.

Колокольчикъ крапивolistный (*Campanula Trachelium* L.). Фармацевтическое названіе *Cervicaria major*, *Trachelium*. Колокольчикъ большой, боровой, Дзвоникъ (Малор.), Гусиное горлышко, Гусиная трава (Вятск.), Горляная трава, Костоломъ (Орл.), Каціолки (Гродн.), Липиха (Екат.), Очникъ (Вор.), Надулѣй цвѣтъ (Черп.). Примочная трава (Урал.), Царскій посохъ (Нижег.). Пытушки, Синій цвѣтъ (Екат.), Звонки, Дзвонки, Дзвоньчики (Гродн.). Крапивolistный колокольчикъ представляетъ изъ себя многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «колокольчиковыхъ» (*Campanulaceae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и въ Россіи, покрытое рѣдкими, жесткими волосками. Стебель выш. 13—22 вершковъ, съ острыми углами. Листья съ неровными крупными зубцами по краямъ, спирально расположенные, верхніе — сидячіе, продолговатые нижніе — длинно-черешковые, сердцевидно-яйцевидные. Назушные цвѣтоносы несутъ отъ 1—3 крупныхъ лазуревыхъ, рѣже бѣлыхъ цвѣтовъ. Чашечка глубоко-пятираздѣльная, съ яйцевидно-ланцетными вверху стоячими долями; вѣнчикъ колокольчатый, 5-тилопастный, рѣсничатый по краямъ. Тычинокъ—5. Завязь нижняя, 3-хгнѣзная, съ столбикомъ, заканчивающаяся трехраздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ — коробочка, покрытая жесткими волосами, повислая, раскрывающаяся при основаніи отверстіями. Растетъ между кустарниками и въ рощахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. (Рис. 120.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Колокольчикъ крапивolistный прежде употреблялся въ медицинѣ отъ воспаленія горла, теперь совсѣмъ оставленъ. Корни его могутъ идти въ салатъ, а молодые листья для приготовленія щей.

Колокольчикъ круглолистный (*Campanula rotundifolia* L.). Горлячки (Арх.), Ломотная трава (Влад.); Зарница (Ворон.), Полевые черевички (Могил.), Боровая звонка (Минск.), Блохникъ (Олон.), Збаночекъ (Волын.). Колокольчикъ круглолистный представляетъ многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «ко-

колокольчиковыхъ» (*Campanulaceae* Juss.), весьма обыкновенное въ Европѣ и въ Россіи. выш. 3—6 вершковъ. Тонкое ползучее вѣтвистое корневище образуетъ дерновники. Прикорневые листья длинно-черенковые, округло-сердцевидные, крупно-зубчатые; стеблевые-же ланцетовидные, цѣльнокрайніе. Стебель восходящій, большей частью развѣтвленный, съ небольшимъ числомъ поникшихъ лазуревыхъ цвѣтковъ, расположенныхъ метельчато. Чашечка 5-тираздѣльная, съ линейно-шиловидными долями. Вѣничекъ колокольчатый, 5-тилопастный; тычинокъ 5; завязь нижняя, 3-хгнѣздная; столбикъ нитевидный, съ 3-храздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ—повислая коробочка, раскрывающаяся при основаніи отверстіями. Растетъ на лугахъ, поляхъ, около дорогъ и въ рощахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ.

Колокольчикъ полевой, см. Колокольчикъ сборный (*Campanula glomerata* L.).

Колокольчикъ лѣсной см. Колокольчикъ, сборный (*Campanula glomerata* L.).

Колокольчикъ олений, см. Колокольчикъ сборный (*Campanula glomerata* L.).

Колокольчикъ персиколистный (*Campanula persicifolia* L.). Грабильникъ (Вор.), Звончекъ лѣсовой, Звончики (Малор.), Звонка. Дзвонецъ (Зап. Росс.), Збаночки, Дзвиночки (Подол.), Синій звѣробой мужескій (Арх.), Колоколець (Ниж.), Колокольчики (повсюду), Котелочки (Вятск.), Колинучки (Курск.), Пискунь (Олон.), Цвѣтокъ-пирожки (Тамб.) Бюлина (Моск.), Вубны (Мог.), Кутазъ (Нижег.), Цындамъ (Гродн.), Подсолнечникъ синій, Дрема (Костр.), Чеботки большіе (Кіев.). Персиколистный колокольчикъ есть многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «колокольчиковыхъ» (*Campanulaceae* Juss.), распространенное въ сѣверной и средней Европѣ и почти во всей Россіи, выш. 7 в.—1½ арш. Стебель восходящій, съ спирально-расположенными блестящими листьями, по краямъ съ рѣдкими и мелкими шиловидными зазубринами, нижніе листья ланцетные или обратно яйцевидные, верхніе—линейные. Широко-колокольчатые, крупные, лазуревые, рѣдко бѣлые, цвѣты собраны въ небольшомъ числѣ (отъ 2 до 6) кистью. Чашечка—5-тираздѣльная, съ ланцетными долями. Вѣничекъ—широко-колокольчатый 5-тилопастный. Тычинокъ 5; завязь нижняя, 3-хгнѣздная; столбикъ нитевидный, съ 3-храздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ—вверхстоячая, усаженная бѣлыми волосками, коробочка, открывающаяся отверстіями. Растетъ на лугахъ и въ лѣсахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ.

Колокольчикъ повилочный, см. Вьюнокъ полевой (*Convolvulus arvensis* L.).

Колокольчикъ полевой, см. Колокольчикъ сборный (*Campanula glomerata* L.).

Колокольчикъ раскидистый, или развѣсистый (*Campanula patula* L.). Горлачки (Могил.), Звончекъ (Мог.), Звонецъ болотный (Черн.), Звоночки (Вят.), Дзвонки (Гродн.), Котельки (Вят.), Котелки (Даль), Колокольчики полевые (въ б. ч. Россіи),

Пичужинца, Синелька (Вят.), Дрема (Смол.), Ключики (Вил.), Мыло дикое (Нижег.), Чахотышница, Степелынь (Олон.). Двухлѣтнее травянистое растение изъ семейства «колокольчиковыхъ» (*Campanulaceae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и въ Россіи. Стебель примостойчій, вѣтвистый, выш. 7—11 вершковъ. Листья спирально-расположенные, горodчатые, нижніе—продолговато-обратно-яйцевидные, суженные въ черешокъ, остальные—узко-ланцетные. Лилые цвѣтки на длинныхъ цвѣтоножкахъ расположены раскидистой метелкой; чашечка 5-тираздѣльная, съ шиловидно-ланцетными долями; вѣнчикъ воронковидный, раздѣленный до середины на 5 широкихъ лопастей. Тычинокъ 5; завязь нижняя. 3-хгнѣздная, съ нитевиднымъ столбикомъ, оканчивающимся 3-храздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ—3-хгнѣздная примостоячая коробочка, раскрывающаяся отверстіями при верхушкѣ или около середины. Растетъ на лугахъ, между кустарниками на опушкѣ лѣсовъ. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта.

МЕДИЦИНОСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Корень растения употребляется въ Россіи, какъ народное средство отъ бѣшенства собаки.

Колокольчикъ сборный, или Приточная трава (*Campanula glomerata* L.). Фармацевтическое названіе: *Cervicaria minor* (Pol). Глазовая (Олон.), Адамова голова (Влад.), Иванова голова (Могил.), Ивановы цвѣты (Мог.), Звонокъ (Могил.), Звѣробой синий (Волог.), Колокольчикъ полевой, луговой, боровой, лѣсной, олений, Кокунечникъ, Приточникъ, Подѣлѣсъ (Ряз.), Подѣлешникъ (Орл.), Сказитникъ (Малор.), Скучникъ (Черн.), Скучень (Малор.), Страхополохъ (Волын.), Мышиная трава (Твер.), Христовъ посохъ (Волог.), Шишеборникъ (Черм.), Весчанницъ (Мог.), Виолле (Арх.), Голубянка (Олон.), Ивась да Марья (Новг.), Зубчатка (Нижег.), Плывунъ (Влад.), Дикій рещейникъ (Нижег.), Шалфей полевой (Минск.), Рншточникъ (Могил.), Чирятокъ (Курск.), Куриная слѣпота (Вор.). (Таб. XXI. фиг. 119.)

Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «колокольчиковыхъ» (*Campanulaceae* Juss.), распространенное въ Европѣ и въ Россіи. Стебель выш. 5—10 вершковъ, коротко пушистый или голый. Нижніе листья черешковые, яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, верхніе—сидячіе, широко-ланцетные, обхватывающіе стебель сердцевиднымъ основаниемъ; лазуревые цвѣты собраны на верхушкѣ стебля голькой, а въ углахъ листьевъ пучками; чашечка 5-тираздѣльная, съ ланцетными заостренными долями; вѣнчикъ колокольчатый, 5-тилопастный, слегка-пушистый; тычинокъ 5, съ свободными пыльниками. Завязь нижняя, 3-хгнѣздная; столбикъ съ 3-храздѣльнымъ рыльцемъ не выдается изъ вѣнчика. Плодъ—прямостоячая коробочка, раскрывающаяся отверстіями. Растетъ на лугахъ, холмахъ, степяхъ, между кустарниками. Цвѣтетъ съ юня до сентября.

МЕДИЦИНОСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Колокольчикъ сборный извѣстенъ только какъ народное средство. Все растение употребляется

отъ укушенія бѣшенными животными. Въ Пермской губерніи пьютъ отъ головной боли, въ Воронежской губерніи принимаютъ порошокъ отъ лихорадки, также отъ охриплости въ горлѣ.

Колокольчикъ сибирскій (*Campanula sibirica* L.). Василекъ полевой (Подол.), Вовчукъ (Тавр.), Дикая буковица (Курск.), Жабинъ корень (Екат.), Мясичная трава (Сиб.), Повилика (Хар., Екат.), Синовникъ (Вор.), Сокирка (Екат.), Трехцвѣтка (Уфимск.). Двухлѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «колокольчиковыхъ» (*Campanulaceae* Juss.), распространенное въ сѣверной и средней Европѣ и почти по всей Россіи, въ Крыму и въ Сибири, коротко-шершавое; листья городчатые, нижніе—продолговатые, суженные въ черешокъ, стеблевые—сидячіе, продолговато-ланцетные или линейные. Голубые цвѣты въ метельчатомъ соцвѣтѣ, поникающіе; чашечка 5-тираздѣльная, съ линейно-ланцетными долями; вѣничекъ узко-колокольчатый, 5-тилопастный; тычинокъ 5; завязь нижняя, 3-хгнѣзная, съ нитевиднымъ столбикомъ, оканчивающимся 3-храздѣльнымъ рыльцемъ; плодъ—повислая коробочка, раскрывающаяся при основаніи отверстіями. Растетъ на холмахъ, между кустарниками. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Колокольчикъ сибирскій употребляется въ народной медицинѣ. Въ Подольской губерніи изъ травы колокольчика сибирскаго дѣлаютъ полосканіе отъ зубной боли, а въ Таврической губерніи отваръ его пьютъ отъ венерической болѣзни.

Колокольчикъ съѣдобный, см. Ралунцель (*Campanula Rapunculus* L.).

Колокольчики, см. Колокольчикъ переколистный (*Campanula persicifolia* L.).

Колокольчики, см. Горечавка крупная (*Gentiana pneumonanthe* L.).

Колокольчики, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Колокольчики, см. Василистникъ голубковый (*Thalictrum aquilegifolium* L.).

Колокольчики жовті, см. Наперстнянка крупно-цвѣтная (*Digitalis grandiflora* Lam.).

Колокольчики лѣсные, см. Кудри царскія (*Lilium Martagon* L.).

Колокольчики морскіе, см. Горечавка крупная (*Gentiana pneumonanthe* L.).

Колокольчики повеличные, см. Стѣнница лекарственная (*Parietaria officinalis* L.).

Колокольчики полевые, см. Колокольчикъ развѣсистый, или раскидистый (*Campanula patula* L.).

Колокольчики садовые, см. Голубки обыкновенные (*Aquilegia vulgaris* L.).

Колокольчики синіе, см. Горечавка крупная (*Gentiana pneumonanthe* L.).

Колокольчики синіе, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).

Колопня, см. Конопля посевная или обыкновенная (*Cannabis sativa* L.).

Колорѣчная трава, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).

Колосъ, см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.).

Колосъ благовонный (*Lavandula spica* L.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), произрастающее въ южной Европѣ, покрытое короткими сѣрыми волосками, особенно молодые побѣги. Стебель выш. 7—14 вершковъ, съ супротивными, ланцетными или линейными листьями, снизу железисто-точечными, съ загнутыми внизъ краями. Спектато-фіолетовые цвѣты въ мутовкахъ, собранныхъ верхушечнымъ колосомъ. Различаютъ двѣ разновидности благовоннаго колоса: лаванда настоящая, или благовонный колосъ узколиственный: листья линейные, колосъ прерванный и прицвѣтники яйцевидные, и благовонный колосъ ширколиственный, у котораго листья гораздо шире, соцвѣтіе плотнѣе и прицвѣтники линейно-шиловидные. Обѣ разновидности разводятся для добыванія благовоннаго эфирнаго масла (лучшее масло получается изъ Англіи) и для медицинскихъ цѣлей.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Содержимое цвѣтовъ лаванды имѣетъ легкое возбуждающее свойство. Употребляются цвѣты лавандулы только снаружи и то въ соединеніи съ другими пахучими веществами, какъ-то съ розмариномъ, ромашкою, полынью и шалфеемъ, съ которыми они образуютъ душистые сборы. Изъ цвѣтовъ приготавливаютъ спиртъ лавандулы и масла. Масло благовоннаго колоса употребляется, главнымъ образомъ, въ парфюмерныхъ издѣліяхъ и служитъ для приготовления одеколона.

Колосница, см. Подорожникъ песчаный (*Plantago arenaria* W. K.).

Колосецъ, см. Вѣйникъ наземный (*Calamagrostis epigeios* Roth.)

Колоска, см. Цетинникъ зеленый (*Setaria viridis* Beauv.).

Колосникъ, см. Колоснякъ песчаный (*Elymus arenarius* L.).

Колосникъ болотный, см. Чистецъ болотный (*Stachys palustris* L.).

Колосница, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).

Колосница лѣсная, см. Чистецъ лѣсной (*Stachys silvatica* L.).

Колосница лѣтная, см. Пикульникъ длинноцвѣтный (*Galeopsis Ladanum* L.).

Колоснякъ, см. Колоснякъ песчаный (*Elymus arenarius* L.).

Колоснякъ песчаный (*Elymus arenarius* L.). Волоснецъ, Песчаный камышъ, Колосникъ. Колоснякъ. Молотышка, Овесъ, Овесецъ несочный, Песочный овесъ, Осокъ песочный, Песчанникъ, Песчанецъ, Дикая рожь, Ячмень дикій. Песчаный колоснякъ есть многолѣтняя трава изъ семейства «злаковъ» (*Gramineae* Juss.), распространенная въ сѣв. и средн. Европѣ и почти во всей Россіи, выш. 1½—2½ арш., съ длинными, ползучими побѣгами, плоскими, часто свертывающимися, жесткими, сизо-зелеными

листьями и прямостоящимъ длиннымъ (дл. до 1-го фута) колосомъ. Колоски сидятъ на выступахъ стержня по 2—3 вмѣстѣ и содержать, болышею частью, по 3 цвѣтка. Двѣ нижнія чешуи колоска — створки, узко-ланцетныя, одинаковой длины съ колоскомъ; пленки, которыми снабжены каждый изъ цвѣтковъ, или, иначе, цвѣточныя чешуи, ланцетныя, заостренныя, безъ остей. Околоцвѣтникъ замѣненъ 2—3 маленькими нѣжными пленочками. Тычинокъ 3. Завязь одногнѣздная, односѣмянная, съ 2-мя столбиками. Плодъ—зерновка. Произрастаетъ на всѣхъ песчаныхъ морскихъ берегахъ и пригоденъ для укрѣпленія сыпучихъ песковъ. Цвѣтетъ лѣтомъ.

Колосовая трава, см. Трясушка средняя (*Briza media* L.).

Колосовая трава, см. Стальникъ пахучій (*Ononis hircina* Jacq.).

Колосовикъ

Колосовикъ черный } см. Березовый гриб (*Boletus scaber* Bull.).

Колосокъ, см. Лисохвостъ или Батлачикъ луговой (*Alopecurus pratensis* L.).

Колосокъ пахучій (*Anthoxanthum odoratum* L.). Дубровка пахучая, Душица (Херс.), Желтостебельникъ, Желтохвостъ, Желтоцвѣтъ, Желтоцвѣтникъ, Благовонная трава, Душистая трава, Томка, Ожига (Олон.), Чудотворка (Пет.), Метельникъ. Это—многолѣтнее травянистое, образующее дерновинки, растение изъ семейства «злаковъ» (*Gramineae* Juss.), распространенное во всей Европѣ и почти во всей Россіи. Стебли тонкіе, выш. 7—11 верш., съ короткими линейными листьями, покрытыми мягкими волосками. Соцвѣтіе—колосовидная метелка (султанъ), желтовато-зеленая, сжатая, но во время цвѣтенія съ оттопыренными вѣтвями. Колоски содержатъ одинъ плодущій цвѣтокъ и два недоразвившихся безплодныхъ, состоящихъ только изъ наружныхъ пленокъ, снабженныхъ остью. Тычинокъ 3; завязь одногнѣздная, односѣмянная, болышею частью съ 2-мя столбиками. Плодъ—зерновка. Растетъ на лугахъ и между кустарниками. Цвѣтетъ въ маѣ и юнѣ. Отличается душистымъ, пріятнымъ запахомъ, сообщающимся и сѣну, принадлежитъ къ числу хорошихъ кормовыхъ травъ.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Колосокъ пахучій употребляется въ народной медицинѣ. Корень высушиваютъ, толкутъ и прибавляютъ къ нюхательному порошку. Въ Калужской губерніи употребляется отваръ колоска отъ удущья и грудныхъ болѣзней.

Колосаянка, см. Щетинникъ зеленый (*Setaria viridis* Beauv.).

Колотовички, см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).

Колпачки, см. Борецъ синій (*Aconitum Napellus* L.).

Колтунъ, см. Щитникъ большой (*Aspidium Filix femina* Sw.).

Колтунникъ, см. Стародубка (*Gentiana Amarella* L.).

Колтунникъ, см. Плаунъ булавистый (*Lycopodium clavatum* L.).

Колтушки, см. Купальница европейская (*Trollius europaeus* L.).

Колудунникъ, см. Плаунъ булавистый (*Lycopodium clavatum* L.).

Колудунница

Колудунова трава } см. Колдунъ-трава (*Circaea lutetiana* L.).

- Колудуха**, см. Колдунъ-трава (*Circaea lutetiana* L.).
- Колузъ**, см. Арнаутка (*Triticum durum* Desf.).
- Колунъ**, см. Чертополохъ ланцетолистный (*Cirsium lanceolatum* Scop.).
- Колунъ**, см. Чертополохъ полевой (*Cirsium arvense* Scop.).
- Колуферъ**, см. Калуферъ (*Tanacetum Balsamita* L.).
- Колуха**, см. Герань болотная (*Geranium palustre* L.).
- Колчакъ**, см. Колчакъ желтый (*Hydnum repandum* L.).
- Колчакъ желтый** (*Hydnum repandum* L.). Колчакъ. Грибъ изъ семейства «шляпныхъ грибовъ» или «гименомицетовъ» (*Hymenomycetes*). Нижняя сторона шляпки усажена длинными и тонкими шипами, на поверхности которыхъ образуются споры (органы размножения). Шляпка гриба сверху мясочераснаго или желтоватаго цвѣта, голая. Растетъ въ лиственныхъ и хвойныхъ лѣсахъ. Можетъ употребляться въ пищу. (Таб. XXI, фиг. 117.)
- Колчанникъ**, см. Вьюнокъ полевой (*Convolvulus sepium* L.).
- Кольза**, см. Сурѣпица (*Brassica Rapa* L.).
- Кольникъ**, см. Кольникъ колосистый (*Phyteuma spicatum* L.).
- Кольникъ**, см. Кольникъ круглый (*Phyteuma orbiculare* L.).
- Кольникъ колосистый** (*Phyteuma spicatum* L.). Фармацевтическое названіе: *Rapunculus*. Кольникъ, Рапунцель, Растрогъ. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «колокольчиковыхъ» (*Campanulaceae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ и въ западной Россіи. Стебель выш. 7 верш.—1½ арш., прямостоящій, съ очередными листьями, изъ которыхъ нижніе длинно-черешковые, сердцевидно-яйцевидные, по краямъ двугородчатые, верхніе—сидячіе, узкіе, ланцетные. Желтовато-бѣлые цвѣты расположены продолговатымъ, позднѣ цилиндрическимъ колосомъ, достигающимъ до 1 верш. дл. Чашечка глубоко-пятираздѣльная; вѣнчикъ правильный, глубоко-пятираздѣльный, съ линейными долями; тычинокъ 5, съ свободными пыльниками. Завязь нижняя, 2-хгнѣздная, съ нитевиднымъ столбикомъ, оканчивающимся 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ—коробочка, раскрывающаяся по сторонамъ отверстіями. Растетъ на лѣсистыхъ лугахъ. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта. (Рис. 121.)
- Кольникъ круглый** (*Phyteuma orbiculare* L.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «колокольчиковыхъ» (*Campanulaceae* Juss.), распространенное въ средней Европѣ и въ западной Россіи. Корневище ползучее, толстое, съ простымъ стеблемъ, выш. 3½—11 вершковъ, несущее на верхушкѣ одиночную головку. Листья очередные, по краямъ городчатые, нижніе черешковые, яйцевидно-ланцетные; верхніе сидячіе, линейные. Цвѣты синіе; чашечка 5-тираздѣльная, вѣнчикъ глубоко-пятираздѣльный, съ линейными долями; тычинокъ 5, съ расширенными при основаніи нитями и свободными пыльниками. Завязь нижняя, 3-хгнѣздная; столбикъ съ 2-раздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ—коробочка, раскрывающаяся по сторонамъ отверстіями. Растетъ на лѣсистыхъ лугахъ. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта.
- Кольраби** (*Brassica oleracea gongylodes* L.). Кольраби сверхъ

земли. Одна изъ разновидностей капусты огородной, описаніе см. выше: капуста огородная (*Brassica oleracea* L.), отличающаяся клубневидно-утолщеннымъ стеблемъ. Разводится въ огородахъ и употребляется въ пищу. (Рис. 122.)

Колъраби сверхъ земли, см. Колъраби (*Brassica oleracea gongylodes* L.).

Колюка, см. Колючникъ обыкновенный (*Carlina vulgaris* L.).

Колюка, см. Колючникъ безстебельный (*Carlina subacaulis* Dr.).

Колюка, см. Девясилъ подсолнечный (*Inula Helenium* L.).

Колюка, см. Зольникъ калийный (*Salsola Kali* L.).

Колюки } см. Дурманъ колючій (*Datura Stramonium* L.).

Колюки-яблоки }

Колютикъ, см. Чертополохъ ланцетолистный (*Cirsium lanceolatum* Scop.).

Колютикъ, см. Чистецъ болотный (*Stachys palustris* L.).

Колючиха, см. Дурнишникъ колючій (*Xanthium spinosum* L.).

Колючка, см. Реяшпокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).

Колючка, см. Огуречная трава (*Borrago officinalis* L.).

Колючка, см. Чертополохъ ланцетолистный (*Cirsium lanceolatum* Scop.).

Колючка, см. Сиякъ обыкновенный (*Echium vulgare* L.).

Колючка, см. Синеголовникъ равнинный (*Echium campestre* L.).

Колючка, см. Синеголовникъ плосколистный (*Eryngium planum* L.).

Колючка, см. Зольникъ калийный (*Salsola Kali* L.).

Колючка, см. Гулявникъ лекарственный (*Sisymbrium officinale* L.).

Колючка, см. Дурнишникъ колючій (*Xanthium spinosum* L.).

Колючка, см. Дурнишникъ обыкновенный (*Xanthium Strumarium* L.).

Колючка безстебельная, см. Колючникъ безстебельный (*Carlina subacaulis* Dc.).

Колючка синяя, см. Синеголовникъ плосколистный (*Eryngium planum* L.).

Колючки, см. Чертополохъ полевой (*Cirsium arvense* Scop.).

Колючки, см. Дурнишникъ колючій (*Xanthium spinosum* L.).

Колючка Марьины, см. Остро-пестрая трава (*Silybum Marianum* Gärtn.).

Колючки синія, см. Синеголовникъ плосколистный (*Eryngium planum* L.).

Колючникъ, см. Остро-пестрая трава (*Silybum Marianum* Gärtn.).

Колючникъ, см. Правилать водяной (*Geum rivale* L.).

Колючникъ, см. Колючникъ безстебельный (*Carlina acaulis* L.).

Колючникъ, см. Колючникъ обыкновенный (*Carlina vulgaris* L.).

Колючникъ, см. Чертополохъ пониклый (*Carduus nutans* L.).

Колючникъ безстебельный (*Carlina subacaulis* Dc., *acaulis* L.).

фармацевтическое названіе: *Carolina* s. *Cardopatia* s. *Chamaeleon album*. Безстебельный колючникъ имѣетъ слѣдующія мѣстныя

названія: Колочка безстебельная, Калюка, Колочникъ, Свиной корень, Пуховникъ, Перховникъ, Рѣпка, Слеза трава, Волчье сѣно, Крючечникъ. (Таб. XXI, фиг. 120.) Безстебельный колючникъ есть многолѣтнее колючее растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (Compositae Adans.), распространенное въ средней Европѣ, встрѣчающееся въ Привислянскомъ краѣ и прилегающихъ къ нему губерніяхъ. Стебель сильно укороченный; длинныя, глубоко-перисто-раздѣльные, колючіе листья расположены у самой земли розеткой, въ серединѣ которой сидитъ одиночная корзинка съ блюдцеобразной оберткой; наружныя листочки обертки листоватыя, средніе—жесткіе, гребенчато-колючіе, внутреннія—при основаніи линейныя, спереди расширенныя и заостренныя, лучеобразно-расходящіяся, бѣлыя, рѣже розовыя, вдвое длиннѣе обертки; въ солнечныя дни они расправлены горизонтально, въ сырую-же погоду смыкаются; цвѣтоложе плоское, покрытое щетинками, сросшимися между собою при основаніи пучками: цвѣты правильныя, трубчатые, обоеполовыя, образующіе соцвѣтіе—корзинку. Вѣнчикъ трубчатый; тычинокъ 5; пыльники съ рѣсничатыми придатками; столбикъ 2-раздѣльный, при основаніи рылецъ узловато-утолщенъ и снабженъ въ этомъ мѣстѣ кольцомъ волосковъ; завязь нижняя, одноплодная. Плодъ—сѣмянка съ перистымъ хохолкомъ. Растетъ на холмахъ и сухихъ лугахъ. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ прежнее время колючникъ безстебельный употреблялся врачами, какъ потогонное и мочегонное средство, при тифозныхъ горячкахъ, теперь онъ вполне оставленъ. Растеніе это очень ядовито для свиней и нѣкоторыхъ животныхъ.

Колючникъ обыкновенный (*Carlina vulgaris* L.). Фармацевтическое названіе обыкновеннаго колючника: *Carlina silvestris*, s. *Pterisantha*. Вогникъ, Огникъ (Бесс.). Девясиль бѣлый, Колока, Колючникъ, Одкосникъ (Малор.), Перекати-поле (Курск.). Приточная трава (Влад.), Пуховникъ обыкновенный (Мейеръ, Бот. Сл.), Урочникъ (Мог.), Уречная, Чертогонъ (Курск., Ниж.), Полевой будякъ (Нижег.), Дѣдовникъ (Смол.), Чертополохъ (Перм., Гродн.). Двулѣтнее и многолѣтнее колючее растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (Compositae Adans), распространенное почти во всей Европѣ и въ большой части Россіи, вып. 3—11 вершковъ. Стебель прямой, наверху часто вѣтвистый, вмѣстѣ съ нижнею стороною листьевъ пушистый; листья узко-ланцетныя, очень колючіе, нижніе—суженныя въ черешокъ, прочіе сидячіе. Цвѣты трубчатые, обоеполовыя, образуютъ соцвѣтія—полушаровидныя корзинки въ числѣ 2—4, собранныя щиткомъ и снабженныя каждою оберткой; наружныя листочки обертки листоватыя, средніе гребенчато-колючіе, буrowsатыя, съ вѣтвистыми колючками, внутреннія—линейныя, горизонтально отогнутыя, превышающіе корзинку, на краю въ серединѣ рѣсничатыя, соломенно-желтыя. Цвѣтоложе плоское, покрытое шловидко-заостренными щетинками, сросшимися при

основаніи пучками. Тычинокъ 5, спаянныхъ нитями въ трубочку, черезъ которую проходитъ столбикъ съ раздвоеннымъ рыльцемъ, снабженный у основанія кольцомъ волосковъ. Завязь нижняя, одногнѣздная. Плодь—сѣмянка съ перистымъ хохолкомъ. Растетъ на сухихъ мѣстахъ, пустыряхъ, холмахъ и между кустарниками. Цвѣтетъ во 2-ой половинѣ лѣта. (Рис. 124.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Колючникъ обыкновенный употребляется въ народной медицинѣ. Въ Пермской губерніи отваромъ колючника поятъ дѣтей отъ безпокойнаго сна.

Колючье, см. Дурманъ вонючій (*Datura Stramonium* L.).

Колюшка, см. Синеголовникъ плосколистный (*Eryngium planum* L.).

Колюшникъ, см. Исландскій мохъ (*Cetraria islandica* Ach.).

Колюшникъ молодой, см. Медовникъ (*Galeopsis Tetrahit* L.).

Коляндра, см. Кипнецъ огородный (*Coriandrum sativum* L.).

Команица, см. Морошка (*Rubus Chamaemorus* L.).

Команичникъ, см. Кроставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).

Команишникъ, см. Фіалка ночная (*Platanthera bifolia* Rich.).

Комаръ, см. Смолевка повислая (*Silene inflata* L.).

Комарникъ, см. Девясилъ растопыренный (*Inula Conyza* Dc.).

Комелекъ, см. Ярутка полевая (*Thlaspi arvense* L.).

Комишъ, см. Камышъ озерной (*Scirpus lacustris* L.).

Комоница, см. Ледвенецъ рогатый (*Lotus corniculatus* L.).

Комоница, см. Донникъ лекарственный (*Melilotus officinalis* L.).

Комоница, см. Вахта трилистная (*Menyanthes trifoliata* L.).

Комочка, см. Сныль обыкновенный (*Echium vulgare* L.).

Компоштыльонъ полевой, см. Кроставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).

Конвалія, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).

Конвалія, см. Кукушкины слезки (*Orchis maculata* L.).

Конвалія, см. Ночная фіалка (*Platanthera bifolia* Rich.).

Конвалія, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Конвалія луговая, см. Ятрышникъ широколистный (*Orchis latifolia* L.).

Конга, см. Сосна обыкновенная (*Pinus silvestris* L.).

Кондрачики, см. Дубровка (*Veronica Chamaedrys* L.).

Коневникъ, см. Бѣлогловка (*Trifolium montanum* L.).

Коневникъ, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Коневникъ, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Конекровка, см. Вика (*Vicia sativa* L.).

Конетыжникъ, см. Кочедыжникъ обыкновенный (*Aspidium Filix Femina* Sw.).

Конецъ холостой, см. Ледвенецъ рогатый (*Lotus corniculatus* L.).

Конечки, см. Щавель дикий (*Rumex obtusifolius* L.).

Коникъ, см. Васильки рогатые (*Delphinium consolida* L.).

Коника, см. Чернобыльникъ обыкновенный (*Artemisia vulgaris* L.).

- Коница**, см. Истодъ обыкновенный (*Polygala vulgaris* L.).
- Коничина**, см. Бѣлогловка (*Trifolium montanum* L.).
- Кониць**, см. Вахта трилистная (*Menyanthes trifoliata* L.).
- Коничына**, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).
- Коновальчикъ**, см. Бѣлогловка (*Trifolium montanum* L.).
- Коновикъ**, см. Щавель конскій или домашній (*Rumex domesticus* L.).
- Коновникъ**, см. Бѣлогловка (*Trifolium montanum* L.).
- Конопа**, см. Конопля посевная или обыкнов. (*Cannabis sativa* L.).
- Конопель**, см. Трясунка средняя (*Briza media* L.).
- Кономель**, см. Конопля посевная или обыкновенная (*Cannabis sativa* L.).
- Конопель лѣсная**, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).
- Конопелька**, см. Деревей (*Ptar mica cartilaginea* L.).
- Конопелька**, см. Трясунка средняя (*Briza media* L.).
- Конопельки**, см. Кунырь лѣсной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.).
- Конопельки**, см. Конопля посевная (*Cannabis sativa* L.).
- Конопельки жабячи**, см. Медунца (*Spiraea ulmaria* L.).
- Конопельки полевые**, см. Трясунка средн. (*Briza media* L.).
- Конопельникъ**, см. Посконникъ конопляный (*Eupatorium cannabinum* L.).
- Конопельникъ**, см. Медовникъ (*Galeopsis Tetrahit* L.).
- Конопи**, см. Конопля посевная (*Cannabis sativa* L.).
- Конопій**, см. Трясунка средняя (*Briza media* L.).
- Конопли собачьи**, см. Зябра (*Galeopsis versicolor* L.).
- Коноплі дикі**, см. Чистецъ прямой (*Stachis recta* L.).
- Конопля**, см. Конопля посевная или обыкновенная (*Cannabis sativa* L.).
- Конопля водяная**, см. Посконникъ конопляный (*Eupatorium cannabinum* L.).
- Конопля дикая**, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).
- Конопля дикая**, см. Медовникъ (*Galeopsis Tetrahit* L.).
- Конопля индѣйская** (*Arcunum cannabinum* L.). Растеніе родомъ изъ Сѣверной Америки. Крѣпкія волокна его доставляютъ матеріалъ для приготовленія тонкихъ шелковистыхъ сѣтокъ. Отваръ, полученный изъ растенія, краситъ въ коричневыи и черныи цвѣтъ; изъ млечнаго сока, выдѣляемаго растеніемъ, приготавливаютъ родъ каучука, а корень его извѣстенъ, какъ средство противъ водобоязни.
- Конопля посевная, или обыкновенная** (*Cannabis sativa* L.). Конопля, Конопель, Конопъ (Ряз.), Конопи, Кономельки, Конопа (Южн.), Колопия (Бѣлор.), Зеленецъ (Ряз.), Моченецъ (Ряз.), Наболоки (конопля, собранная съ земли граблями), Мужск. особн наз. Замашка (Орл.), Дерганцы (Вор.), Посконъ, Плоскинъ, Плосконъ, Суволока (Тул.), а женск.—Матка, Матерка или Матки, Матерки. (Таб. XXII, фиг. 124.) Посевная конопля есть однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «крапивныхъ» (*Urticaceae* Juss.), родомъ съ Востока, воздѣлываемое во многихъ странахъ Европы, Азии, Африки и въ Россіи. Стебель

выш. сть 11 верш. до 2 арш. Листья супротивные, черешковые пальчато-разбитые, съ узко-ланцетными, по краямъ пило-видно-зуборенными долями. Цвѣты двудомные; тычиночные или мужскіе расположены ввидѣ крупнаго многоцвѣтнаго метельчатаго соцвѣтія, несущаго листья только при основаніи; пестичные—женскіе, собраны небольшими колосьями въ углахъ верхнихъ листьевъ. (Рис. 124.)

Растенія, приносящія тычиночныя цвѣты, называются «посконию» и отличаются отъ плодущихъ экземпляровъ менѣе сильнымъ ростомъ и не столь густой листвою. Цвѣты мелкіе, зеленоватые, околоцвѣтники о 4—5 травянистыхъ листочкахъ; тычинокъ 4—5, прикрѣпленныхъ къ основанію околоцвѣтника и супротивныхъ его частямъ. Завязь верхняя, одногнѣзная, содержащая 1 сѣмяночку и несущая 1—2 рыльца; плодъ—сѣмянка. Цвѣтетъ во 2-й половинѣ лѣта. Разводится ради сѣмянъ, изъ которыхъ выжимаютъ масло, и ради волоконъ стебля (пеньки), которые идутъ на веревки, канаты, холсты и парусину. Въ Остѣ-Индіи конопля называется «индійской» и, представляя особый сортъ обыкновенной конопли, даетъ желтовато-зеленую ароматическую смолу, которая, подобно опиуму, оказываетъ одуряющее дѣйствіе на человѣческій организмъ; подъ названіемъ гашиша, сама смола или верхушки растеній служатъ въ Персіи, Индіи, Турціи и Африкѣ для приготовленія одуряющаго напитка или употребляются въ смѣсѣ съ табакомъ для куренія.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Изъ сѣмянъ конопли добывается конопляное масло, которое употребляется крестьянами въ пищу; кромѣ того, сѣмена толкутъ, смѣшиваютъ съ отварною водою и процеживаютъ, вслѣдствіе чего получается конопляная эмульсія, или конопляное молоко, которое считается хорошимъ средствомъ противъ болѣзней мочевого пузыря; въ день выпиваютъ два и три стакана коноплянаго молока.

Въ ветеринарной практикѣ конопляное молоко дается животнымъ, у которыхъ существуютъ указанія на заболѣванія мочевыхъ путей и органовъ таза; для приготовленія молока берутъ одну часть сѣмянъ на 10 частей воды.

Въ гомеопатіи изъ цвѣтущихъ головокъ конопли готовятъ спиртную настойку, которую и даютъ въ чистомъ видѣ, или-же разведенною. Болѣзни, при которыхъ гомеопатическое леченіе настойкою конопли показано, слѣдующія: судороги, бѣшенство, меланхолія, золотушныя болѣзни глазъ, тошнота, увеличеніе печени, колики, водянка живота, запоры, задержка мочи, болѣзни мочевыхъ путей, каменная болѣзнь, кровавая моча, безплодіе, выкидыши, трипперъ, астма, чахотка и судороги въ икроножныхъ мышцахъ. Чистой настойки даютъ по 1—2 капли, въ свѣжихъ случаяхъ нѣсколько разъ, въ хроническихъ 1—2 раза въ день.

Ветеринары гомеопаты даютъ животнымъ такую-же спиртную настойку, главнымъ образомъ, при заболѣваніи мочевыхъ путей.

Другой видъ конопли, извѣстный подъ именемъ индійской

конопли, идетъ на приготовленіе гашиша, который въ медицинѣ не употребляется, и, кромѣ того, изъ него готовятъ спиртную настойку. Спиртная настойка индѣйской конопли извѣстна, какъ хорошее болеутоляющее средство при болѣзняхъ мочевого пузыря и при нѣкоторыхъ женскихъ болѣзняхъ, въ особенности при болѣзненныхъ менструаціяхъ настойку индѣйской конопли (*Ungtura cannabis indicae*) принимаютъ отъ 2-хъ до 10-ти капель на приемъ 2—3 раза въ день или же ее смѣшиваютъ съ водою горькихъ миндалей; на $\frac{1}{2}$ унца (15 грм.) воды горькихъ миндалей прибавляютъ 1 драхму (4,0 грм.) настойки конопли и такую смѣсь принимаютъ по 10-ти капель 3—4 раза въ день.

Конопля турецкая, см. Клещевина обыкновенная (*Ricinus communis* L.).

Коноплянка, см. Череда трехраздѣльная (*Bidens tripartita* L.).

Коноплянка озерная, см. Плакунъ-трава (*Lythrum Salicaria* L.).

Конопляникъ, см. Погребенокъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista Galli* L.).

Конопляникъ, см. Звѣздчатка большая (*Stellaria Holostea* L.).

Конопъ, см. Конопля посевная (*Cannabis sativa* L.).

Конотопъ, см. Гречиха птичья (*Polygonum aviculare* L.).

Конотопецъ, см. Зубровка (*Veronica Chamaedrys* L.).

Конотопци, см. Цминъ (*Helichrisum arenarium* DC.).

Конская грива, см. Покосникъ конопляный (*Eupatorium cannabinum* L.).

Конская грива, см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.).

Конская трава, см. Бѣлогловка (*Trifolium montanum* L.).

Конское сѣмя, см. Укропъ конскій (*Oenanthe Phellandrium* Lam.).

Конычина, см. Бѣлогловка (*Trifolium montanum* L.).

Коньба, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).

Конь-трава, см. Стародубка (*Gentiana Amorella* L.).

Конюшина, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Конюшки, см. Клеверъ напennyй, или ромашки (*Trifolium arvense* L.).

Конякъ, см. Щавель дикий (*Rumex obtusifolius* L.).

Коняковка, см. Вика (*Vicia sativa* L.).

Конятникъ, см. Щавель дикий (*Rumex obtusifolius* L.).

Копеечная трава, см. Луговой чай (*Lysimachia Nummularia* L.).

Копеечный цвѣтъ, см. Лютикъ едкій (*Ranunculus acer* L.).

Копеешникъ, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).

Копеешникъ, см. Просвирикъ сѣверный (*Malva borealis* Wallen.).

Копеешникъ, см. Эпарсестъ кормовой (*Onobrychis sativa* Lam.).

Копеешникъ, см. Погребенокъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista Galli* L.).

Копеешникъ гребенчатый, см. Эпарсестъ кормовой (*Onobrychis sativa* Lam.).

Коперь, см. Укропъ обыкновенный (*Anethum graveolens* L.).

Коперь, см. Гладышъ широколистный (*Laserpitium latifolium* L.).

Коперъ дикій, см. Лазурникъ трехлопастный (*Siler trilobium* Scop.).

Копеть, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Копитецъ } см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Копитки }

Копитникъ } см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Копитнякъ }

Копитці }

Копиоръ, см. Укропъ обыкновенный (*Anethum graveolens* L.).

Копитень конскій, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Копорка, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Копръ, см. Укропъ обыкновенный (*Anethum graveolens* L.).

Копръ свинной, см. Морковникъ луговой (*Silvaus pratensis* Bess.).

Копровникъ лѣсовой, см. Валериана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Коптикъ, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Копуцины, см. Пастурица (*Tropaeolum majus* L.).

Копылъ-трава, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Копыта лошадиныя, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Копытень, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.). Фармацевтиче-

ское названіе копытня: *Asarum*, s. *Vulgago*, s. *Nardus rusticanus*. Влякотникъ (Курск.), Винный корень (Вятск.), Водолей (Двиг.), Водоленъ сухой, Волосатикъ (Влад.), Волоснякъ, Вороній глазъ, Грыжникъ, Заячій корень, Зимнякъ (Костр.), Карачникъ (Вор., Дон. обл.), Копеть, Копытень (Вел. Росс.), Копитень конскій (Малор.), Копитки, Копытцы, Копытецъ, Копитці, Коптики (Малор.), Копытникъ, Копитникъ, Копитнякъ (Малор.), Бѣлокопытникъ (Яросл.), Копыта лошадиныя (Кал.), Коса трава, Ладанъ земляной (Вят.), Ладанка (Вол. Пот.), Лихорадочная трава (Влад.), Лютикъ черныи (Вятск.), Молодая трава (Никольскъ Волог. губ.), Недужная (Костр.), Облапа, Облапа воинная, Охватка, Охватка благовоинная простая, Перець дикій, Перешникъ, Плющъ поземный, Подлѣсникъ (Вел. Росс.), Подлистникъ (Малор.), Подлѣшникъ, Подалешникъ, Подалешникъ лѣсной, Подолѣшникъ (Малор.), Подорѣшная трава, Подорѣшникъ, Подорѣшникъ (Малор.). Ягодный пролѣсникъ, Присовочная (Костр.), Расходникъ (Гродн.), Рвотный корень, Сердечная (Вятск. Сиб.), Скипидарная трава, Скипидарникъ, Тайниинная трава, Увѣчная трава (Тамб.), Чилбуха (Каз.), Человѣче ухо, Болотникъ (Нижег.), Бѣлоусъ (Тамб.), Варагуша, Деножная трава, Куриная лапа (Вор.), Черезгривница (Смол.). (Таб. XXII, фиг. 122.) Копытень есть многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «кпрказоновыхъ» (*Aristolochiaceae* Juss.), произрастающее въ средней и западной Россіи, и на Уралѣ, съ ползучимъ корневищемъ. Стебель короткій, обыкновенно съ двумя длинно-черешковыми почковидными, сверху блестящими листьями, между которыми

на короткой ножкѣ выступаетъ одиночный цвѣтокъ. Околоцвѣтникъ колокольчатый, 3-храздѣльный, снаружи буроватый, внутри красно-бурый. Тычинокъ 6, сросшихся со столбикомъ; завязь нижняя, 6-тигыздная; столбикъ короткий, съ лучистымъ 6-лопастнымъ рыльцемъ; плодъ—коробочка, раскрывающаяся щелями вдоль перегородокъ. Растетъ въ лѣсахъ. Цвѣтетъ весною.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Корень употреблялся прежде въ медицинѣ; теперь употребленіе его осталось, какъ народнаго средства. Корень копытени вырывается осенью (въ августѣ) и высушивается: кромѣ корней, въ это-же время собираютъ и листья. Какъ у корней, такъ и у листьевъ довольно острый запахъ, напоминающій камфору и валериану, и горкій, непріятный вкусъ; современемъ запахъ и вкусъ ослабѣваютъ, поэтому растение собираютъ каждый годъ свѣжее. Какъ корень, такъ и листья, принятые внутрь, обладаютъ свойствомъ вызывать рвоту, поэтому въ прежнее время ихъ и давали вмѣсто ипекакуаны. Но, кромѣ рвоты, они вызываютъ еще поносъ и раздражаютъ кишечныя и желудочныя стѣнки, потому употребленіе ихъ, какъ рвотнаго, оставлено совсѣмъ. Изъ корней готовятъ спиртную настойку, которую прибавляютъ въ водку людямъ, злоупотребляющимъ спиртными напитками; предполагается, что отъ этого у него является отвращеніе къ спиртнымъ напиткамъ.

Въ Малороссіи отваренный корень прикладываютъ на голову отъ головной боли, въ отварѣ корня купаютъ дѣтей отъ младенческой. Изъ мелкоистолченного корня готовятъ нюхательный порошокъ. (Въ него прибавляютъ майорана и цвѣтовъ лавандулы: на 3 части копытени по 1 части майорана и лавандулы.) Порошокъ нюхаютъ отъ насморка, головной боли, слѣпоты, глухоты и отъ паралича языка. Внутрь корень принимаютъ ввидѣ отвара. На отварѣ берется на фунтъ воды 2 драхмы (8 грм.) корня; отваръ принимаютъ черезъ 2 часа по столовой ложкѣ, такой отваръ слабятъ и усиливаетъ отдѣленіе мочи.

Въ ветеринарной народной медицинѣ отваръ корня дается вмѣсто слабительнаго и для изгнанія глистовъ. Также для этой цѣли растираютъ корень въ порошокъ и прибавляютъ его къ корму, или-же листья сушеннаго копытени варятъ въavorоткѣ, которую приливаютъ въ поило.

Въ гомеопатіи копытень даютъ отъ сильнаго нервнаго возбужденія, отъ судорогъ, отъ мигрени, перемежающейся лихорадки, отъ болей въ животѣ съ рвотою. На пріемъ даютъ 1 каплю чистой настойки или столько-же 1—2 разведенія, отъ одного до нѣсколькихъ разъ въ день.

Копытникъ, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).

Копытникъ, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Копытникъ, см. Гравилатъ водяной (*Geum rivale* L.).

Копыто лошадиное трава, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).

Копыто львиное, см. Манжетка обыкновен. (*Alchemilla vulgaris* L.).

- Копытце, см. Чистецъ лѣсной (*Stachys silvatica* L.).
- Копытці конскі, см. Фалка душистая (*Viola odorata* L.).
- Копытцы, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).
- Копье никашкое, см. Гераць луговая (*Geranium pratense* L.).
- Копье царское, см. Асфодель вѣтвистый (*Asphodelus ramosus* L.).
- Копьецо, см. Тростникъ обыкновенный (*Arundo Phragmites* L.).
- Копьецо лѣсное, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).
- Копьечникъ, см. Порремокъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista Galli* L.).
- Копьяшникъ, см. Тростникъ обыкновенный (*Arundo Phragmites* L.).
- Корбачъ, см. Махорка (*Nicotiana rustica* L.).
- Корганъ, см. Фалка опушенная (*Viola hirta* L.).
- Кордовникъ, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).
- Корень алтейный, см. Алтей лекарственный (*Althaea officinalis* L.).
- Корень алтейный, см. Калганъ (*Alpina Galanga* Sw.).
- Корень бобовый, см. Холатка плотная (*Corydalis solida* Sm.).
- Корень бѣлый, см. Гладышъ широколистный (*Laserpitium latifolium* L.).
- Корень винный, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).
- Корень винный, см. Горлецъ, раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).
- Корень водяной, см. Бѣлокрыльникъ болотный (*Calla palustris* L.).
- Корень геоздичный, см. Гравилатъ городской (*Geum urbanum* L.).
- Корень глистный, см. Ясенецъ бѣлый (*Dictamnus Fraxinella* Pers.).
- Корень громовый, см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.).
- Корень девясильный, см. Девясилъ подсолнечный (*Inula Helenium* L.).
- Корень дубильный, см. Кермекъ широколистный (*Statice latifolium* L.).
- Корень дубровный, см. Узикъ (*Potentilla Tormentilla* L.).
- Корень двѣй, см. Перестуйъ обыкновенный (*Tamus communis* L.).
- Корень жабинъ, см. Колокольчикъ сибирскій (*Campanula sibirica* L.).
- Корень жагуничный, см. Горлецъ, раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).
- Корень желтый, см. Кермекъ татарскій (*Statice tatarica* L.).
- Корень животный, см. Горлецъ, раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).
- Корень жирный, см. Окопникъ лекарственный (*Symphytum officinale* L.).
- Корень заячій, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Корень зміиный } см. Ластовникъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* Moench.).

Корень зміиный, см. Гравилатъ водяной (*Geum rivale* L.).

Корень зміиный, см. Горлець, раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).

Корень зобный, см. Норичникъ узловат. (*Scrophularia nodosa* L.).

Корень зобный, см. Норичникъ водян. (*Scrophularia aquatica* L.).

Корень золотой, см. Кудри царскія (*Lilium Martagon* L.).

Корень зубной, см. Бедренець обыкновенный (*Pimpinella saxifraga* L.).

Корень канцелярскій, см. Дивала однолѣтняя (*Scleranthus annuus* L.).

Корень козельцовый, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Корень кошачій, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Коренья гнилыя, см. Собачій зубъ (*Erythronium Dens Canis* L.).

Коренья красныя, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.).

Корешки, см. Кукушкины слезы (*Orehis maculata* L.).

Корешникъ, см. Пестель обыкновенный (*Polygala vulgaris* L.).

Кориандрово сѣмя, см. Кипищень огородный (*Cariantrum sativum* L.).

Корица, см. Корица бѣлая (*Canella alba* Murr.).

Корица бѣлая (*Canella alba* Murr.). Ложная Винтерова кора.

Корица. Дерево родомъ изъ Остѣ-Индіи и Кохинхины. Смола, выдѣляемая имъ, «такамахакъ», употребляется туземцами, какъ лечебное средство: изъ сѣмянъ выжимають жирное масло, древесина идетъ на топливо.

Корица настоящая (*Cinnamomum seylonicum* Nees.). Корица цейлонская. Коричникъ. Настоящая корица представляетъ изъ себя высокое дерево, произрастающее въ Остѣ-Индіи, преимущественно на островѣ Цейлонѣ. Очищенный отъ наружнаго слоя коры внутренний слой ея доставляетъ такъ называемую «корицу». Лучшій слой ея получается съ молодыхъ вѣтвей дерева. Корица, какъ пряность, употребляется въ пищу въ видѣ приправы, а также имѣетъ примѣненіе и въ парфюмерномъ производствѣ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ Съ древнихъ временъ корицой настойку врачами приписывалось свойство вызывать родовыя потуги, потому она имѣлась въ рукахъ у каждой акушерки; кромѣ того, корицую настойку даютъ отъ поноса и отъ маточныхъ кровотеченій. Настойка готовится изъ 1-ой части корицы на 5 частей виннаго спирта и принимается по 20—40 капель 3 раза въ день.

Порошокъ корицы употребляется, въ аптекахъ для обволакиванія пилюль, онъ-же входитъ въ составъ ароматическаго сбора (5 ч. корицы, 3 ч. кардамона. 2 ч. имбиря). Ароматическій

сборъ принимается на кончикъ ложки при слабомъ пищевареніи и плохомъ аппетитѣ.

Въ ветеринарной практикѣ корица дается животнымъ при слабости родовыхъ потугъ, лошадямъ и коровамъ на приемъ $\frac{1}{2}$ унца (15 гр.), овцамъ—1 драхму (4 грм.), собакамъ— $\frac{1}{2}$ —1 драхмъ (2—4 грм.). Изъ этого количества корицы дѣлають отваръ, который и вливають въ поило.

Корица цейлонская, см. Корица настоящая (*Cinnamomum ceylonicum* Neer.).

Корички, см. Язвенникъ обыкновенный (*Anthyllis Vulneraria* L.).

Коричникъ, см. Корица настоящая (*Cinnamomum ceylonicum* Nees.).

Коровай, см. Пижма, или дикая рябинка (*Tanacetum vulgare* L.).

Коровецъ, см. Валериана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Коровій глазъ, см. Бересклетъ бородавчатый (*Evonymus verrucosus* L.).

Коровій цвѣтъ, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).

Коровья трава, см. Рыжикъ полевной (*Camelina sativa* Crantz.).

Коровья трава, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).

Коровья трава, см. Купальница европейская (*Trollius europaeus* L.).

Короватикъ, см. Масленникъ (*Boletus luteus* L.).

Коровка, см. Дягиль лекарственный (*Angelica Archangelica* L.).

Коровка, см. Дягиль лѣсной (*Angelica silvestris* L.).

Коровка, см. Бѣлый грибъ (*Boletus edulis* Bull.).

Коровка, см. Борщевикъ сибирскій (*Heracleum sibiricum* L.).

Коровки } см. Дягиль лѣсной (*Angelica silvestris* L.).

Коровникъ } см. Дягиль лѣсной (*Angelica silvestris* L.).

Коровникъ, см. Дягиль лекарств. (*Angelica Archangelica* L.).

Коровникъ, см. Недотрога желтая (*Impatiens noli me tangere* L.).

Коровникъ, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

Коровникъ, см. Коровякъ черный (*Verbascum nigrum* L.).

Коровникъ, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).

Коровошникъ, см. Недотрога желтая (*Impatiens noli me tangere* L.).

Коровошникъ, см. Дягиль лѣсной (*Angelica silvestris* L.).

Коровякъ, см. Белладонна (*Atropa Belladonna* L.).

Коровякъ, см. Бѣлый грибъ (*Boletus edulis* Bull.).

Коровякъ, см. Девясилъ подсолнечный (*Inula Helentium* L.).

Коровякъ, см. Коровякъ бѣлоцвѣтный (*Verbascum Lychnitis* L.).

Коровякъ бѣлоцвѣтный (*Verbascum Lychnitis* L.). Бабки

(Малор.), Вербаска мужская (Сарат.), Дивина (Малор.), Дивъ

(Малор.), Диванка (Ниж.), Заяче ухо (Малор.), Коровякъ, Ко-

ровьякъ (Умань), Коровникъ (Вор.), Коровьяки дробные (Хар.),

Кулинка (Ворон.), Кулиникъ (Тамб.), Матренка (Курск.), Моло-

децъ (Сарат.), Разнобыль (Тамб.), Старица (Уф.), Царская свѣча

(Сарат.), Царскій скипетръ (Тамб.), Фелынь (Черкасс. у. Кіевск.

губ.). Двудѣтнее травянистое растение изъ семейства «норични-

ловыхъ» (*Scrophulariaceae* R. Br.), распространенное въ сред-

ней и южной Европѣ, въ средней и южной Россіи. Стебель съ острыми углами, наверху войлочнo-волосистый; листья очередные, сверху почти голые, снизу бѣловато-войлочные, суженные въ черешокъ, верхніе—почти сидячіе, яйцевидно-ланцетные. Желтоватые или молочно-бѣлые цвѣты въ кистяхъ, собранныхъ узкой пирамидальной метелкой. Чашечка о 5 болѣе или менѣе сростшихся листочковъ; вѣнчикъ колесовидный о 5 не совсѣмъ одинаковыхъ лепесткахъ, изъ которыхъ задніе менѣе крупныя; тычинокъ 4, съ мохнатыми нитями; завязь верхняя, двугнѣздная, съ однимъ столбикомъ, съ булавовиднымъ рыльцемъ. Плодъ—коробочка, вдвое превышающая чашечку. Растетъ на сухихъ лугахъ, холмахъ и около дорогъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. (Рис. 125.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ медицинѣ растение это употреблялось въ прежнее время, теперь оставлено совершенно. Въ народной медицинѣ оно и до настоящаго времени имѣетъ обширное примѣненіе. Чай изъ коровяка въ Московской губерніи употребляется отъ одышки, въ Пермской губерніи—отъ болѣзней матки послѣ родовъ и отъ худобы; порошкомъ изъ листьевъ засыпаютъ порѣзы, изъ сѣмянъ дѣлаютъ мазь, которую кладутъ на застарѣлыя раны, на вереды прикладываютъ свѣжія листья. На Алтаѣ коровякъ принимаютъ отъ головной боли, но такой только, который растетъ далеко отъ рѣки «и не могъ слышать рѣчного шума».

Въ ветеринарной народной медицинѣ отваръ коровяка даютъ лошадямъ отъ оной, а также когда онѣ падаютъ на ноги. Коровамъ тотъ-же отваръ даютъ, если онѣ перестаютъ доиться. Для овецъ коровякъ смѣшиваютъ съ солью и даютъ его отъ простуды и кашля (на Кавказѣ).

Коровякъ черный (*Verbascum nigrum* L.). Фармацевтическое названіе чернаго коровяка: *Verbascum* (*Radix et Flores*). Акулиникъ (Ворон.), Бородавникъ (Бессараб.), Вороневникъ (Курск.), Бурьянъ (Вор.), Буркунъ (Вор.), Быковникъ, Вербаска женская (Сар.), Вербишникъ черный, Влиттеръ (Орл.), Горлач (Малор.), Дивенна, Дивина, Деванна, Дзиванна (Зап. г.), Падма-дзиванна (Могил.), Дѣванная трава, Ерофѣй (Тв.). Желѣзнякъ (Ниж.), Коровникъ (Ворон.), Кошанникъ, Лампадочникъ, Лимонный цвѣтъ (Черниг.), Медвѣжье ухо (Пек.), Молодецъ (Сарат.), Оманъ (Малор.), Опухвая трава (Вятск.), Татарская плоть (Перм.), Прострѣлъ глубокой (Перм.), Повелица (Ист.), Разломъ (Ниж.), Свиной хвостъ (Влад.), Селиванъ, Селифанъ, Силиванъ (Моск.), Царскій скипетръ черный, трава о трехъ цвѣтахъ, Уразная (Тв.), Чистикъ (Мог.). Черный коровякъ представляетъ изъ себя двулѣтнее травянистое растение изъ семейства «поричниковыхъ» (*Scrophulariaceae* R. Br.), распространенное почти во всей Европѣ и въ Россіи, за исключеніемъ крайняго сѣвера. Стебель выш. 11 вершк.—1½ арш. Листья очередные; нижніе—больше, длинно-черешковые, неравногнѣрно-городчатые, темно-зеленые, сверху голые, снизу пушистые; верхніе—почти сидячіе,

маленькіе. заостренныя. Мелкіе желтыя цвѣты сидятъ пучками въ углахъ прицвѣтничковъ. Чашечка 5-тираздѣльная, вѣнчикъ колесовидный, съ короткой трубочкой и 5-ю несовсѣмъ одинаковыми лопастями; тычинокъ 5, неодинаковыхъ, переднія изъ нихъ длиннѣе, нити ихъ пурпурово-мохнатыя; пыльники почковидныя; столбикъ съ булавовиднымъ рыльцемъ. Плодъ—коробочка округло-овальная, немного превышающая чашечку. Растетъ на лугахъ, между кустарниками и въ рощахъ; цвѣтеть длительно. (Рис. 126.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Растеніе употребляется только въ народной медицинѣ и то очень мало. Въ Малороссіи отваромъ чернаго коровяка моются отъ общаго недомоганія, въ Пермской губерніи его пьютъ отъ кашля.

Коровьякъ, см. Дурманъ вонючій (*Datura Stramonium* L.).

Коровьякъ, см. Коровьякъ бѣлоцвѣтный (*Verbascum Lychnitis* L.).

Коровьякъ, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).

Коровьяки дробныя, см. Коровьякъ бѣлоцвѣтный (*Verbascum Lychnitis* L.).

Королевина трава, см. Реняшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).

Королевина трава, см. Посконникъ конопляный (*Eupatorium cannabinum* L.).

Королевина трава, см. Ланушникъ большой (*Lappa major Gaertn.*).

Королевская трава, см. Посконникъ конопляный (*Eupatorium cannabinum* L.).

Королевъ цвѣтъ желтый, см. Чина луговая (*Lathyrus pratensis* L.).

Королевъ цвѣтъ красный, см. Чина клубочковая (*Lathyrus tuberosus* L.).

Королекъ, см. Тминъ обыкновенный (*Carum carvi* L.).

Корольки садовыя, см. Перець стручковый (*Capsicum annuum* L.).

Короста, см. Вѣлена черная (*Hyosclamus niger* L.).

Короста, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).

Короста, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).

Короставая трава, см. Лютикъ ядовитый (*Ranunculus sceleratus* L.).

Короставикъ } см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).

Короставникъ } полевой (*Scabiosa arvensis* L. sin. *Knantia arvensis* Coult., *Trochera arvensis*). Полевой короставникъ имѣетъ названія: Астра дикая (Моск.), Астра полевая (Волог., Моск.), Астра синяя (Новг.), Влошникъ (Пск.), Багна (Орл.), Болобольникъ (Твер., Новг.), Вдовушки (Малор.), Головка, Головникъ (Твер.), Грудная трава, Волопки лиловыя (Тавр.), Веретовая (Олон.), Звѣздочки, Романичникъ (Могил.), Короста, Короставикъ, Короставникъ, Коростиникъ, Коростовикъ, Коростяшка, Компоштыльонъ полевой, Козелець, Красноголовка (Олон.), Куколь

горькій (Каз.), Купалка (Екат.), Медовникъ (Нижег.), Ногелова-токъ (Екат.), Немочная (Нижег.), Огирчакъ (Екат.). Одышная трава, Оладошникъ (Екатер.), Христова палочка (Умань), Псереполохъ (Тамб.), Повнякій (Волян.), Пупникъ, Пуповникъ (Вятск.), Попки, Попонокъ (Могил.), Пуговникъ, Разгозиль (Екат.). Растопырникъ (Черн.), Свербезнища, Серпуха, Синявка, Скабіоза, Скабіоза дикая, Шкабіоза (Гродн.), Собачки (Влад.), Сорочья трава (Олон.), Стоголовникъ (Бесс.), Теріакъ полевой, Трава отъ выпадшей (Костр.), Чесотная трава, Чесоточная трава, Шпалабыкъ луговой. (Таб. XXI, фиг. 118.) Короставникъ есть многочисленнее травянистое растеніе изъ семейства «ворсянковыхъ» (*Dipsacaeae* DC.), весьма обыкновенное въ Европѣ и въ Россіи. Стебель вмѣстѣ съ листьями сѣроватый и шершавый отъ волосковъ, пухъ покрывающихъ, выш. $7\frac{1}{2}$ вершк.— $1\frac{1}{2}$ арш., наверху немного вѣвистый: прикорневые листья ланцетовидные, цѣльно-крайніе, стеблевые—перисто-раздѣльные, съ ланцетовидными боковыми долями и болѣе крупною конечною долею. Цвѣты сгущены въ крупныя полушаровидныя головки лилового или розоваго, рѣдко, бѣлаго цвѣта. Общее цвѣтоложе жестковолосое: краевые цвѣты крупнѣе внутреннихъ; каждый цвѣтокъ снабженъ какъ-бы двумя чашечками, наружной и внутренней: наружная прикрѣплена подъ завязью и представляетъ изъ себя обверточку, тогда какъ внутренняя, настоящая, сидитъ на завязи, блюдцеобразная, съ 8 щетинками. Вѣнчикъ 2-хлопастный, снѣжноблестящій. Тычинокъ 4: завязь нижняя, одногнѣздная; столбикъ нитевидный, съ нераздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ—сѣмянка. Растетъ на поляхъ, на лугахъ и между кустарниками. Цвѣтетъ лѣтомъ.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Прежде короставникъ употреблялся внутрь отъ водянки, а снаружи отъ чесотки. Теперь врачами растеніе это вообще оставлено. Въ народѣ употребляется для леченія червей у скота (Волинская губ.).

Короства, см. Бѣлена черная (*Hyoscyamus niger* L.).

Коростникъ
Коростовикъ } см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).
Коростянка }

Корушатникъ, см. Крушина ломкая (*Rhamnus frangula* L.).

Корюки, см. Дурманъ вонючій (*Datura Stramonium* L.).

Коса Божіей Матери, см. Астрараль солодколистный (*Astragalus glycyphyllos* L.).

Косарики, см. Васильки рогаые (*Delphinium consolida* L.).

Косарики, см. Анисникъ цикутный (*Erodium cicutarium* L.).

Косарики, см. Шпажникъ обыкновенный (*Gladiolus communis* L.).

Косатикъ, см. Айръ обыкновенный (*Acorus Calamus* L.).

Косатикъ, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Косатка
Косатникъ } см. Айръ обыкновенный (*Acorus calamus* L.).

Косатникъ, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Коса трава, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Косица } см. Касатикъ нѣмецкій (*Iris germanica* L.).
Косички }

Косички, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Косма-трава, см. Подмаренникъ мягкій (*Gallium Mollugo* L.).

Косматая трава, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).

Косматикъ, см. Козелецъ приземистый (*Scorzonera humilis* L.).

Косматикъ, см. Козлобородникъ луговой (*Tragopogon pratensis* L.).

Косматка, см. Живучка ползучая (*Ajuga reptans* L.).

Косогорникъ, см. Подмаренникъ сѣверный (*Gallium boreale* L.).

Костенецъ, см. Костенецъ зонтичный (*Holosteum umbellatum* L.).

Костенецъ, см. Звѣздчатка большая (*Stellaria Holostea* L.).

Костенецъ зонтичный (*Holosteum umbellatum* L.): Фармацевтическое названіе этого растенія: *Holosteum s. Caryophyllus arvensis*. Костенецъ Гвоздичникъ, Гвоздичная трава, Травинка букеточная. Зонтичный костенецъ представляетъ изъ себя низенькую (выш. 1—4 вершк.) однолѣтнюю сизую травку изъ семейства «гвоздичныхъ» (*Caryophyllaceae* Juss.), распространенную въ средней и южной Европѣ, въ западной и южной Россіи и въ Сибири. Стебель у основанія сильно развѣтвленный, съ приподнимающимися вѣтвями; листья сидячіе, продолговатойцевидные, супротивные. Цвѣты расположены зонтикомъ. Чашелистиковъ 5; лепестковъ 5, бѣлыхъ, зубчатыхъ; тычинокъ 5; столбика 3; плодь — коробочка, раскрывающаяся наверху 6-ю створками. Растетъ на песчаныхъ мѣстахъ, на поляхъ и въ степяхъ. Цвѣтетъ съ марта по іюнь. (Рис. 127.)

Костеръ, см. Костеръ ржаной (*Bromus secalinus* L.).

Костеръ, см. Дымянка лекарственная (*Fumaria officinalis* L.).

Костеръ австралійскій, или Новоголландскій (*Bromus Willdenowii* Kunth.). Рекомендуются, какъ отличная трава для сыпучихъ песковъ. Отечество—Новая Голландія.

Костеръ безостный (*Bromus inermis* Leyss.). Аржанецъ (Сарат.), Овсянуха (Астр.), Пырей (Вор., Киев.), Пырей большой (Херс.), Пырець луговой (Нижег.), Перій (Малор.), Пирий (Екат.), Костеръ пырейный. Безостный костеръ представляетъ изъ себя многолѣтнюю траву изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенную въ средней и южной Европѣ и почти по всей Россіи, съ ползучими подземными побѣгами, напоминающую по виду овсяницу высокую (*Fistula elatior* L., см. ниже), отъ которой этотъ злакъ можно отличить по нижнимъ вѣтвямъ метелки, отходящимъ отъ главной оси по 3—4. Листья довольно широкіе, плоскіе, выветъ съ влагалищами гладкіе, крупные, продолговатые, линейные; колоски образуютъ прямостоящую метелку, во время цвѣтенія раскидистую; наружная пленка у цвѣтковъ безъ ости или съ короткою остью. Растетъ на поляхъ, лугахъ и около дорогъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Принадлежитъ къ хорошимъ кормовымъ травамъ.

Костеръ бесплодный (*Bromus sterilis* L.). Однолѣтнее травяни-

стое растение из семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенное почти по всей Европѣ, въ западной и южной Россіи. Стебель гладкій, выш. 6—14 вершковъ. Листья пушистые или, вмѣстѣ съ влагалищами, шершавые; колоски крупные, зеленоватые или слегка фіолетовые, къверху расширенныя, образуютъ рѣдкую метелку съ тонкими вѣтвями, сперва направленными вверхъ, а потомъ свѣшивающимися во все стороны. Тычинокъ 3; завязь одногнѣздная, одноствянная, съ 2-мя столбиками, несущими перистыя рыльца. Плодъ—зерновка. Растетъ на сухихъ, бесплодныхъ мѣстахъ и около дорогъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. (Рис. 128.)

Костеръ мягкій (*Bromus mollis* L.). Житецъ (Черн.), Жутвенная трава, Перійка, Стоколосъ (Малорос.). Мягкій костеръ есть однолѣтнее и двулѣтнее травянистое растение изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и въ Россіи, выш. 3—11 вершковъ, съ ползучимъ корневищемъ. Листья и колоски покрыты мягкимъ пушкомъ. Волоски крупные, многоцвѣтковые, къверху суженные, образуютъ прямостоящую метелку, послѣ цвѣтенія сжатую; вѣтви ея короткія, нижнія сидятъ обыкновенно по 3—4 и несутъ по 1—3 колоска. Наружныя пленки у цвѣтковъ на верхушкѣ съ выемкою и прямою короткою остью. Тычинокъ 3; завязь одногнѣздная, на верхушкѣ волосистая (какъ у всехъ видовъ костера), съ 2-мя столбиками, расположенными сбоку завязи, немного выше середины. Плодъ—зерновка. Растетъ на лугахъ и на поляхъ. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта.

Костеръ пырейный, см. Костеръ безостный (*Bromus inermis* Leyss.).

Костеръ ржаной (*Bromus secalinus* L.). Житнякъ, Костеръ, Костыръ (Малор.), Костыръ, Кастюльки (Малор.), Косцеръ (Бѣлор.), Овесецъ, Овесъ заячій, Овсецъ, Овсягъ, Овсянка, Стоколосникъ, Стоколосъ (Новорос.), Шуя (Яросл.). Ржаной костеръ представляетъ однолѣтнее, рѣже двулѣтнее, травянистое растение изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенное въ сѣверной и средней Европѣ и почти по всей Россіи. Листья обыкновенно съ рѣдкими волосками и голыми влагалищами, ланцетовидные колоски съ 5—15 цвѣтками, свѣтло-зеленые; гладкіе, образуютъ прямую метелку, при плодахъ наклоненную немного въ одну сторону. Наружныя пленки цвѣтковъ снабжены остроконечіемъ или короткою извилистою остью; тычинокъ 3; завязь нижняя, одногнѣздная, съ волосистой верхушкой и 2-мя столбиками. Плодъ—зерновка. Растетъ во ржи, на поляхъ и сорныхъ мѣстахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Составляетъ сорную траву.

Костеръ шероховатый, или лѣсной (*Bromus asper* L.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенное почти по всей Европѣ, въ средней и южной Россіи и въ Сибиріи, выш. отъ 11 вершк. до 1½ арш. Листья длинныя, шероховатые, влагалища ихъ усажены жест-

лыми, прямыми, назад направленными, волосками. Ланцетовидные, на длинных ножкахъ, колоски образуютъ рѣдкую, повислую, съ длинными вѣтвями метелку. Наружная пленка снабжена остью, по длинѣ равной самой пленкѣ. Тычинокъ 3; завязь одногнѣзная, одноствянная, волосистая, на верхушкѣ съ 2-мя столбиками. Плодъ—зерновка. Растетъ въ лѣсахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. (Рис. 129.)

Костиломъ, см. Полынь полевая (*Artemisia campestris* L.).

Костирь, см. Костеръ ржаной (*Bromus secalinus* L.).

Костица, см. Медунца (*Spiraea ulmaria* L.).

Костка жабья, см. Ласточникъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* Moench.).

Костоваль, см. Васильки рогатые (*Delphinium consolida* L.).

Костовязъ, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).

Костоломъ, см. Колокольчикъ крапиволистный (*Campanula Trachelium* L.).

Костоломъ, см. Чернокорень обыкновенный (*Cynoglossum officinale* L.).

Костоломъ, см. Гвоздика пышная (*Dianthus superbus* L.).

Костоломъ, см. Мелколенестникъ бѣлый (*Erigeron acris* L.).

Костоломъ, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).

Костоломъ, см. Черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris* L.).

Костоломъ, см. Оконникъ лекарственный (*Symphytum officinale* L.).

Костоломная трава, см. Душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.).

Костра, см. Метлица полевая (*Agrostis Spica Venti* L.).

Кострика-трава, см. Плевель оныняющій (*Lolium temulentum* L.).

Кострыка, см. Крапива двудомная или большая (*Urtica dioica* L.).

Костыкъ-трава, см. Многоножка тройчатая (*Polypodium dryopteris* L.).

Костырь, см. Костеръ ржаной (*Bromus secalinus* L.).

Костянига

Костянижникъ } см. Костяника (*Rubus saxatilis* L.).

Костяника (*Rubus saxatilis* L.). Каменика, Каменка, Каменица, (Малор.). Каменница (Малор.), Каменничникъ, Костяника (Арх.), Костяника (Пенз.), Костяница, Костяница (Малор.), Костяничникъ, Костяничникъ, Костянига, Куманика, Коце-зеле (Гродн.), Коце м—и (Гродн.), Малина каменная. Костяника представляетъ многолѣтнюю траву изъ семейства «розовѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), распространенную почти по всей Европѣ и въ Россіи, за исключеніемъ степной полосы, и въ Сибири, вып. 3—7 вершковъ; корневище съ лежащими, безплодными и прямостоячими, плодущими стеблями. Стебли и черешки усажены тонкими, прямыми шипами и оттопыренными волосками. Прилистники яйцевидно-ланцетные: листья тройчатые, съ яйцевидно-ромбическими и двояко-городчато-пильчатыми листоч-

ками и остроконечными зубами. Бѣлые цвѣты собраны щиткомъ на верхушкѣ стебля. Чашечка 5-тираздѣльная, съ шиповидно-заостренными, ланцетными долями, приросшая къ плосковому цвѣтоложу; вѣтчикъ 5-тилепестный, лепестки мелкіе, линейно-продолговатые. Тычинокъ много, прикрѣпленныхъ вмѣстѣ съ лепестками къ краю цвѣтоложа; пестикъ состоитъ изъ многихъ плодолистиковъ, сидящихъ на выпуклой средней части цвѣтоложа: столбики нитевидные, боковые—выходящіе близъ верхушки плодолистиковъ; плодъ состоитъ изъ небольшого числа красныхъ крупныхъ костянокъ. Костяника обыкновенно встрѣчается въ дѣсахъ и между кустарниками, цвѣтетъ въ маѣ и юнѣ. Плоды—сѣдобны.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Костяника извѣстна въ народной медицинѣ, какъ средство противъ скорбуга и геморроя; изъ цвѣтовъ и листьевъ дѣлають настойку.

Костяница

Иостяница

Костяничникъ

Костянка

Костянки, см. Толокнянка обыкновенная (*Arctostaphylos officinalis* L.).

Косырки. см. Васильки рогаые (*Delphinium consolida* L.).

Косытинъ, см. Герань кроваво-красная (*Geranium sanguineum* L.).

Косыці, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Котевка. см. Орѣхи водяные (*Trapa natans* L.).

Котелки. см. Сонъ (*Anemone Pulsatilla* L.).

Котелки, см. Колокольчикъ раскидистый (*Campanula patula* L.).

Котелки, см. Чертополохъ полевой (*Chrysium arvense* Scop.).

Котелки. см. Орѣхи водяные (*Trapa natans* L.).

Котелочки, см. Сонъ (*Anemone Pulsatilla* L.).

Котелочки, см. Колокольчикъ перенколистный (*Campanula persicifolia* L.).

Котельки. см. Колокольчикъ раскидистый (*Campanula patula* L.).

Котельки бѣлые, см. Хлопушка (*Silene inflata* Smith.).

Котельчики. см. Сонъ (*Anemone Pulsatilla* L.).

Котики. см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).

Котики. см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Sacq.).

Котики. см. Клеверъ пашенный или кошачій (*Trifolium arvense* L.).

Котики. см. Вѣлгоголовка (*Trifolium montanum* L.).

Котики. см. Клеверъ пашенный или кошачій (*Trifolium arvense* L.).

Котикое. см. Язвенникъ обыкновенный (*Anthyllus Vulneraria* L.).

Котикъ. см. Фиалка опушенная (*Viola hirta* L.).

Котконья, см. Желтуха (*Senecio Jacobea* L.).

Котовикъ, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).

Котовикъ кошачій (*Nepeta Cataria* L.). Фармацевтическое названіе: *Nepeta s. Cataria, s. Mentha Cataria* (Herba). Болячная трава (Ряз.), Глушнякъ (Полт.), Котки (Малор.), Кошечникъ (Ворон.), Кошачья мята (Дв., въ бол. ч. Росс.), Кошкина трава, Кошача мята, Кошача мѣята (Малор.), Мята полевая (Полт.),

Мята степная (Тамб.), Кошачья трава, Котовникъ, Крапива лѣсная (Могил.), Маточникъ (Екатер.), Расходникъ, Утренникъ, Шапта (Малор.), Шенда (Волин.), Шандра душистая (Полт., Хар.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ средней и южной Россіи, въ Сибири и Туркестанѣ. Стебель прямостоящій, вѣтвистый, выш. отъ 14 верш. до 1½ арш. Листья супротивные, черешковые, сердцевидно-яйцевидные, острые, снизу сѣровато-пушпетые. Мутовки, состоящія изъ большого количества бѣлыхъ или красноватыхъ цвѣтовъ, сближены на верхушкѣ стебля и вѣтвей колосьями. Чашечка трубчатая, съ 15 жилками, съ короткимъ 5-тизубчатымъ отгибомъ, съ ланцетошпоровидными зубцами, изъ которыхъ верхніе длиннѣе; вѣнчикъ съ тонкою при основаніи, спереди расширенною, трубчатою и двугубымъ отгибомъ; верхняя губа немного вогнутая и выемчатая, нижняя—съ округлой, вогнутой и городчато-зубчатой средней лопастью, покрыта пурпуровыми точками. Тычиннокъ 4, сближенныхъ подъ верхней губой, среднія 2 длиннѣе боковыхъ; гнѣзда пыльниковъ сильно расходящіяся. Завязь верхняя, 4-хлопастная, 4-хгнѣздная, со столбикомъ, оканчивающимся 2-раздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ—овальные, немного сжатые орѣшки. Растетъ около дорогъ и на сорныхъ мѣстахъ и между кустарниками. Цвѣтетъ лѣтомъ. Кошачій котовикъ принадлежитъ къ числу медоносныхъ растений. (Рис. 130.)

Котовникъ, см. Котовикъ кошачій (*Nepeta Cataria* L.).

Котовникъ, см. Млечникъ морской (*Glaux maritima* L.).

Котовникъ, см. Клеверъ пашенный, или кошачій (*Trifolium arvense* L.).

Котовникъ, см. Бѣлоголовка (*Trifolium montanum* L.).

Котопці, см. Грушанка малая (*Pirola minor* L.).

Коточижникъ, см. Кочедыжникъ обыкновенный (*Aspidium Filix femina* Sw.).

Коточижница, см. Папороть черный (*Struthiopteris germanica* L.).

Котръ, см. Серпуха красильная (*Serratula tinctoria* L.).

Котыки, см. Клеверъ пашенный, или кошачій (*Trifolium arvense* L.).

Котылекъ, см. Качимъ стѣнной (*Gypsophila muralis* L.).

Котятникъ, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).

Котятникъ, см. Клеверъ пашенный, или кошачій (*Trifolium arvense* L.).

Коутунникъ, см. Бѣлоголовка (*Trifolium montanum* L.).

Кофе, см. Кофейное дерево (*Coffea arabica* L.).

Кофе шведскій—растение родомъ изъ Испаніи. Сѣмена его употребляются, какъ суррогатъ кофе.

Кофейное дерево (*Coffea arabica* L.). Кофе. Вѣчно-зеленое, въ 1 сажень и выше, дерево съ яйцевидными, заостренными, голыми листьями и съ сучеными отъ 5—7 пахучими цвѣтами и яйцевидными, по созрѣваніи красными, бобовидными плодами. Въ дикомъ состояніи дерево произрастаетъ въ восточной Афри-

къ и культивируется во всѣхъ тропическихъ странахъ Африки, Азии и Америки до 36° сѣв. шир., занимая обширныя плантаціи. Изъ поджаренныхъ и смолотыхъ зеренъ готовится извѣстный напитокъ «кофе».

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Кофе—извѣстный, очень распространенный напитокъ, производить на челоѣка возбуждающее дѣйствіе, въ особенности на сосудистую и нервную систему, и при большомъ употребленіи вызываетъ усиленное мочеотдѣленіе, также усиливаетъ дѣятельность кишечнаго канала. Кофе служить хорошимъ средствомъ при слабости и вялости органовъ пищеваренія, при упадкѣ дѣятельности нервной системы вслѣдствіе переутомленія, также онъ служитъ противоядіемъ отъ опьяненія и отъ отравленія опиумъ и другими снотворными растительными ядами. До прихода врача въ случаяхъ отравленія опиумъ или морфіемъ слѣдуетъ давать больнымъ крѣпкій горячій кофе. Точно также черный крѣпкій кофе дается при всевозможныхъ болѣзняхъ, сопровождающихся упадкомъ силъ, и въ особенности при рвотѣ.

Въ гомеопатіи изъ сырыхъ кофейныхъ зеренъ готовится настойка, которую даютъ, какъ успокаивающее средство, при бесоницахъ, перемежающейся лихорадкѣ, оспѣ и, кромѣ того, отъ судорогъ и сильныхъ болей въ животѣ послѣ родовъ.

Кочадижникъ } см. Кочедыжникъ обыкновенный (*Aspidium*
Кочедыжникъ } *Filix femina* Bernh.).

Кочедыжникъ коричневый (*Asplenium Trichomanes* L.). Небольшой малолѣтній папоротникъ изъ семейства «полиподіевыхъ» (*Polypodiaceae* R. Br.), распространенный въ средней и южной Европѣ, на югѣ Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ и южномъ Уралѣ, съ небольшимъ пучкомъ листьевъ. Послѣдніе въ очертаніи линейно-ланцетные, перисто-разсѣченные, съ пятью сидячими кругловатыми долями. Черешки и главные нервы, т. е., общіе черешки листочковъ, чернобурые, блестящіе, волосовидные. Кучки спорангіевъ (вмѣстилища, гдѣ образуются споры) прямолінейные. Споры образуются во второй половинѣ лѣта. Растетъ на тѣнистыхъ и каменистыхъ мѣстахъ, въ расщелинахъ утесовъ, въ гористыхъ мѣстностяхъ.

Кочедыжникъ обыкновенный (*Aspidium Filix femina* Bernh.). Фармацевтическое названіе обыкновеннаго кочедыжника: *Filix femina*. Блашникъ, Колтунъ (Волог.), Кочедыжникъ, Коточижникъ (Костр.), Конетыжникъ (Костр.), Кочадижникъ, Купоротникъ (Влад.), Купородъ, Купиродъ, Палерть (Костр., Новг.), Палортъ (Костр.), Папороть, Понаротъ жинга (Укр.), Палороть бороной (Вятск.), Палерцы (Ков.), Папоротникъ, Папоротникъ обыкновенный, черный, Стогожникъ женскій, Чертова борода. Многолѣтнее травянистое растение изъ класса «папоротниковыхъ» (*Filices*) и изъ семейства «полиподіевыхъ» (*Polypodiaceae* R. Br.), распространенное въ Европѣ, въ Азии, сѣв. Америкѣ, сѣв. Африкѣ и въ Новой Голландіи, и по всей Россіи. Корневище толстое; стебель короткій, вертикальный, тѣсно покрытый основаніями листьевъ; черешки значительно короче

листовыхъ пластинокъ и усажены при основаніи крупными ланцетными пленками; листья крупные, въ очертаніи эллиптическіе или ланцетные, трижды перисто-разсѣченные. Сегменты первого порядка линейные, вверху вытянутые. Размножается спорами, которые образуются въ особыхъ вмѣстѣлищахъ—«спорангіяхъ», расположенныхъ линейными или продолговатыми кучками; изъ нихъ нижнія на углахъ, лиетка обыкновенно согнутая крючкомъ или подковообразная, слѣдующія обыкновенно прямыя. Кучки спорангіевъ прикрыты покрываломъ соответствующей имъ формы и прикреплены съ одной стороны кучки. Растетъ въ лѣсахъ, на влажныхъ мѣстахъ. Споры образуются лѣтомъ. (Таб. XXII. фиг. 121.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Корень кочедыжника считается средствомъ противъ глистовъ и прибавляется къ мужскому папоротнику (*Aspidium Filix masc.*). Въ народной медицинѣ корень кочедыжника идетъ на ванны отъ ревматизма; кромѣ того, онъ вмѣстѣ съ другими растительными веществами употребляется для приготовленія кровеочистительнаго декокта.

Коченда, см. Козлобородникъ луговой (*Tragopogon pratensis* L.).

Кочетки, см. Травянка (*Dianthus deltoides* L.).

Кочетки, см. Шпажникъ обыкновенный (*Gladiolus communis* L.).

Кочетокъ, см. Козлобородникъ луговой (*Tragopogon pratensis* L.).

Кочетокъ лошадиный, см. Занникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa* L.).

Кочишко, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).

Кошанникъ, см. Коровякъ черный (*Verbascum nigrum* L.).

Кошачка, см. Кошачья лапка (*Antennaria dioica* Gärtn.).

Кошачки, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).

Кошачки, см. Клеверъ пахучій, или кошачій (*Trifolium arvense* L.).

Кошачки простыя травы, см. Кошачья лапка (*Antennaria dioica* Gärtn.).

Кошачникъ, см. Коровякъ черный (*Verbascum nigrum* L.).

Кошачій глазъ, см. Львиный зѣвъ большой (*Antirrhinum majus* L.).

Кошачій корень, см. Валериана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gärtn., sin. *Helychrysum montanum* Rupr. off., *Gnaphallum* s. *Pilosella alba*, s. *Pescati* (Flores et Herba). Это растеніе имѣетъ слѣдующія мѣстныя названія: Авдульки (Могил.), Алютины слезы, Аникины слезки (Олон.), Бабникъ, Бабикъ (Ниж.), Безсмертная (Кал.), Богородицына трава (Твер.), Вилена (Нижет.), Вѣлуха, Вѣлошейка (Олон.), Волосцовая (Арх.), Гвоздика бѣлая и красная (Вят.), Грыжникъ, Грыжевая трава, Грыжная трава, Грызникъ (Бѣлор.), Горлянка (Моск.), Гречишный цвѣтъ, Грудная трава (Волог.), Жабникъ (Ниж.), Жабная трава, Змѣевикъ, Заячья лапка, Заячья трава (Готьма), Золотушникъ (Тамб.), Камчугъ (Вятк.), Камка розовая (Кал.), Катышка (Смоленск.), Кошачья лапка (Моск., Тамб.), Коцъ-лапки

(Гродн.). Кошачьи простыя трава. Кошечки. Лапки. Мертве зеле (Гродн.), Могильникъ (Могил.), Мохнатыя баранки (Нижег.), Нечестная трава (Арх.), Нафалия (Нижег.), Печуй вѣтеръ (Черн.), Печуевникъ (Хар.), Носовая (Олон.), Нарѣзная трава, Печорникъ Печерникъ, Пуновникъ, Пунырка, Переложная трава (Олон.), Пухлецъ (Вол.), Песчаника (Арх.), Полушвьтъ (Нижег.), Призорная (Олон.), Пухъ (Вит.), Распустилка (Каз.), Скоичики (Бѣлор.), Сорокопрѣточная (Алт.), Сушенница (Двиг.), Сухопуть (Гродн.), Стократка (Минск.), Тминъ бѣлый и красный, Розовый цминъ (Малор.), Тьмень, Тропникъ (Костр.), Укванъ, Уквоитъ трава, Холодянка (Волог.), Шерстникъ, Шадрикъ (Ниж.). Кошачьи лапки — низенькая многолѣтняя травка съ бѣло-войлочнымъ стеблемъ изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенная почти во всей Европѣ и въ большей части Россіи, съ лежащими побѣгами, несущими розетки листьевъ. Стебель прямой, невѣтвистый, вмѣстѣ съ нижнею стороною листьевъ бѣло-войлочный; листья сверху почти голые, зеленые; бѣлые прикорневые—лопатчатые, стеблевые—линейные. Цвѣты въ мелкихъ корзинкахъ, скученныхъ на верхушкѣ стебля пѣткомъ, двудомные. Каждая корзинка снабжена колокольчатой оберткой изъ черепичатыхъ листочковъ, снизу пушистыхъ, наверху сухихъ; въ мужскихъ корзинкахъ они туповатые, короче цвѣтковъ и обыкновенно бѣлаго цвѣта; въ женскихъ—островатые, длиннѣе цвѣтковъ и розовые. Женскія корзинки съ одними нитевидными цвѣтками и летучками изъ нитевидныхъ волосковъ; мужскія—съ трубчатыми, безплодными цвѣтками и летучками изъ булавовидно-утолщенныхъ на концѣ волосковъ. Тычинокъ 5; завязь нижняя, одногнѣздная, съ однимъ столбикомъ. Плодь — сѣмянка, снабженная летучкой. Растетъ по сухимъ мѣстамъ на лугахъ и въ лѣсахъ. Цвѣтетъ обыкновенно въ маѣ и юнѣ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Растеніе идетъ въ составъ грудного сбора и употребляется въ народной ветеринарной медицинѣ: овцамъ дается отъ поноса, въ отварѣ, какъ чай; въ Олонецкой и Вологодской губ. отваръ даютъ отъ грыжи, въ Черниговской губ. порошкомъ присыпаютъ раны.

Кошачья трава, см. Скерда кровельная (*Crepis tectorum* L.).

Кошачья трава, см. Котовикъ кошачій (*Nepeta Cataria* L.).

Кошачья трава, см. Клеверъ напennyй, или кошачій (*Trifolium arvense* L.).

Кошачья трава, см. Валериана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Кошеба трава, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).

Кошелитка, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa Pastoris* Moench.).

Кошельная трава, см. Вшивица болотная (*Pedicularis palustris* L.).

Кошенильникъ, см. Дивала однолѣтняя (*Scleranthus annuus* L.).

Кошечки, см. Кошачья лапка (*Antennaria dioica* Gärtn.).

- Кошечки, см. Будра плющевидная (*Clethoma hederacea* L.).
- Кошечки желтыя, см. Цминъ (*Helyschrisum arenarium* DC.).
- Кошечникъ, см. Липучка реллейчатая (*Echinosperrum Lappula* Lehm.).
- Кошечникъ, см. Млечникъ лекарственный (*Glaux maritima* L.).
- Кошечникъ, см. Котовикъ кошачій (*Nepeta Cataria* L.).
- Кошечникъ, см. Шалфей луговой (*Salvia pratensis* L.).
- Кошица, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).
- Кошки, см. Череда трехраздѣльная (*Bidens tripartita* L.).
- Кошки, см. Подмаренникъ цѣпкій (*Galium aparine* L.).
- Кошки } см. Котовикъ кошачій (*Nepeta Cataria* L.).
- Кошкина трава } см. Котовикъ кошачій (*Nepeta Cataria* L.).
- Кошкина трава, см. Валериана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).
- Кошурникъ, см. Клеверъ пашенный, или кошачій (*Trifolium arvense* L.).
- Крабицъ, см. Бородавникъ обыкновенный (*Lampsana communis* L.).
- Крапъ, см. Марена красильная (*Rubia tinctoria* L.).
- Крапива, см. Крапива глухая (*Lamium album* L.).
- Крапива, см. Крапива двудомная, или больная (*Urtica dioica* L.).
- Крапива болотная, см. Зюзникъ европейскій (*Lycopus europaeus* L.).
- Крапива большая, см. Крапива двудомная (*Urtica dioica* L.).
- Крапива бѣлая, см. Крапива глухая (*Lamium album* L.).
- Крапива водяная (*Ceratophyllum demersum* L.). Крапивка, Куширь, Кучиръ, Кущуръ, Жабурыня, Куширь (Малор.), Маричъ (Клев.), Шуваръ (Мог.). Водяная крапива представляетъ изъ себя многолѣтнюю траву изъ семейства «роголистныхъ» (*Ceratophyllaceae* Gray), произрастающую почти по всей Европѣ и Россіи. Стебель очень вѣтвистый, съ жесткими темно-зелеными листьями, кольчато-расположенными, раздѣленными виллообразно на 2—4 линейныя доли. Цвѣты мелкіе, зеленые, однодомные, пазушные. Тычиночный цвѣтокъ состоитъ изъ 10—12-тираздѣльнаго околоцвѣтника и многочисленныхъ тычинокъ, а пестичный изъ 6—10-тираздѣльнаго околоцвѣтника и одногнѣздой завязи, заключающей одно яичко. Плодъ—яйцевидный орѣшекъ, снабженный тремя рожками, изъ которыхъ два находятся при основаніи плода, а одинъ (отвердѣвшій столбикъ) сидитъ на верхушкѣ. Произрастаетъ въ стоячихъ и медленно текущихъ водахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. (Рис. 131.)
- Крапива волшебная, см. Душевикъ остролистный (*Calamintha Acanos Benth.*).
- Крапива волшебная, см. Зеленчукъ желтый (*Galega officinalis* L.).
- Крапива волшебная, см. Подорожникъ песчаный (*Plantago arenaria* W. K.).
- Крапива глухая, см. Алтей лекарственный (*Althaea officinalis* L.).

Крапива глухая, см. Чернокудренникъ черный (*Ballota nigra* L.).
Крапива глухая, см. Посконникъ конопляный (*Eupatorium cannabinum* L.).

Крапива глухая (*Lamium album* L.). Фармацевтическое название глухой крапивы: *Lamium s. Urtica mortua, s. Geleopsis. Драголюбъ* (Екат.), Бѣлая глухая крапива, Глуха бѣла крапива (Малорос.), Пригуль трава. Глухая крапива есть многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и въ Россіи, выш. 7—14 вершковъ. Стебель выпускаетъ изъ основанія подземные побѣги. Листья черешковые, продолговато-сердцевидные, зубчатые. Цвѣты бѣлые по 6—8, въ плотныхъ пазушныхъ мутовкахъ. Чашечка трубчато-колокольчатая, съ 5-ю ланцетными зубчиками и 5 жилками; вѣнчикъ двугубый, съ трубочкой, выдающейся изъ чашечки. Средняя лопасть нижней губы выемчатая, а боковыя очень маленькія ввидѣ острыхъ зубцовъ. Тычинокъ 4, боковыя длиннѣе среднихъ; гнѣзда пыльниковъ расходящіяся. Завязь верхняя, 4-хгнѣздная, 4-хлопастная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ при созрѣваніи распадается на 4 остро-трехгранныхъ, наверху притупленныхъ, орѣшка. Глухая крапива растетъ на влажныхъ мѣстахъ, между кустарниками, въ лѣсахъ и цвѣтетъ обыкновенно весною.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ прежнее время глухая крапива употреблялась въ медицинѣ, какъ мочегонное средство; цвѣты и листья ввидѣ отвара давались при различныхъ маточныхъ болѣзняхъ, отъ истерическихъ судорогъ, болей въ животѣ и желтухи. Въ настоящее время растение это оставлено и изрѣдка только употребляется въ народной медицинѣ отъ вышеупомянутыхъ болѣзней. Изъ свѣжаго растенія выжимаютъ сокъ и пьютъ его отъ кровотеченія изъ носа, отъ маточныхъ кровотеченій, отъ бѣлей, золотухи и чахотки. Изъ отвара цвѣтовъ при этихъ-же болѣзняхъ дѣлаютъ ванны. Изъ цвѣтныхъ верхушекъ настаиваютъ на маслѣ, оставляя ихъ долгое время на солнцѣ, бальзамъ, который накладываютъ на застарѣлыя язвы. Отваръ крапивы готовятъ, какъ чай: заливаютъ щепотку сушеной травы стаканомъ кипятка и пьютъ по чашкѣ 1—2 раза въ день. Молодые листья употребляютъ въ пищу, какъ обыкновенная крапива.

Въ ветеринарной народной медицинѣ свѣже-выжатый сокъ растенія дается животнымъ отъ кровавой мочи.

Крапива глухая, см. Пустырникъ обыкновенный (*Leonorus cardiaca* L.).

Крапива глухая } см. Чистецъ лѣсной (*Stachys silvatica* L.).
Крапива дикая }

Крапива дикая, см. Пустырникъ обыкновенный (*Leonorus cardiaca* L.).

Крапива двудомная, или большая (*Urtica dioica* L.). Фармацевтическое названіе двудомной крапивы: *Urtica major. Желна, Жгучка, Жегала* (Тв.), Жигала (Тв.), Жигалка, Крапива (въ б. ч. Росс.), Крапива большая, жгучая, стрекучая

простая, Крапива жалюча (Малор.), Кострыка (Ряз.), Стрекава (Пск., Тв.), Стрекавка (Пск.), Стрекавина (Новг.), Стрекива (Пск., Тв.), Стракива (Тв.), Стрекучка, Стрекаша. Большая крапива есть многолѣтняя трава изъ семейства «крапивныхъ» (*Urticaceae* Juss.), весьма обыкновенная въ Европѣ и въ Россіи. Стебель выш. отъ 7 верш. до 1½ арш., съ ползучими подземными побѣгами. Все растение усажено жгучими волосками и покрыто пушкомъ. Листья супротивные, нижніе—серцевидно-яйцевидные, заостренные, крупно-пильчатые. Двудомные мелкіе зеленые цвѣты въ пазушныхъ поникшихъ колосьяхъ, длиннѣе листовыхъ черешковъ. Мужскіе цвѣты съ 4-храздѣльнымъ околоцвѣтникомъ и одинаковыми долями, женскіе—съ 4-хлистнымъ околоцвѣтникомъ; внутренніе 2 листочка крупнѣе наружныхъ и, разрастаясь при плодѣ, окружаютъ его. Тычинокъ 4, прирѣшенныхъ къ основанію околоцвѣтника и супротивнымъ его частямъ. Завязь верхняя, одногнѣздная, съ однимъ яичкомъ и 1—2 рыльцами. Плодъ — сѣмянка. Большая крапива растетъ обыкновенно на влажныхъ мѣстахъ, на пустыряхъ, около жилья и въ лѣсахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ.

Молодые листья и побѣги употребляются въ пищу, а изъ волоконъ стебля выдѣлываютъ ткань. Листьями окрашиваютъ въ зеленый, а корнемъ въ желтый цвѣтъ. (Рис. 133.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Крапива въ большомъ употребленіи въ народной медицинѣ. Листья ея служатъ для приготовления отваровъ, которые больные пьютъ отъ чахотки, поноса и ломоты. Свѣжими вѣтвями крапивы сѣкутъ парализованные члены. Корень крапивы считается глистогоннымъ средствомъ. Въ Пермской губерніи корни считаются хорошимъ средствомъ отъ лихорадки: ихъ настаиваютъ вмѣстѣ съ чеснокомъ на водкѣ въ теченіе 6-ти дней и этимъ настоемъ натираютъ больного и даютъ его по 3 столовые ложки въ день. Кромѣ того, этотъ видъ крапивы считается полезнымъ отъ каменной болѣзни, отъ чахотки и отъ паралича. Для этого выжимаютъ сокъ изъ свѣжихъ листьевъ и цвѣтовъ, хорошо закуриваютъ и пьютъ по 3 столовыхъ ложки въ день; изъ сушеныхъ листьевъ и цвѣтныхъ верхушекъ готовятъ отваръ, какъ чай; щепотку завариваютъ въ чайникѣ стаканомъ кипятка, процеживаютъ и пьютъ по 2 столовыхъ ложки нѣсколько разъ въ день. Сѣмя крапивы растираютъ съ водою (на стаканъ воды берутъ ½ или 1 чайную ложку) и принимаютъ при каменной болѣзни.

Животные охотно ѣдятъ сушеную и парѣзанную крапиву. Крапивные верхушки съ сѣменами отвариваются съ отрубями и служатъ для откармливанія куръ.

Крапива жгучая, или мелкая (*Urtica urens* L.). Жалива (Малор.), Жгучка (Екат.), Жигучка (Мал. и Вор.), Жигавица (Екат.), Жигавка (Малор.), Жижка (Екат.), Жижуха (Умань), Крапива мелкая (б. ч. Росс.), Крапива-жгучка, Крапива жигучка (Южн. Росс.), Ожжиха, Огонь-крапива, Стрекава, Стрекива, Стрекавка, Стрекавица (Пск., Твер.), Стрекучки (Курск.). Жгучая крапива

есть однолѣтняя трава изъ семейства «крапивныхъ» (*Urticaceae* Juss.), весьма обыкновенная въ Европѣ и въ Россіи. Стебель обыкновенно въ 4—7 вершковъ. Растеніе покрыто жгучими волосками. Листья супротивные яйцевидно-эллиптическіе, острые, по краямъ крупно-пильчатые. Цвѣты мелкіе, зеленоватые, однодомные въ пазушныхъ колосьяхъ, содержащихъ какъ тычиночные, такъ и пестичные цвѣты; колосья короче листовыхъ черешковъ. Околоцвѣтникъ о 4 доляхъ. Тычинокъ 4, супротивныхъ долямъ околоцвѣтника; завязь верхняя, одногнѣздная, съ однимъ яичкомъ и 1—2 рыльцами. Плодъ—сѣмянка. Растетъ около дорогъ и жилья, на сорныхъ мѣстахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. (Рис. 132.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Жгучая крапива употребляется въ народѣ въ тѣхъ-же случаяхъ, какъ и большая крапива; въ дѣло идутъ сѣмена и листья. Изъ сѣмянъ приготавливается декоктъ, для чего $\frac{1}{2}$ унціи (15 грм.=1 стол. л.) сѣмянъ заливаютъ 12-тью унциями (24 стол. л.=360 грм.) воды, ставятъ на плитѣ и кипятятъ, пока не останется 10 стол. ложекъ; отваръ этотъ принимаютъ черезъ 2—3 часа по столовой ложкѣ; свѣже-выжатый сокъ принимаютъ отъ 2-хъ до 5-ти унцій (60—150 грм.=4 до 10-ти стол. л.) въ день. Изъ сѣмянъ и корней приготавливаютъ порошокъ и на приемъ берутъ 1 драхму (4 грм.) порошка, или-же изъ нихъ дѣлаютъ наливку: для этого 1 унцъ (30 грм.) порошка заливаютъ стаканомъ кипятка; наливку изъ корней жгучей крапивы въ народѣ въ особенности хвалятъ отъ каменной болѣзни, чахотки и желтухи. Свѣжій сокъ жгучей крапивы употребляется, какъ прохладительное средство и при кровохарканіи. Въ Московской губерніи молодые цвѣты пьютъ, какъ чай: одну шепоть на 4 чашки воды; считается, что они помогаютъ отъ камня и способствуютъ отдѣленію мокроты; въ Вологодской губерніи жгучую крапиву употребляютъ отъ грыжи, въ Владимірской и Воронежской—отъ удушья.

Скотъ кормятъ крапивой для предохраненія отъ заразы. Въ Даніи собираютъ лѣтомъ сѣмена крапивы, сушатъ ихъ на солнцѣ, толкутъ и даютъ по горсти вмѣстѣ съ овсомъ лошадямъ ежедневно утромъ и вечеромъ. Хворая лошадь полнѣетъ, и шерсть ихъ дѣлается лоснящеюся. Свѣжая жгучая крапива производитъ очень болѣзненные ожоги на тѣлѣ, ввидѣ обширныхъ красныхъ пятенъ и пузырей. Для успокоенія боли обожженные мѣста слѣдуетъ смазывать какимъ-либо масломъ.

Крапива лѣсная, см. Колокольчикъ жестковолосый (*Campanula cervicaria* L.).

Крапива лѣсная, см. Зеленчукъ желтый (*Galeobdolon luteum*).

Крапива лѣсная, см. Котовникъ кошачій (*Nepeta cataria* L.).

Крапива мелкая, см. Крапива жгучая (*Urtica urens* L.).

Крапива простая, см. Крапива двудомная, или большая (*Urtica dioica* L.).

Крапива собачья, см. Пустырникъ обыкновенный (*Leonorus Cardiac* L.).

Крапива стрекучья, см. Крапива двудомная или большая (*Urtica dioica* L.).

Крапивка, см. Крапива водяная (*Ceratophyllum demersum* L.).
Крапивничокъ, см. Пустырникъ обыкновенный (*Leonorus cardiaca* L.).

Крапивное дерево (*Celtis australis* L.). Дерево, произрастающее въ сѣверной Африкѣ и въ южной Европѣ; встрѣчается въ европейскихъ садахъ, какъ декоративное растение. Крѣпкая черноватая древесина употребляется на издѣліе нѣкоторыхъ музыкальныхъ инструментовъ, рукоятокъ для хлыстиковъ и проч. издѣлій. Фрукты, напоминающіе по виду вишни, пріятны на вкусъ. Листья охотно ѣдятъ шелкокрышныя черви; они также составляютъ хорошій кормъ козъ и овецъ. Изъ зеренъ выжимается масло. Древесина идетъ на выработку духовыхъ инструментовъ и на другія подѣлки.

Крапивный цвѣтъ, см. Повелика (*Cuscuta* L.).

Крапинецъ, см. Истодъ обыкновенный (*Polygala vulgaris* L.).

Крапчатка, см. Зюзникъ европейскій (*Lyceus europaeus* L.).

Красть розовый, см. Окопникъ лекарств. (*Symphytum officinale* L.).

Краса дивчача } см. Живучка ползучая (*Auga reptans* L.).
Краса дѣвичья }

Красавица, см. Белладонна (*Atropa Belladonna* L.).

Красавица, см. Пастурция (*Thlaspi majus* L.).

Красавица ночная, см. Фиалка ночная (*Hesperis matronalis* L.).

Красавка, см. Белладонна (*Atropa Belladonna* L.).

Красавка, см. Вѣлзоръ болотный (*Parnassia palustris* L.).

Красикъ (*Boletus luridus* Schaeff.). Подосиновикъ, Красный грибъ, Синикъ, Подорѣшникъ. Красикъ представляетъ изъ себя грибъ изъ семейства «шляпныхъ грибовъ» (*Hymenomycetes*), встрѣчающійся въ лѣсахъ. Шляпка оливко-бурая или коричнево-бурая, пенекъ красный; мясо желтоватое. Въ изломѣ синѣетъ. Считается подозрительнымъ. (Таб. XXIII, фиг. 127—129.)

Красильная трава, см. Вайда красильная (*Isatis tinctoria* L.).

Красильная трава, см. Воробейникъ полевой (*Lithospermum arvense* L.).

Красильничье дерево, см. Скумпія (*Rhus Cotinus* L.).

Красильный корень, см. Марена красильная (*Rubia tinctorium* L.).

Краска желтая, см. Дрокъ красильный (*Genista tinctoria* L.).

Краски, см. Горичвѣтъ весенній (*Adonis vernalis* L.).

Красная трава, см. Синикъ красный (*Echium rubrum* L.).

Красная трава, см. Щавель малый (*Rumex acetosella* L.).

Красная травица, см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).

Красникъ, см. Вероника ненастоящая (*Veronica spuria* L.).

Красноголовашки, см. Клеверъ красно-бѣлый (*Trifolium hybridum* L.).

Красноголовецъ, см. Березовый грибъ (*Boletus scaber* Bull.).

Красноголовики } см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Красноголовка } se L.).

- Красноголовки, см. Василекъ перистый (*Centaurea scabiosa* L.).
- Красноголовникъ, см. Черноголовникъ кровохлебковый (*Potentilla sanguisorba* L.).
- Красноголовникъ, см. Клеверъ средний (*Trifolium medium* L.).
- Красноголовникъ обыкновенный, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.).
- Красное дерево, см. Тиссъ обыкновенный (*Taxus baccata* L.).
- Красное зелье, см. Дягиль лѣсной (*Angelica silvestris* L.).
- Краснокорень, см. Румянка лекарств. (*Anchusa officinalis* L.).
- Краснокорень, см. Синякъ красный (*Echium rubrum* L.).
- Красномолочникъ, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).
- Красносережникъ, см. Кленъ татарскій, или русскій (*Acer tataricum* L.).
- Красноха, см. Настурція (*Tropaeolum majus* L.).
- Красноцвѣтъ, см. Дербенникъ прутиковый (*Lythrum virgatum* L.).
- Красноцвѣтка, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea millefolium* L.).
- Красноцвѣтная трава, см. Подмаренникъ мягкій (*Gallium Molugo* L.).
- Красноцвѣтникъ, см. Золототысячникъ обыкновенный (*Erythraea Centaurium* L.).
- Красношейка, см. Черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris* L.).
- Краснушка, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).
- Красный корень, см. Румянка лекарственная (*Anchusa officinalis* L.).
- Красный корень, см. Синякъ красный (*Echium rubrum* L.).
- Красный грибъ, см. Красикъ (*Boletus luridus* Schaeff.).
- Красный женскій волосъ, см. Кочедыжникъ коричневый (*Asplenium Trichomanes* L.).
- Красные цвѣтки, см. Травянка (*Dianthus deltoides* L.).
- Краснянка, см. Золототысячникъ обыкновенный (*Erythraeum Centaurium* L.).
- Красоля, см. Настурція (*Tropaeolum majus* L.).
- Красота дѣвичья, см. Травянка (*Dianthus deltoides* L.).
- Красота дѣвичья, см. Гвоздика пышная (*Dianthus superbus* L.).
- Красота дѣвичья, см. Плакунъ трава (*Lythrum salicaria* L.).
- Красотка, см. Синюха обыкновенная (*Polemonium coeruleum* L.).
- Красоцвѣтъ болотный, см. Сусакъ зонтичный (*Butomus umbellatus* L.).
- Красульки, см. Настурція (*Tropaeolum majus* L.).
- Красуха, см. Белладонна (*Atropa Belladonna* L.).
- Красуха, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).
- Кривавникъ, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea millefolium* L.).
- Кривавникъ, см. Ломоносъ прямой (*Clematis recta* L.).
- Кресса, см. Настурція (*Tropaeolum majus* L.).

Крессъ водяной (*Nasturtium officinale* R. Ch.). Фармацевтическое название водяного кресса *Nasturtium aquaticum* s. *Cardamine*. Брункрессъ, Гуливникъ водяной, Жеруха - рѣзуха, Крессъ родниковый, Настурция, Рѣзуха, Рѣзуха. Хрѣнь водяной. Это—многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и встречающееся въ западной, средней и южной Россіи. Стебель вѣтвистый, ползучій. Листья очередные, перисто-разсѣченные, конечная листовая доля яйцевидная, крупнѣе боковыхъ долей. Цвѣты мелкіе, бѣлые, въ короткихъ кистяхъ. Чашечка 4-хлестная, съ отстоящими чашелистниками. Вѣнчикъ 4-хлепестный, изъ на-крестъ расположенныхъ лепестковъ, вдвое длиннѣе чашелистиковъ. Тычинокъ 6, съ желтыми пыльниками. Плодъ—продолговато-линейные, слегка согнутые, вздутые стручки. Растетъ около ручьевъ, полей, иногда въ самой водѣ. Цвѣтетъ съ мая до сентября.

При растираніи свѣжихъ листьевъ обнаруживается сильный эдкій запахъ; на вкусъ растение горьковато-острое. Листья его употребляются въ пищу, какъ салатъ, а сѣмена могутъ замѣнить горчицу. Свѣже-выжатый сокъ употребляется, какъ весеннее леченіе отъ скорбута.

Крессъ горькій луговой, см. Сердечникъ горькій (*Cardamine amara* L.).

Крессъ дикій, см. Клоповникъ (*Lepidium ruderalis* L.).

Крессъ ключевой } см. Сердечникъ луговой (*Cardamine pra-*
Крессъ луговой } *tensis* L.).

Крессъ огородный, см. Крессъ-салатъ (*Lepidium sativum* L.).

Крессъ перечный, см. Перечникъ широколистный (*Lepidium latifolium* L.).

Крессъ полевой (*Lepidium campestre* R. Br.). Двулѣтнее невысокое травянистое растение изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), распространенное почти по всей Европѣ, въ средней и юго-западной Россіи и на Кавказѣ. Листья полевого кресса очередные; нижніе—продолговатые, суженные въ черешокъ, верхніе—сидячіе, зубчатые, при основаніи стрѣловидные. Цвѣты бѣлые мелкіе. Плодъ—яйцевидно-овальные, узкоперегородчатые стручки; створки ихъ, начиная отъ середины, снабжены крыломъ. Растетъ на поляхъ, на холмахъ около дорогъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Молодую траву ѣдятъ вмѣсто салата (Рис. 134.)

МЕДИЦИНСКАЯ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Изъ свѣжихъ листьевъ Кресса полевого выжимаютъ сокъ, который считается полезнымъ отъ цынги, желтухи и водяной болѣзни. Сокъ принимаютъ по столовымъ ложкамъ нѣсколько разъ въ день, его разводятъ молочной сывороткой.

Крессъ родниковый, см. Крессъ водяной (*Nasturtium officinale* Rch.).

Крессъ садовый, см. Крессъ-салатъ (*Lepidium sativum* L.).

Крессъ смольный, см. Сердечникъ полевой (*Cardamine pratensis* L.).

Крестъ-салатъ (*Lepidium sativum* L.). Фармацевт. назв. *Nasturtium hortense*. Крестъ садовый, огородный, Жеруха (Малор.), Жеруха, Жеруха садовая, Ръзуха. Крестъ-салатъ представляетъ изъ себя однолѣтнюю траву изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), родомъ изъ западной и средней Азии. Разводится, какъ ранній салатъ, для чего сѣмена высквашиваютъ на мокрый войлокъ и выставляютъ на свѣтъ. Въ пищу употребляютъ молодые сѣянцы (10—15 дневные).

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Свѣжовыжатый сокъ въ народѣ употребляется вмѣстѣ съ сывороткой отъ цынги, каменной болѣзни, запоровъ и отъ водянки. Изъ толченыхъ сѣмянъ и травы готовится масло, которое считается полезнымъ отъ чесотки, какъ для людей, такъ и для скота. Толченныя сѣмена принимаются и внутрь. Для этого ихъ смѣшиваютъ съ медомъ и дѣлаютъ кашку, или же отваръ, который считается полезнымъ отъ глистовъ; на приемъ берется отъ $\frac{1}{2}$ —1 драхмы (2,0—4,0 грм.)

Крестъ, см. Сердечникъ горькій (*Cardamine amara* L.).

Крестъ Петровъ, см. Астрagalъ солодколистный (*Astragalus glycyphylus* L.).

Крестъ Петровъ, см. Купеца лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).

Крестъ Петровъ, см. Перелестъ соколий (*Gentiana cruciata* L.).

Крестъ Петровъ, см. Петровъ крестъ (*Lathraea Squamaria* L.).

Крестъ Петровъ, см. Чина весенняя (*Orobis vernus* L.).

Крестъ Петровъ, см. Погремокъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista Galli* L.).

Крестъ Петровъ, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).

Крестъ Петровъ, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).

Крестъ-травя, см. Вороній глазъ (*Paris quadrifolia* L.).

Крестовикъ, см. Кокунникъ обыкновенный (*Gymnadenia conopsea* Rich.).

Крестовикъ, см. Истодъ обыкновенный (*Polygala vulgaris* L.).

Крестовикъ, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).

Крестовикъ, см. Крестовникъ обыкновенный (*Senecio vulgaris* L.).

Крестовникъ, см. Истодъ обыкновенный (*Polygala vulgaris* L.).

Крестовникъ, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).

Крестовникъ, см. Желтуха (*Senecio Jacobea* L.).

Крестовникъ клейкій (*Senecio viscosus* L.). Желтуха. Весьма близкій видъ къ крестовнику лѣсному. Отличается отъ него только присутствіемъ липкихъ железистыхъ волосковъ на стебляхъ, листьяхъ и оберткахъ и сильнымъ своеобразнымъ запахомъ. (См. ниже описаніе крестовника лѣсного (*Senecio silvaticus* L.). Этотъ видъ точно такъ-же, какъ и лѣсной крестовникъ, встрѣчается только на песчаныхъ мѣстахъ въ западной Россіи и весьма рѣдко въ средней.

Крестовникъ лѣсной (*Senecio silvaticus* L.). Самостой. Само-

стой. Лѣсной крестовникъ представляетъ изъ себя однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (Compositae Adans.), распространенное въ средней и южной Европѣ, встрѣчающееся въ западной Россіи и очень рѣдко въ средней полосѣ, выши. 7—14 вершковъ, слегка перистое или почти голое. Листья перисто-раздѣльные, съ продолговатыми зубчатыми долями; цвѣты желтые, въ мелкихъ цилиндрическихъ головкахъ, снабженные обертками, состоящими изъ одного рода одинаковыхъ листочковъ, при основаніи которыхъ есть еще рядъ мелкихъ наружныхъ листочковъ. Цвѣтоложе голое, плоское. Краевые женскіе цвѣты язычковые, желтые, расположенные въ одинъ рядъ; срединные—обоеполовые, трубчатые; тычинокъ 5, спаянныхъ пыльниками въ трубочку; черезъ которую проходитъ столбикъ; лопасти столбика въ обоеполовыхъ цвѣткахъ на верхушкѣ притуплены. Завязь нижняя, одногнѣздная. Плодъ—сѣмянка съ летучкой изъ простыхъ тонкихъ волосковъ. Растетъ на песчаныхъ мѣстахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. (Рис. 135.)

Крестовникъ обыкновенный (*Senecio vulgaris* L.). Фармацевтическое названіе обыкновеннаго крестовника *Senecio s. Erigeron* (Herba). Баранчикъ (Вор.), Дымокурки, Живительная трава, Золотая трава, Крестовникъ, Крестовикъ, Кульбаба, Паличникъ. (Екат.). Примесь-трава, Приметовая трава, Старина. Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (Compositae Adans.), весьма обыкновенная и трудно искоренимая сорная трава, распространенная въ Европѣ и въ Россіи. Листья перисто-раздѣльные, съ неравномѣрно зубчатыми долями, почти голые или паутинисто-шерстистые. Желтые цвѣты въ довольно мелкихъ цилиндрическихъ головкахъ, въ негустой щиткообразной метелкѣ и снабжены обертками; послѣднія состоятъ изъ одного ряда одинаковыхъ внутреннихъ листочковъ, при основаніи которыхъ идетъ рядъ мелкихъ наружныхъ при верхушкѣ черныхъ листочковъ, числомъ 8—10, въ 4—6 разъ короче внутреннихъ. Цвѣтоложе плоское, голое. Цвѣтовъ женскихъ язычковыхъ нѣтъ; прочіе цвѣты—обоеполовые трубчатые. Тычинокъ 5, сросшихся пыльниками въ трубочку, черезъ которую проходитъ столбикъ, съ притупленными наверху лопастями. Завязь нижняя, одногнѣздная. Плодъ—сѣмянки съ хохолкомъ. Обыкновенный крестовникъ растетъ на поляхъ, въ садахъ и огородахъ и цвѣтетъ постоянно съ весны до поздней осени.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ настоящее время растение это употребляется только въ народной медицинѣ. Отваренная или стертая съ масломъ трава прикладывается къ отвердѣвшимъ груднымъ железамъ, геморроидальнымъ шишкамъ, нарывамъ и также при ломотѣ. Выжатый сокъ принимается внутрь отъ глистовъ, колики и истерическихъ судорогъ. Въ Англіи крестовникъ служитъ кормомъ для канареекъ.

Крестовникъ тонколистый (*Senecio erucaefolius* L.). Девятилыльникъ, Желтожилъ, Самостой. Тонколистый крестовникъ

- есть многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «сложно-цвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное въ средней Европѣ, въ средней и южной Россіи. Корневище тонколистнаго крестовника ползучее; стебель, выш. отъ 7 вершк. до 1½ арш., прямой, высокій, часто вѣтвистый, немного паутинисто-шерстистый. Листья снизу нѣсколько пушистые, глубокораздѣленные на зубчатая или перисто-раздѣльныя линейныя доли и снабженные при основаніи маленькими цѣльнокрайними усиками. Блѣдно-желтые цвѣты въ колокольчатыхъ головкахъ средней величины, собранныхъ въ густой щиткообразной метелкѣ и снабженныхъ обертками изъ наружныхъ 4—6 шиловидныхъ, прижатыхъ листочковъ, которые вдвое короче продолговатыхъ внутреннихъ листиковъ. Цвѣтоложе голое, плоское. Краевые женскіе цвѣты—язычковые, желтые, простертые, длиннѣе обертки, прочіе—обоополовые, трубчатые. Тычинокъ 5, спаянныхъ пыльниками въ трубочку, черезъ которую проходитъ столбикъ съ притупленными лопастями. Завязь нижняя, одногнѣздная. Плодъ—пушистыя сѣмянки съ хохолкомъ. Растетъ на влажныхъ мѣстахъ и между кустарниками. Цвѣтетъ лѣтомъ.
- Крестовый корень**, см. Кардобенедикъ (*Carduus benedictus* Gaertn.).
- Крестовый корень**, см. Соколий перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).
- Крестовая трава**, см. Герань кроваво-красная (*Geranium sanguineum* L.).
- Кржусъ**, см. Сафлоръ красильный (*Carthamus tinctorius* L.).
- Кривавникъ**, см. Вербейникъ обыкнов. (*Lysimachia vulgaris* L.).
- Кривецъ заячій**, см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).
- Кривопускъ**, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea millefolium* L.).
- Кривца заячья**, см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).
- Крикунъ**, см. Вехъ ядовитый (*Cicuta virosa* L.).
- Криничникъ**, см. Горичникъ болотный (*Peucedanum palustre* Moench.).
- Крипъ удольный**, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).
- Кривца**, см. Звѣробой обыкнов. (*Hypericum perforatum* L.).
- Кровавецъ**, см. Звѣробой обыкнов. (*Hypericum perforatum* L.).
- Кровавецъ**, см. Гулявникъ струйчатый (*Sisymbrium Sophia* L.).
- Кровавикъ**, см. Чихотная трава (*Ptarmica vulgaris* DC.).
- Кровавикъ**, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).
- Кровавикъ красный**, см. Горлецъ, раковья шейки (*Polygonum bistorta* L.).
- Кровавленникъ** } см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea*
Кровавникъ } *millefolium* L.).
- Кровавникъ**, см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).
- Кровавникъ**, см. Смолка (*Lychnis viscaria* L.).
- Кровавникъ**, см. Чихотная трава (*Ptarmica vulgaris* DC.).

Кровавница, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea millefolium* L.).

Кровавница, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).

Кровавница, см. Вербейникъ обыкновенный (*Lysimachia vulgaris* L.).

Крованыкъ, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea Millefolium* L.).

Кровебой, см. Блошница проносная (*Inula disenterica* L.).

Кровникъ, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).

Кровникъ, см. Авранъ лекарственный (*Gratiola officinalis* L.).

Кровогонъ, см. Можжевельникъ казацкій (*Juniperus sabina* L.).

Кроволисточникъ, см. Черноголовникъ кровохлебковый (*Poterium Sanguisorba* L.).

Кровопускъ, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea millefolium* L.).

Кровососка лечебная, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.).

Кровохлебка, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.).

Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.). Фармацев. назв. *Pimpinella italica* (Rad.). Лекарственная кровохлебка имѣетъ названія: Бедрепецъ, Выпадышная, Грыжникъ, Яловый золотникъ (Хар.), Каточки, Катышки (Вор.), Красноголовникъ обыкновенный (Сиб.), Красные корни, Кровососка лечебная, Кровохлебка, Луговка, Мышьякъ, Ноголоватень, Огорошникъ (Екат.), Простудная трава (Волог.), Прутыкъ (Вор.), Радовикъ, Рядовикъ (Малор.), Дикая рябина (Влад., Каз.), Лѣсная рябинка (Нижег.), Рябинникъ (Перм.), Серебряный листъ (Уф.), Снурокъ (у Якут.), Совья стрѣла, Совина стрѣла, Сабина (Орл., Курск.), Суховолотица (Укр., Малор.), Трудница, Ужачье зелье (Волин.), Угрімъ (Орл.), Хлѣбенка, Черноголовникъ, Чернотравъ, Шишечки (Ниж.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), распространенное въ Европѣ и въ Россіи. Стебель прямой, гранистый, наверху вѣтвистый, выш. 7 вершк.—1 арш. Листья непарно-перистые, съ 9—13 пыльчатыми листочками. Кровино-красные цвѣты въ продолговатыхъ головкахъ, сидящихъ на длинныхъ ножкахъ. Цвѣтоложе при основаніи съ прицвѣтниками, трубчатое, суженное на краю кольцомъ, твердѣющее при плодахъ. Чашечка 4-храздѣльная, послѣ цвѣтенія опадающая, лепестковъ нѣтъ; тычинокъ 4, столь-же длинныхъ, какъ доли чашечки; Пестикъ состоитъ изъ 1-го плодolistика и 1 верхушечнаго нитевиднаго столбика съ головчатымъ рыльцемъ, покрытымъ шишами. Плодъ—сѣмянка, заключенная въ отвердѣвающимъ 4-хгранномъ цвѣтоложѣ. Растетъ на лугахъ и между кустарниками. Цвѣтетъ лѣтомъ. (Рис. 136.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ прежнее время растение это употреблялось въ медицинѣ, какъ стягивающее средство, отъ гор-

Кровныхъ болѣзней, отъ кровотеченій и поносовъ, теперь совсѣмъ оставлено. Въ народѣ оно употребляется до сихъ поръ отъ чихотки, отъ боли въ груди, животѣ и поясницѣ; также отъ выпаденія прямой кишки. Кромѣ того, растеніе это считается очень хорошей кормовой травой, для чего разводится искусственно.

Кровохлебка маленькая (*Sanguisorba minor* L.). Походить на предыдущій видъ, но меньше ростомъ (см. выше описаніе: кровохлебка лекарственная, *Sanguisorba officinalis* L.). Отличается только тѣмъ, что нижніе цвѣты головокъ тычиночныя (мужскіе), а верхніе пестичныя (женскіе); головки сперва зеленныя, потомъ красноватыя; тычинокъ много. Встрѣчается на сухихъ каменныхъ мѣстахъ и холмахъ, преимущественно на известковой почвѣ въ западной и юго-западной Россіи, на Кавказѣ, Сибири и Туркестанѣ. Цвѣтетъ съ мая по июль. Разводится изрѣдка, какъ салатъ и въ кормъ скоту. (Таб. XXIII, фиг. 130.)

Кровоцвѣтникъ, см. Иссопъ лекарственный (*Issopus officinalis* L.).

Кровца } см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).

Кровца заяча } *ratum* L.).

Кровь, см. Герань кроваво-красная (*Geranium sanguineum* L.).

Кровь дивоча, см. Бобовникъ (*Amygdalus nana* L.).

Кровь заяча, см. Звѣробой обыкновен. (*Hypericum perforatum* L.).

Кровь заячья, см. Молочай лозный (*Euphorbia virgata* L.).

Кровь заячья, см. Майникъ двулист. (*Maianthemum bifolium* L.).

Кровь Іоанна Крестителя, см. Дивала однолѣтняя (*Scleranthus annuus* L.).

Кровь молодецкая, см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).

Кровь человѣчья, см. Травянка (*Dianthus deltoides* L.).

Кровякъ, см. Девясиль подсолнечный (*Inula Helenium* L.).

Кровянка, см. Девясиль британскій (*Inula britannica* L.).

Крокишъ } см. Сафлоръ красильный (*Carthamus tinctorius* L.).

Крокисъ }

Крокосъ }

Крокосъ, см. Хатма тюрингенская (*Lavatera thuringiaca* L.).

Крокусъ, см. Сафлоръ красильный (*Carthamus tinctorius* L.).

Кропъ, см. Укропъ обыкновенный (*Anethum graveolens* L.).

Кропъ, см. Укропъ конскій (*Oenanthe Phellandrium* Lam.).

Кропъ польный, см. Пастернакъ огородный (*Pastinaca sativa* L.).

Кропива жоліча, см. Крапива двудомная, или большая (*Urtica dioica* L.).

Кропило, см. Донникъ лекарственный (*Melilotus officinalis* Lam.).

Кропило, см. Земляныя орѣшки (*Spiraea filipendula* L.).

Кропило водяное, см. Укропъ конскій (*Oenanthe Phellandrium* L.).

Круглолистъ, см. Фіалка опушенная (*Viola hirta* L.).

Кругломошоночникъ, см. Икотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* Dc.).

Кружевина, см. Крыжовникъ (*Ribes crassularia* L.).

Кружевное дерево (*Lagetta lintearia* Lam.). Дерево родомъ изъ Востъ-Индіи. Листъ имѣетъ видъ кружева и служить для обвертыванія иностранныхъ сигаръ.

Крыжовникъ, см. Крыжовникъ (*Ribes crassularia* L.).

Крупенька, см. Аютины глазки (*Viola tricolor* L.).

Крупеньки, см. Легочница лекарств. (*Pulmonaria officinalis* L.).

Крупка, см. Верескъ обыкновенный (*Calluna vulgaris* Salisb.).

Крупка, см. Крупка весенняя (*Draba verna* L.).

Крупка весенняя (*Draba verna* L.). Быльникъ, Сухоребрица, Крупка, Тачка, Чистецъ (Малороссія), Скудолистникъ, Рижуха. Однолѣтнее небольшое травянистое растеніе изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), весьма обыкновенное въ Европѣ и въ Россіи. Всѣ листья прикорневые, собранные розеткой; цвѣты мелкіе, бѣлые. Чашечка 4-хлестная; вѣнчикъ 4-лепестный, лепестки расположены на-крестъ. Тычинокъ 6; плодъ — продолговато-эллиптическіе, широкоперегородчатые, плоскіе стручки. Растетъ на песчаныхъ холмахъ, въ степяхъ и около дорогъ. Цвѣтетъ весною.

Крупялки, см. Сосна обыкновенная (*Pinus silvestris* L.).

Крупяникъ, см. Чихотная трава (*Ptarmica vulgaris* Dc.).

Кручка, см. Брюква (*Brassica Napus* L.).

Круши-камень, см. Укропъ конскій (*Oenanthe Phellandrium* L.).

Крушина, см. Кленъ татарскій (*Acer tataricum* L.).

Крушина, см. Бересклетъ европейскій (*Evonymus europaeus* L.).

Крушина, см. Бирючина обыкновенная (*Ligustrum vulgare* L.).

Крушина, см. Крушина слабительная (*Rhamnus cathartica* L.).

Крушина, см. Крушина ломкая (*Rhamnus frangula* L.).

Крушина игольная } см. Крушина слабительная (*Rhamnus*

Крушина колючая } *cathartica* L.).

Крушина красная, см. Ююба (*Zizyphus vulgaris* L.).

Крушина ломкая (*Rhamnus frangula* L.). Фармацевтическое названіе ломкой крушины: *Rhamnus frangula* s. *Alnus nigra*. Боллакъ, Болданъ, Боярышникъ (Вор.), Волчье дерево, Волчьи ягоды, Гнилое дерево, Крушина, Крушинина (Пск.), Карлушина, Карушинникъ, Корушатникъ, Медвѣжина, Пороховое дерево, Праховое дерево, Свидъ (Гродн.), Собачьи ягоды, Сорочьи ягоды (Симб.), Черемоха (Вил., Гродн.), Шаклакъ. (Таб. XXIII, фиг. 125.) Ломкая крушина представляетъ изъ себя кустарникъ выш. до 1 саж., лиственный колючекъ, съ гладкой, испещренной бѣлыми крапинами (чечевичками) корой, изъ семейства «крушиновыхъ» (*Rhamnaceae* R. Br.), распространенный въ Европѣ, Россіи и въ Сибирѣ. Листья очередные, эллиптическіе, заостренные, цѣльнокрайніе. Зеленоватыя цвѣты собраны пучками въ углахъ листьевъ, двудомные. Чашечка 4—5-раздѣльная, съ отваливающимися долями и чашеобразною трубкой. Лепестковъ 4—5, прикрѣпленныхъ къ зѣву чашечки. Тычинокъ столько-же, супротивныхъ лепесткамъ. Завязь 2—4-гнѣздная, съ простымъ 2—4-х-раздѣльнымъ столбикомъ. Плодъ—

костянки: незрѣлыя—краснаго цвѣта, по созрѣваніи—черныя. Цвѣтетъ въ маѣ и юнѣ.

Незрѣлыя костянки доставляютъ желтую краску, а зрѣлыя—зеленую. Высокаго качества древесный уголь, получаемый отъ сжиганія крушины, употребляется при составленіи пороха. Плоды и настой коры дѣйствуютъ, какъ слабительное.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Кора крушины употребляется, какъ слабительное средство, при хроническихъ запорахъ. Свѣжій кору крушины имѣетъ непріятный запахъ, откуда произошло нѣмецкое названіе крушины *Faulbaum*—гнилое дерево. Въ настоящее время въ аптекахъ приготавливаютъ такъ называемый жидкій экстрактъ крушины «*extractum fluidum Rhamni frangulae*», одна чайная ложка котораго, принятая на ночь, дѣйствуетъ безъ боли, какъ хорошее слабительное. Кромѣ того, изъ сушеной коры крушины приготавливаютъ отваръ: на $1\frac{1}{2}$ стакана воды берутъ столовую ложку крушины и кипятятъ, пока не останется стаканъ; такой отваръ принимаютъ на ночь и утромъ на-тощакъ по 2 столовыхъ ложки. Къ отвару крушины прибавляютъ слабительныя соли (напр., 1 столовую ложку англійской соли). Также крушина вывѣсъ съ ревнемъ идетъ въ составъ различныхъ слабительныхъ пилюль. Въ Архангельской губерніи ягоды крушины употребляютъ отъ водяной болѣзни, въ Нижегородской отваръ коры—отъ лихорадки, въ Пермской—отъ чесотки у дѣтей, въ Волынской губ.—отъ чесотки у скота.

Крушина слабительная (*Rhamnus cathartica* L.). Фармацевтическое назван. слабительной крушины: *Spina cervina s. domestica*. Барыня-ягода (Сарат.), Бергатица, Бирючина, Жерить (Екат.), Жереть (Умань), Жесторъ, Жестовникъ (Ставр.), Жестъ, Жестъ (Ворон.), Жестеръ, Жостеръ, Жостеръ (Малор.), Жостеръ (Полт., Хар., Курек., Ворон.), Жостиръ (Малор.), Жостикъ (Новор.), Застиръ (Гродн.), Зостиль придорожная иглока, Иголка подорожная, Иголко, Крушина игольная, колючая, Крушинникъ, Корунатникъ (Самар.), Проскурина (Новор.), Тересъ (Вор.), Ткенна, Собачьи ягоды, Черноягодникъ (Ставр.), Черемха (Бесс.), Хробость. Слабительная крушина представляетъ изъ себя кустарникъ выш. до 2 сажень изъ семейства «крушиновыхъ» (*Rhamnaceae* R. Br.), распространенный почти во всей Европѣ, въ западной, средней и южной Россіи, съ вѣтвями, оканчивающимися колючкою; листья супротивные, округло-ланцетные, мелко-пильчатые. Мелкіе зеленоватые цвѣты сгруппированы пазушными пучечками. Чашечка 4—5-тираздѣльная. Лепестковъ 4—5. Тычинокъ столько-же. Завязь нижняя, одногнѣздная, съ простымъ столбикомъ, съ 2—4-храздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ—черныя костянки величиною съ горошину. Растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками. Цвѣтетъ лѣтомъ. Для употребленія собираются плоды и кора. Изъ незрѣлыхъ костянокъ добываютъ желтую краску, изъ зрѣлыхъ—зеленую. Кора крушины черезъ вывариваніе даетъ желтую краску. Древесина пригодна для разныхъ токарныхъ издѣлій. (Рис. 137.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Этотъ видъ крушины мало употребляется врачами. Изъ нея въ аптекахъ приготавливаютъ сиропъ (*Syrupus spinæ cervinæ*), который прибавляется въ различные мочегонныя микстуры.

Въ ветеринарной народной медицинѣ крушину даютъ животнымъ, какъ слабительное средство; для этого хорошую горсть крушиновой корки или ягодъ отвариваютъ въ бутылкѣ пива, которую и вливаютъ въ поило.

Крушинникъ, см. Крушина слабительная (*Rhamnus cathartica* L.).

Крыгъ берсень }
Крыжъ } см. Крыжовникъ (*Ribes crossularia* L.).
Крыжъ берсень }

Крыжовникъ (*Ribes crossularia* L.). Фармацевтическое название: *Crossularia* vel. *Uva crispus* (Вассак.). Крыжовникъ называется: Агрестъ, Аресъ, Агрисъ, Агрустъ (Малор. и Бѣлор.), Крыжъ, Крыжъ-берсень, Крыгъ-берсень, Берсень, Кружовникъ, Кружевина, Кустарникъ, выш. до 2 аршинъ, изъ семейства «смородиновыхъ» (*Crossulariaceae*), встрѣчающееся въ дикомъ состояніи въ западной, средней Россіи и на Кавказѣ. Вѣтви съ острыми, простыми или 3-храздѣльными, шипами, сидящими у основанія листьевъ. Листья маленькіе, коротко-черешковатые, округлые, 3—5-тилопастные. Зеленоватые или красноватые мелкіе цвѣты по 1—3 въ кистяхъ. Долей чашечки, лепестковъ и тычинокъ 4—5; завязь нижняя, одногнѣздная, многосѣмянная. Плодъ—ягоды. Ягоды дикаго крыжовника, распространенныя въ средней и южной Европѣ,—мелкія, желтыя, покрытыя щетинками. Путемъ многолѣтней культуры произошли многочисленные воздѣлываемые крупноплодные сорта, различающіеся между собою цвѣтомъ (красные, желтые, зеленые), опушеніемъ (голые и волосистые) и величиною плодовъ, употребляющихся какъ въ сыромъ, такъ и въ вареномъ видѣ въ пищу. (Таб. XXIII, фиг. 131 и 132.)

Крыжовникъ дикій, см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).

Крыжовникъ удольный, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).

Крыло вороново, см. Папоротникъ черный (*Struthiopteris germanica* L.).

Крышталки, см. Звѣробой обыкновен. (*Hypericum perforatum* L.).

Ксантія, см. Дурнишникъ обыкновен. (*Xanthium Strumarium* L.).

Кстеника, см. Костяника (*Rubus saxatilis* L.).

Кубанка, см. Арнаутка (*Triticum durum* L.).

Кубикъ, см. Горчица ястребинковая (*Picris hieracioides* L.).

Кубника, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).

Кубника болотная, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).

Кубника желтая } см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).
Кубышечникъ прирѣчный }

Кубышки алыя или пестрыя, см. Бадма (*Nelumbium caspicum* Fisch.).

Кувитликъ, см. Петрушка горная (*Peucedanum Oreoselinum* Moench.).

Кувшинка, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith).

Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.). Фармацевтич. назв.: *Nuphræa lutea*. Желтая кувшинка имѣетъ слѣдующія мѣстныя названія: Балаболки (Олон.), Бубенчики желтые, Водолеѣ, Вахтарѣчная (Костр.), Вахтовникъ желтый (Астр.), Глечичокъ, Глечечки, Глечики желтые, Глечики жовті (цвѣты), Горляшное сѣмя, Горлачики, Грибовница, въ Малороссіи цвѣты назыв.: Бобки, Бабки, плоды—Збанокъ, Збаночки, листья—Капелюшки, а корень—Товстунъ. Жбанки, Запонки (плоды въ Тотьмен. уѣздѣ), Кубника, Кубника желтая, Кубышечникъ прирѣчный (Тв.), Кувшинчики желтые, Кувшинка, Кушава, Купавка, Купавка желтая (Печерск.), Купальница, Лапунникъ водяной, Лапуха водяная (Арх.), Лапухъ водяной, Лапитникъ (Олон.), Латаѣе желто (Моск.), Жовтѣ латаѣе (сред. цвѣты), Латаѣе челоѣе (Умань), Латаѣе желтая, Латахъ (Волын.), Лилія желтая или водяная, Лилія, Лилея (Бѣлор.), Водяной макъ (Малор. цвѣты), Макъ желтый водяной (Малор.), Маковки водяныя, Моръ куриный (Нижег.), Плавунцы желтые (Мог.), Пуговка (Нижег.), Пулавка желтая (Тв.), Шобольникъ, Шалобольникъ (цвѣты). Многолѣтнее водяное, съ ползучимъ корневищемъ, растение изъ семейства «кувшинковыхъ» (*Nuphræaceae* DC.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Округлые листья съ глубоко-сердцевиднымъ основаніемъ: листья плаваютъ на поверхности воды, а желтые цвѣты выставляются изъ воды на 1—1½ верш. Чашелистиковъ 5; лепестковъ много, прикрѣпленныхъ къ цвѣтоложу. Завязь многогнѣздная, съ сидячимъ лучистымъ рыльцемъ. Цвѣты пахучіе. Плодъ сочный ягодообразный. Растетъ въ прудахъ и медленно текущихъ водахъ. Цвѣтетъ съ іюня до августа. Корни растения во время голода употребляются въ пищу. (Та б. XXIV, фиг. 134.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Растеніе это въ настоящее время употребляется только какъ народное средство. Свѣжіе листья прикладываются къ воспалительнымъ опухолямъ, также при головной боли кладутся на голову, при этомъ замѣчаютъ, что если листья сохнутъ, значить—приписли по недугу, если же остаются мокрыми, то не принесутъ пользы. Корень растения у торговцевъ носитъ названіе одоленья и продается отъ всевозможныхъ болѣзней.

Кувшинки, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith).

Кувшинчики, см. Бадна (*Nelumbium caspicum* Fisch.).

Кувшинчики боровые, см. Ястребинка волосистая (*Hieracium Pilosella* L.).

Кувшинчики желтые, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).

Куга, см. Тростникъ обыкновенный (*Arundo Phragmites* L.).

Куга, см. Камышъ озерный (*Scirpus lacustris* L.).

Куга, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).

Куга гранатая, см. Сусакъ зонтичный (*Butomus umbellatus* L.).

Кугольникъ, см. Купальница европейская (*Trollius europaeus* L.).

Кудель-барашки } см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula*
Куделька } *officinalis* Jacq.).

Кудеръ, см. Гулявникъ струйчатый (*Sisymbrium Sophia* L.).

Кудра, см. Скерда кровельная (*Crepis tectorum* L.).

Кудра, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).

Кудри, см. Репяшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).

Кудри, см. Скерда кровельная (*Crepis tectorum* L.).

Кудри царевы, см. Кукушкинъ ленъ (*Polytrichum commune* L.).

Кудри царскія (*Lilium Martagon* L.). Фармацевтическое названіе растенія «царскія кудри»: *Martagon* s. *Asphodelus spurium*. Бадуй, Бадунъ, Бодойка, Богдайка, Желтуха, Голубиныя звончики (Гродн.), Зубарье (Курск.), Лѣсные колокольчики (Курск.), Золотой корень, Кульчики (Гродн.), Лилія лѣсная, пестрая, красная, чалмовидная, турецкая, Лилія лѣсна (Малор.), Масло, Масленка, Масленокъ (Сарат., Симб., Орл.), Маслянка (Укр.), Масляночка (Малор.), Земляное мыло (Тул.), Овсянка, Сарана (Перм.), Саранка, Сарана желтая, Сарана турецкая алая, Сарзана, Араканъ. Луковичное растеніе изъ семейства «лилейныхъ» (*Liliaceae* DC.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ Россіи довольно обыкновенное. Луковица желтая, состоящая изъ многихъ мясистыхъ чешуй. черепичато-расположенныхъ, легко отламывающихся. Цвѣточный стебель высокій, наверху шершаво-перистый, облиственный; листья кольчато-расположенные по 5—6 въ кольцахъ, эллиптически-ланцетные, суженные въ короткій черешокъ, верхніе—спиральные, менѣе крупные. Влѣвовато-красныя цвѣты съ темными крапинками внутри, въ числѣ 3—10, въ короткой кисти, на длинныхъ ножкахъ, поникающіе. Околоцвѣтникъ 6-тилистный, отпадающій, съ отогнутыми листочками; тычинки съ качающимися пыльниками. Завязь верхняя, 3-хгнѣздная, съ столбикомъ, кверху утолщеннымъ и снабженнымъ толстымъ 3-хлопастнымъ рыльцемъ. Плодъ—тупошестиугольная коробочка съ многочисленными сплюснутыми сѣменами въ каждомъ гнѣздѣ. Растетъ въ лѣсахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. (Табл. XXV, фиг. 141.)

Въ Сибиріи луковичы растенія употребляютъ въ пищу, сырыя и испеченныя въ золѣ, либо сваренныя въ водѣ, съ молокомъ и коровьимъ масломъ. Сушенныя луковичы употребляются иногда якутами вмѣсто муки для приготовленія молочной или жирной каши. Киргизы кладутъ луковичы въ овечьій сыръ для приправы. Въ Пермской губерніи изъ луковичъ добывается черная краска.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ Казанской губерніи растеніе это употребляется въ народѣ отъ желтухи. Листья прикладываютъ къ обожженнымъ мѣстамъ (въ Кіевской губ.). Въ Волынской губ. даютъ коровамъ для прибавленія у нихъ молока.

Кудри царскія, см. Пресвирикъ лѣсной (*Malva silvestris* L.).

Кудрявецъ, см. Гулявникъ струйчатый (*Sisymbrium Sophia* L.).

Кудрявецъ, см. Марь многосѣмянная (*Chenopodium polyspermum* L.).

Кудрявецъ (*Chenopodium Botrys* L.). Фармацевтическое название: *Botrys vulgaris*, s. *postralis*. Быть божій, Лебеда душистая, Марь курчавая, Марь, Миръ, Николаева трава, Иерусалимъ, Чернобыль, Чернобыльникъ, Чернобыль турецкій. Кудрявецъ есть однолѣтнее травянистое свѣтло-зеленое растеніе изъ семейства «солончаковыхъ» (*Chenopodiaceae* Vent.), распространенное въ средней и южной Европѣ, встречающееся въ средней, южной и юго-западной Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ и въ Туркестанѣ. Стебель прямой, простой или съ верхъ-обращенными вѣтвями; листья спиральные, тупые, съ тупыми лопастями; цвѣтки въ негустыхъ, развилисто-вѣтвистыхъ полузонтикахъ, въ углахъ верхнихъ листьевъ, собранныхъ длиннымъ, узкимъ, метельчатымъ соцвѣтіемъ, обоеноловые. Околоцвѣтникъ пятираздѣльный; приплодъ незамкнутый; тычинокъ 5. Завязь свободная; одногнѣздная; рылецъ 2, рѣже 3—5 нитевидныхъ. Плодъ всегда чечевицеобразный, прирѣзанный къ серединѣ широкой нижней поверхности. Растетъ на сорныхъ мѣстахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Въ Киевской губерніи употребляется для мытья головы отъ струшвѣ.

Кудрявецъ, см. Гулявникъ стручатый (*Sisymbrium Sophia* L.).

Кудрявецъ, см. Козлобродникъ лугов. (*Tragopogon pratensis* L.).

Кудрявецъ полевой, см. Бедренецъ обыкновенный (*Pimpinella Saxifraga* L.).

Кудрявецъ, см. Ижма обыкновенная (*Tanacetum vulgare* L.).

Кудрявикъ, см. Козлобродникъ луговой (*Tragopogon pratensis* L.).

Кудрявицъ, см. Артемизія (*Artemisia Abrotanum* L.).

Кудрявка

Кудрявникъ } см. Козлобродникъ луговой (*Tragopogon pratensis* L.).

Кудрявущи }

Кудряшекъ }

Кужуха, см. Чернокорень обыкновенный (*Cynoglossum officinale* L.).

Кузовица, см. Лоза (*Salix viminalis* L.).

Кузулякъ, см. Бѣлозоръ болотный (*Parnassia palustris* L.).

Куй-бабка, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).

Кукавка, см. Ятрышникъ широколистный (*Orchis latifolia* L.).

Кукишка, см. Циновникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Кукіель см. Куколь (*Lychnis Githago* Scop.).

Кукіль, см. Куколь (*Lychnis Githago* Scop.).

Кукл, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Куклова трава, см. Куколь (*Lychnis Githago* Scop.).

Куколь (*Lychnis Githago* Scop. sin. *Githago segetum* Desf., *Agrostemma Githago* L.). Фармацевтическое назв.: *Lolium officinarum* (Semen), *Githago* s. *Nigellastrum* (Radix). Волошки, Гвоздика полевая, Кукіль (Вел. и Мал. Росс.), Кукіель, Конкаль (Под.), Куклова трава, Гуголь (Бѣлор.), Путикъ, Полевелы, Торица (Каз.).

Однолѣтн. сорная трава, растущая между хлѣбными посѣвами, изъ семейства «гвоздичныхъ» (*Caryophyllaceae*), распространенная по всей Европѣ и Россіи, выш. отъ 14 верш. до 1 арш., сѣвратомохнатая, съ простымъ или слаборазвѣтвленнымъ стеблемъ, покрытымъ мягкими сѣвратыми колосками. Цвѣты красные, рѣдко бѣлые, безъ запаха. Чашечка пятираздѣльная, съ длинными линейными и травянистыми долями, превышающими вѣнчикъ; лепестковъ 5, съ тугою пластинкою; тычинокъ 10; завязь одногнѣзная, съ 5 столбиками; плодъ—одногнѣзная коробочка, раскрывающаяся 5-ю створками, съ почковидными, крупными, бугорчатыми черными ядовитыми сѣменами. Цвѣтетъ лѣтомъ. (Рис. 138.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ народѣ пастой куколя пьютъ отъ болей въ животѣ (въ Калужской и Черниговской губерніи). въ Калужской имъ пользуются, какъ усилительнымъ средствомъ. Для наружнаго употребленія изъ него приготавливаютъ полосканіе для зубовъ. Вообще-же куколь—ядовитое растеніе, и лучше совсѣмъ не употреблять его.

Куколь, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematidis* L.).

Куколь, см. Артемизія (*Artemisia Abrotanum* L.).

Куколь, см. Ястребинка зонтичная (*Hieracium umbellatum* L.).

Куколь, см. Ятрышникъ широколистный (*Orchis latifolia* L.).

Куколь-баба, см. Люцерна серповидная (*Medicago falcata* L.).

Куколь горькій, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).

Куколь луговой, см. Воробейникъ обыкновенный (*Lysimachia vulgaris* L.).

Куколь мышей трава, см. Плевель многолѣтній (*Lolium perenne* L.).

Куколь прямой, см. Дрема кукушкинъ цвѣтъ (*Lychnis poscuculi* L.).

Куколица }
Куколица } см. Хлопушка (*Silene inflata* Smith.).

Кукольникъ, см. Хатьма тюрингенская (*Lavatera thuringiaca* L.).

Кукоричка, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).

Кукотина, см. Дягиль лекарственный (*Angelica archangelica* L.).

Кукулярія, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).

Кукуруза, см. Кукуруза обыкновенная (*Zea Mays* L.).

Кукулка, см. Ятрышникъ широколистный (*Orchis latifolia* L.).

Кукуруза обыкновенная (*Zea Mays* L.). Буярово (Урал.).

Кляшки украинскія, Кики, Кійки, Кіяки, Кяхи (Малор.), Кюшики (Курск.), Китка (Курск.), Кукуруза (Вел. Росс.), Маисъ (В. Росс.), Папуша, Папушя, (Малор.), Пованка, Повонка, Початки (Курск., Орл., Саратов.), Пшеничка, Пшеница бѣлоярая, турецкая, шипшковая (Нижег.), Пашенка (Сарат.), Пшено турецкое, Туроць. (Табл. XXIV, фиг. 133.) Обыкновенная кукуруза представляетъ изъ себя однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), родомъ изъ Южной Америки, разводится въ Европѣ, въ Россіи въ юго-западныхъ губерніяхъ, въ Крыму и

на Кавказѣ. Стебель сплошной, выш. отъ $1\frac{1}{2}$ арш. до 1 саж., съ широко-линейными очередными листьями. Цвѣтки двуполовые: тычиночные (мужскіе)—свѣтло-зеленые, иногда красноватые, собраны верхушечною метелкою, а пестичные (женскіе)—въ початкахъ, сидящихъ въ углахъ листьевъ. Колоски 2-цвѣтные, но въ пестичныхъ колоскахъ только одинъ цвѣтокъ плодущій, съ очень длиннымъ нитевиднымъ столбикомъ. Плодъ—крупныя зерновки, округло-почковидныя; болѣе или менѣе сплюснутыя, желтыя, бѣлыя или бурныя, красноватыя или пестрыя, смотря по сорту; онѣ расположены на толстомъ стержнѣ початка въ 6—8 рядовъ, сближенныхъ попарно. Разводится кукуруза во многихъ сортахъ. Родится она на всякой землѣ, хорошо вспаханной и удобренной. Землю распахиваютъ обыкновенно 2 раза: осенью и весною незадолго до посѣва; при послѣдней распахкѣ земля удобряется навозомъ. Сѣмена для посѣва должны выбираться самыя лучшія, изъ нижнихъ частей колосевъ. Для посѣва нужно ждать теплаго времени—кукуруза боится самыхъ небольшихъ морозовъ. При сѣяннѣ зеренъ не нужно зарывать ихъ глубоко въ землю, достаточно, чтобы она покрывала ихъ на 1 дюймъ. Всходы зависятъ отъ погоды: чѣмъ она теплѣе, тѣмъ скорѣе явятся всходы. Когда они достигаютъ высоты 3—4 дюйм., ихъ нужно выдолоть и перекопать землю между рядами. Черезъ нѣсколько времени надобно сдѣлать другую перепашку и оконать каждое растение землею. Третья перепашка производится передъ цвѣтеніемъ. При второй и третьей перепашкѣ полезно обламывать боковыя вѣтки, которыя, поглощая сокъ, препятствуютъ образованію колосевъ. Во многихъ мѣстахъ послѣ цвѣта срѣзаютъ верхнюю стеблей для корма скоту и обрываютъ большую часть листьевъ, что, однако, должно производиться незадолго до полного созрѣванія колосевъ. Кукуруза поспѣваетъ въ теченіе 4 мѣсяцевъ. Зрѣлость ея узнается по высыханію листьевъ и степени жесткости зеренъ. При созрѣваннѣ послѣднихъ, колосы обрываются руками и раскидываются въ сухомъ мѣстѣ для просушки. Когда оболочки зеренъ высыхаютъ, ихъ обрываютъ и употребляютъ для скота вмѣсто сѣна, а колосы складываютъ въ житницу, такъ какъ кукуруза лучше сохраняется въ колосьяхъ, чѣмъ вымолоченная. Оставшіеся на полѣ стебли тоже выдергиваютъ; не очень высохшіе—идутъ въ кормъ скоту, остальные могутъ служить на подстилку въ конюшняхъ и хлѣвахъ. Выцелушенные колосы употребляютъ для топки печей, жара они даютъ хотя немного, но оставляютъ въ золѣ довольно поташу. Кукуруза выцелушивается руками или цѣпами, рѣдко вытаптывается лошадьми. Послѣ риса и пшеницы кукуруза есть самое полезнѣйшее растеніе. Зерно ея употребляется въ пищу, доставляя муку, крупу и составляя вообще здоровую, питательную пищу. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сѣять кукурузу для сѣнокоса. Скошенная зеленой, она доставляетъ хорошій кормъ для скота. Покосъ производится съ появленіемъ мужскихъ метелокъ.

Кукурузка, см. Шалфей луговой (*Salvia pratensis* L.).
Кукушечникъ, см. Кукушкинъ лентъ (*Polytrichum commune* L.).
Кукушка, см. Кукушкины слезки (*Orchis maculata* L.).
Кукушка, см. Подорожникъ средний (*Plantago media* L.).
Кукушки, см. Ятрышникъ широколистный (*Orchis latifolia* L.).
Кукушкинъ лентъ (*Polytrichum commune* L.). Купеникъ (Волын.), Кукушечникъ (Вят.), Заячій лентъ (Пск.), Медвѣдь (Орл.), Боровой, болотный мохъ, Желѣзнякъ, Красный мохъ, Кудри цареви, Царскія очи, Загозя рождъ, Скукуче жито. Кукушкинъ лентъ есть самый крупный изъ мховъ Европы. Растеніе двудомное г. е., органы размноженія развиваются на разныхъ экземплярахъ. Плодъ—коробочка, снабженная длинной ножкой и открывающаяся крышечкой. Она несетъ колпачекъ, покрытый длинными волосками. Желтые стебельки этого мха употребляются на щетки.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Горсть травы варятъ въ 12 унційхъ (360 грм.) воды, пока не укипитъ половина жидкости, и пьютъ, подсластивъ медомъ и прибавивъ краснаго вина, отъ сильныхъ маточныхъ кровотеченій, отъ кашля и колотыя въ груди. Отваромъ этого растенія моютъ голову отъ выпаденія волосъ.

Кукушкины дары, см. Ятрышникъ широколистный (*Orchis latifolia* L.).

Кукушкины слезки или слезы (*Orchis maculata* L.). Быковецъ или Буквыця (Волын.). Вымечко (Арх.), Божья трава (Олон.), Зюзюля (Арх.), Зюзюлка (Могил.), Зезюлинъ подарокъ (Гродн.), Змѣвикъ (Тамб.), Конвалія (Минск.), Завизный корень (Яросл.).
 Комонишникъ (Мог.), Корешки, Два корешка (Арх.), Кукушка (Смол.), Ландышъ, Ласъ (Костр.), Любимъ корень (Гв.), Лихорадочная трава (Вят.), Мокруха (Черн.), Невставаха (Нижег.), Пдакунъ трава, Прошибень болотный, Пятипалечная трава, Пятипалишникъ, Соломонидина ручка (Примор. Край), Чертова ручка, Сердечникъ (Гродн.), Сагачка, Собачьи языки. Это—многолѣтняя трава, снабженная клубневиднымъ корневищемъ (корневыми шишками), изъ семейства «орхидныхъ» (*Ochideae* Juss.), распространенная во всей Европѣ и весьма обыкновенная въ сѣверной, средней и юго-западной Россіи и въ Сибири. Корневыя шишки приплюснутыя, пальчато-раздѣльныя. Стебель выш. 7—14 вершковъ, сплошной (не полый). Листья большей частью испещрены бурыми пятнами; нижніе—продолговатые, тупые, средніе—ланцетовидные, верхніе—мелкіе, острые. Блѣдно-лиловые или бѣлые душистые цвѣты образуютъ густой цилиндрическій колосъ; ланцетковидный околоцвѣтникъ состоитъ изъ 3 паружныхъ и 3 внутреннихъ листочковъ; одинъ изъ послѣднихъ, отличающійся особой формой, образуетъ широкую округлую, 3-хлопастную, пурпуровую губу, снабженную цилиндрическимъ, направленнымъ внизъ, шпорцемъ. Тычинка своею нитью срастается со столбикомъ завязи, образуя короткій гинеостелій (колонку); пыльникъ 2-хлѣздный; въ каждомъ зернѣ пыльца склеены между собою липкимъ веществомъ въ нѣ-

сколько комочковъ, продолженныхъ внизъ въ ножку. Завязь нижняя, одногнѣздная, скрученная. Плодъ—коробочка. Растетъ на лугахъ и между кустарниками. Цвѣтетъ лѣтомъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Кукушкины слезки употребляются только въ народѣ. Отваръ корня принимаютъ отъ поноса, отъ боли въ груди и отъ женскихъ болѣзней. Въ Вяткѣ корни всѣхъ видовъ этого растенія служатъ для леченія грыжи у дѣтей. Крестьянки-ворожеи даютъ корень носить съ собою, чтобы другіе любили, особенно замужнимъ женщинамъ при несогласіи съ мужьями.

Кукушники, см. Ятрышникъ широколистный (*Orchis latifolia* L.).

Кукушница двулистная, см. Фіалка ночная (*Platanthera bifolia* L.).

Кукушница женская, см. Ятрышникъ-дремликъ (*Orchis Morio* L.).

Кулина } см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).

Кулинка } см. Коровякъ блѣдцвѣтный (*Verbascum Lychni-*

Кулиникъ, } *us* L.).

Кульбаба, см. Цикорій обыкновенный (*Cichorium Intibus* L.).

Кульбаба, см. Скерда кровельная (*Crepis tectorum* L.).

Кульбаба осенняя (*Leontodon autumnalis* L.). Горькушка, Желтуха, Желтушка, Замошкязъ (Тамб.), Зобникъ, Золотарникъ, Золотушная трава (Смол.), Млечай (Гродн.), Омежная (Олон.), Полая трава (Волог.). Кульбаба осенняя представляетъ изъ себя многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), весьма обыкновенное въ Европѣ и въ Россіи. Листья прикорневые, длинные, узкіе, перисто-раздѣльные. Стебель вѣтвистый, безпильный, съ 2—4 корзинками на длинныхъ ножкахъ, которые къверху постепенно утолщаются и снабжены многочисленными чешуйчатыми прицвѣтниками. Корзинки до распусканія цвѣтовъ прямостоящія. Цвѣты желтые. Плодъ—сѣмянка съ хохолкомъ. Растетъ на поляхъ. Цвѣтетъ со второй половины лѣта до поздней осени. (Р и с. 139.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ Тульской губ. употребляется чай этого растенія отъ кашля.

Кулька, см. Тернослива (*Prunus institia* L.).

Кульчики, см. Кудри царскія (*Lilium Martagon* L.).

Куманика, см. Ежевика обыкновенная (*Rubus fruticosus* L.).

Куманика (*Rubus caesius* L.). Бирюза или Бурюза, Берюза, Ежевика, Ежевика синяя, Ежевичникъ, Яжевичникъ, Ежина, Ожина, Ажина, Ожинникъ (Вил., Екат., Полт.). Жавпникъ, Жавина (Мог.). Жовика (Кирг.), Каменика, Каменница, Куманиха, Куманичникъ, Куманичница, Книжениха или Голубая малина, Глухая малина, Скорбариха (Влад., Гродн.). Куманика представляетъ кустарничекъ изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), распространенный въ Европѣ и въ Россіи. Описание см. ежевика (*Rubus fruticosus* L.). Отличается отъ ежевики

цилиндрическимъ лежачимъ стеблемъ, покрытымъ синеватымъ налетомъ, и черными, съ сизымъ налетомъ, тусклыми плодами. Плоды съѣдобныя и кисловатыя. Произрастаетъ на холмахъ, между кустарниками. Цвѣтетъ лѣтомъ. (Рис. 140.).

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Чай изъ сушеныхъ ягодъ ку-

маники употребляется, какъ потогонное средство.

Куманика, см. Морошка (*Rubus Chamaemorus* L.).

Куманиха, см. Ежевика обыкновенная (*Rubus fruticosus* L.).

Куманиха, см. Куманика (*Rubus caesius* L.).

Куманица } см. Морошка (*Rubus Chamaemorus* L.).

Куманичина } см. Куманика (*Rubus caesius* L.).

Куманичина } см. Куманика (*Rubus caesius* L.).

Куманичникъ } см. Куманика (*Rubus caesius* L.).

Кумашникъ } см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristo-*

Кумашные яблоки } *lochla Clematidis* L.).

Кумошница, см. Синюха обыкновен. (*Polemonium coeruleum* L.).

Кунджа, } см. Кунжуть (*Sesamum indicum* Dc.).

Кунджуть, } см. Кунжуть (*Sesamum indicum* Dc.).

Кунжуть (*Sesamum indicum* Dc.). Кунчугъ, Кунчукъ, Зезамъ, Сесамъ, Кунджа, Кунджуть. Травянистое растение изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), родомъ изъ Ост-Индіи, культивируемое въ Америкѣ и на Востокѣ въ большомъ количествѣ. Самое маслянистое изъ всехъ растений; въ сѣменахъ его заключается до 90 проц. масла. На Востокѣ употребляется въ пищу, на домашнее освѣщеніе и входитъ въ составъ китайской туши.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Масло, добываемое изъ кунжутныхъ сѣмянъ, по своему составу не уступаетъ прованскому. Какъ медицинское средство, оно употребляется азіатскими врачами; они даютъ его отъ простуды, отъ хроническихъ насморковъ, отъ глистовъ. Иногда его даютъ, какъ слабительное, вмѣсто касторового масла.

Снаружи его употребляютъ для втираній въ животъ противъ болей въ животѣ, отъ свинцовой колики, отъ воспаленій слѣпой кишки; при воспаленіи грудной плевы масло втираютъ въ грудь; его прикладываютъ на обожженные мѣста, масло прибавляютъ въ клистиры. Свѣжаго масла берутъ на приемъ по 2 столовыхъ ложки, для чего изъ него готовятъ такую-же эмульсію, какъ и изъ касторового масла. Отъ зубной боли кунжутное масло втираютъ въ десна; также его прикладываютъ къ геморроидальнымъ шишкамъ; для прикладыванія на обожженные мѣста кунжутное масло смѣшиваютъ съ яичнымъ бѣлкомъ, такую-же смѣсь прикладываютъ и къ геморроидальнымъ шишкамъ. Свѣжіе листья кунжута прикладываютъ къ воспаленнымъ частямъ и на рожисто-воспаленные участки; истолченные и подогрѣтые листья ввидѣ припарки кладутся на животъ при боляхъ въ животѣ, на воспаленные суставы при подагрѣ, для припарокъ листья также варятъ въ молокѣ. Растертые въ укусѣ листья кунжута идутъ на леченіе чесотки и лишаевъ. Кунжутное масло по своимъ свойствамъ одинаково съ

льнянымъ и потому годится для составленія мазей, пластырей и смягчительныхъ припарокъ. Изъ кунжутнаго масла дѣлають мыло.
Кунигундова трава, см. Посконникъ конопляный (*Eupatorium cannabinum* L.).

Куница, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).

Кунишникъ, см. Вѣшникъ наземный (*Calamagrostis epigelos* Roth.).

Кунникъ, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).

Кунчугъ, см. Кунжуть (*Sesamum indicum* Dc.).

Кунчукъ, см. Кунжуть (*Sesamum indicum* Dc.).

Куньякъ бѣлый, см. Клеверъ бѣлый ползучій (*Trifolium repens* L.).

Куньякъ красный, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Купъ } см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygo-*
Купъ зѣлле } *natum* L.).

Купава } см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).
Купавка }

Купавка, см. Купальница европейская (*Trollius europaeus* L.).

Купавки, см. Пулавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).

Купавки, см. Бадма (*Nelumbium caspicum* Fisch.).

Купавникъ, см. Горицветъ весенній (*Adonis vernalis* L.).

Купавочки, см. Пулавка желтая (*Anthemis tinctoria* L.).

Купала } см. Мелколепестникъ бѣдкій (*Erigeron acris* L.).
Купалка }

Купалка, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).

Купалка бѣлая, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Купало, см. Лютикъ бѣдкій (*Ranunculus acris* L.).

Купальникъ, см. Пулавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).

Купальникъ, см. Арника горная (*Arnica montana* L.).

Купальница, см. Вѣтреница лютиковая (*Anemone ranunculoides* L.).

Купальница, см. Дрема кукушкинъ цвѣтъ (*Lichnis flos cuculi* L.).

Купальница, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).

Купальница, см. Лютикъ бѣдкій (*Ranunculus acris* L.).

Купальница, см. Лютикъ ползучій (*Ranunculus repens* L.).

Купальница, см. Купальница европейская (*Trollius europaeus* L.).

Купальница европейская (*Trollius europaeus* L.). Авдотка, Авдотки (Моск.), Андотки, Удотки, Удитки (Малор.), Болдомолда, Бубенчикъ, Бубенчики желтые, вешніе, однолѣсные, Букли, Буковина цвѣтная, Винки, Вовча лапа, Вовчий копит, Горлинка (Перм.), Горчишникъ, Дрема кошачья (Пирд.), Жаркіе цвѣты, Желтыя головки, Желтоголовъ, Желтоцвѣтъ, Желтая роза (Смол.), Запонки, Казакъ, Колбочки (Влад.), Калужница европейская, Колтушки (Дв.), Коровій напоръ (Смол.), Коровья трава, Кугольникъ, Купальница, Купаленка, Купавка, Куриная слѣнота, Кучерски травки, Лещиха, Листича (Олон.), Масленка (Гродн.),

Дикій мачекъ, Пересна, Полденышекъ (Смол.), Прикрытъ, Пригридь, Сиверушникъ, Сиверушки (Никол. у. Волог.), Синеворотъ, Хмель, Хмель полевой, Болотный шапки (Ниж.), Широкая голова (Олон.), Шишки (Волог.), Щепетуха (Олон.). Купальница есть многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «лютиковыхъ» (Ranunculaceae Juss.), очень обыкновенное въ Европѣ и въ Россіи. Стебель малолѣтвистый. Прикорневые листья кольчато-раздѣльные, съ надрѣзанными долями. Цвѣты крупные, шаровидные, блестящіе; питевидные оранжевые лепестки вполнѣ прикрыты чашечкой сѣрно-желтаго цвѣта. Растетъ на сырыхъ лугахъ, лѣсныхъ полянахъ, между кустарниками. Цвѣтеть съ ранней весны до лѣта.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ Въ прежнее время цвѣты употреблялись отъ скорбута, а корень замѣнять чемерицу. Въ Пермской губ. корень употребляется отъ опухоли, для чего его распариваютъ и прикладываютъ къ опухшему мѣсту черезъ тряпку. Такія же припарки кладутся коровамъ на воспаленное вымя.

Купека } см. Купена лекарственная (Convallaria Polygonatum L.).
Купена }

Купена, см. Купена лекарственная (Convallaria Polygonatum L.).

Купена лекарственная (Convallaria Polygonatum L.). Волчьи глазки, Волчья трава (Курск.), Волчьи яблоки, Волчьи ягоды (Курск.), Волчій ягольникъ (Курск.), Воронецъ, Вороны глаза (Ниж.), Вороновы глазки (Тамб.), Вороновы или вороны ягоды (Влад., Саратов.), Сорочьи глаза (Перм.), Сорочьи ягоды (Уфимск.), Гладышъ, Журавленникъ, Журавлиныя стручки (Полт.), Купена, Купъ, Купъ-зілля, Купина (Калуж., Екат., Полт., Херс.), Купень, Купека (Малор.), Купени, Купена-лупена, Лупена, Чемерица (Курск.), Чемерица лѣсная, Соломонова печать, печатка, Желтая Адамова голова, Городецкѣйная трава, Грыжнникъ, Золотникъ (Тул.), Зубрій (Подол.), Заячья капуста, Бабыя коровка, Кокоричка, Петровъ крестъ (Влад.), Кровавникъ, Кровавница, Лѣсовые кули (Кіев.), Купина малая, Ландышъ глухой, Натягачъ (Умань), Одхасникъ (Малор.), Пѣна-лупена, Прыгунъ, Пупникъ (Тамб.), Пѣвники дубняковые (Кіев.), Пѣтушки, Пятилистка, Купена, Зазулины ручки, Пречистыя слезки, Сердечникъ, Тирличъ, Шинникъ (Уфим.). Лекарственная купена есть многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «лилейныхъ» (Liliaceae DC.), распространенное по всей Европѣ и Россіи. Стебель узловатый, гранистый, съ очередными продолговатыми листьями, обращенными въ одну сторону. Бѣлыя цвѣты расположены по 1—2 въ углахъ листьевъ. Околоцвѣтникъ трубчатый, 6-тизубчатый, бѣлый, на верхушкѣ зеленый. Тычинокъ 6, съ голыми нитями. Завязь 3-хгнѣздная, съ питевиднымъ столбикомъ и 3-хлопастнымъ рыльцемъ. Плодъ—фіолетовыя ягоды. Растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками. Цвѣтеть въ маѣ и въ іюнѣ. (Рис. 141.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Врачами растеніе это въ настоящее время не употребляется. Какъ народное средство, оно

примѣняется отъ ломоты, ревматизма и укушенія бѣшеной соба-
ки. Растеніе это входитъ въ составъ кровеочистительнаго декокта.
Настоемъ въ водѣ умываются отъ загара. Свѣжія ягоды употре-
бляются вмѣсто румянъ. Съѣденныя въ большомъ количествѣ
ягоды вызываютъ рвоту. Свѣжіе корни растенія тоже могутъ слу-
жить вмѣсто румянъ. Листья прикладываютъ дѣтямъ отъ грыжи,
отваръ изъ корня служить лекарствомъ отъ геморроя; кровеочи-
стительный декоктъ пьютъ отъ боли въ поясницѣ, отъ сибирской
язвы, отъ водяной и желчной болѣзни и отъ слабости. Для приго-
товленія отвара берутъ $\frac{1}{2}$ унціи (15 грм.) корня, заливаютъ се
фунтомъ воды или молока и пьютъ отваръ по чайной чашкѣ. Мо-
лодые стебли и побѣги употребляются въ пищу.

Купена-лупена } см. Купена лекарственная (*Convallaria Poly-*
Купени } *gonatum* L.).
Купень }

Купина, см. Петодъ обыкновенный (*Polygala vulgaris* L.).
Купина малая, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygo-*
natum L.).

Купиродъ } см. Кочедыжникъ обыкновенный (*Aspidium Filix fe-*
Купородъ } *mina* Sw.).

Купородникъ, см. Папоротникъ черный (*Struthiopteris germa-*
nica L.).

Купрей, см. Пванъ чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Купыръ, см. Пупырикъ обыкновенный (*Torilis Anthriscus*
Gärtn.).

Купыръ } см. Купыръ лѣсной (*Anthriscus silvestris*
Купыръ красный } Hoffm.).

Купыръ лѣсной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.). Фармацевтическое
назв.: *Chaerophyllum silvestre* s. *Cicentaria*. Бугила, Бугыла, Бругиль
(Курск.), Волючка, Дробинникъ (Волог.), Дудка (Твер.), Кунырь
(Курск., Моск., Тул., Тамб.), Кунырь красный. Морковникъ, Мор-
ковные пучки, Постушель, Пустошель, Дикій рябчикъ, Стволья,
Стволовый цвѣтъ, Съѣдокъ лѣсной, Сверейка, Свербигузъ (Херс.),
Анизъ (Олон.), Ганусъ, Кервель, Кервель дикій, Коровья пет-
рушка, Укропъ водяной, Болиголовка, Болиголовъ, Болиголовка,
Бѣлоголовка, Деревей (Екат.), Конопельки, Дятильникъ кудрявый,
Тминъ, Веселистникъ, Голубиное сѣмя (Влад.), Гусиная лапа
(Олон.), Марья (Олон.), Скворцовая лѣстница (Владим.), Смоквы,
Ужовникъ. Лѣсной купыръ представляетъ изъ себя много-
лѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «зонтичныхъ»
(*Umbelliferae* Juss.), весьма обыкновенное въ Европѣ и въ
Россіи. Стебель довольно высокій, вѣтвистый, внизу шершаво-
волосистый, наверху голый. Листья сверху блестящіе, въ очер-
таніи 3-угольные, двояко или тройко-перистые, съ продолго-
вато-овальными, перисто-надрѣзными и зубчатыми долями. Вѣ-
твые цвѣты собраны сложными зонтиками о 8—10 лучахъ безъ
обвертокъ (иногда съ 1—2 прицвѣтниками). Обверточка состоятъ
изъ нѣсколькихъ внизъ отогнутыхъ прицвѣтниковъ. Наружные

лепестки краевыхъ цвѣтовъ крупнѣе внутреннихъ. Плодъ—сѣмянка, продолговатый, блестящій, одинаковой длины съ цвѣтоножкой, съ короткимъ клювомъ; плодики гладкіе, только на верхушкѣ съ 5 ребрами. Растетъ въ лѣсахъ между кустарниками и въ садахъ. Цвѣтетъ съ мая по іюль. (Рис. 142.)

Растеніе ядовитое. При отравленіи имъ слѣдуетъ давать больному большое количество теплой воды съ какимъ-либо масломъ: деревяннымъ, коноплянымъ, прованскимъ или льнянымъ.

Куръ } см. Полѣска многолѣтняя (*Mercurialis perenne* L.).
Куръ зелье }
Куритина, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq.).

Куркума (*Curcuma longa* L.). Каркамень. Желтый корень. Желтый имбирь. Отечество Остъ-Индія, Китай; употребляется на желтую краску.

Куропаточья трава (*Dryas octopetala* L.). Пивянка, Устели-Камень. Низенькая травка, образующая густыя дерновинки, изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), распространенная на сѣверѣ и на горахъ Европы, на крайнемъ сѣверѣ Россіи и въ альпійской области Кавказскихъ горъ. Листья овальные, сверху зеленые, голые, блестящіе, снизу покрытые сѣвѣнно-бѣлыми волосками. Цвѣты бѣлые, довольно крупныя. Чашечка двойная, лепестковъ 8. Плодъ—сложная сѣмянка изъ плодиковъ, несущихъ по длинному перистому столбiku.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. У жителей альпювъ трава употребляется отъ поноса и какъ суррогатъ чая. (Рис. 143).

Курослѣпъ, см. Герань болотная (*Geranium palustre* L.).

Курослѣпъ, см. Лютикъ ѣдкій (*Ranunculus acer* L.).

Курослѣпъ } см. Бересклетъ бородавчатый (*Evonymus*
Курослѣпникъ } *verrucosus* L.).

Кутейка, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).

Кучъ, см. Кучина (*Prunus Mahaleb* L.).

Кучина (*Prunus Mahaleb* L.), Антипка, Кучъ, Вишня чернопильная, Вишня душистая, Слива жидовская. Дерево изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth L.), распространенное въ южной Европѣ и въ южной Россіи. Листья округло-яйцевидныя, при основаніи немного сердцевидныя, коротко заостренныя, городчато-пильчатые. Бѣлыя цвѣты въ укороченныхъ кистяхъ щиткомъ. Плодъ—довольно маленькія яйцевидныя черныя ягоды съ одросѣмянной косточкою.

Кучиръ }
Куширъ } см. Крапива водяная (*Ceratophyllum demersum* L.).
Кушуръ }
Къпекъ, см. Синякъ красный (*Echium rubrum* L.).

Л.

Лабазка, см. Медунница (*Spiraea ulmaria* L.).

Лабазникъ, см. Медунница (*Spiraea ulmaria* L.).

Лабазникъ, см. Земляные орѣшки (*Spiraea filipendula* L.).

Лабазникъ степной, см. Спирея городчатолістная (*Spiraea crenata* L.).

Лаблабъ, см. Фасоль египетская (*Lablab vulgaris* Sawi.).

Лабрадорскій чай (*Ledum latifolium* L.). Джемскій чай, Богунникъ. Вѣчно зеленѣющій благоухающій кустарникъ, родомъ изъ сѣверной Америки. Отваръ листьевъ часто употребляется вмѣсто китайскаго чая, а также при болѣзняхъ груди.

Лабурица, см. Полынь степная (*Linowsyris villosa* De.).

Лавръ, см. Лавровое дерево (*Laurus nobilis* L.).

Лавръ александрійскій, см. Александрійскій лавръ (*Ruscus hypnophyllum* L.).

Лавръ тюльпанный, см. Магнолія (*Magnolia* L.).

Лавровая вишня, см. Лавровишневое дерево (*Cerasus Lauro-cerasus* Loisl.).

Лавровишневое дерево (*Cerasus Lauro-cerasus* Loisl.). Лавровая вишня, Лавровишня, Лавролістная слива, Лаврочеремха. Вѣчно зеленая черемуха. Лавровишневое дерево представляетъ изъ себя кустарникъ съ вѣчно-зеленѣющими кожистыми продолговатыми, по краямъ пильчато-зубчатыми и на концѣ заостренными, листьями, съ бѣлыми въ кистяхъ цвѣтами и съ красными ягодами, содержащими косточку, родомъ изъ Малой Азии. Въ 1576 г. было вывезено въ Европу, разводится нерѣдко на югѣ въ садахъ и паркахъ, у насъ-же встрѣчается только въ оранжереяхъ.

Всѣ части растенія, кромѣ цвѣтовъ, почти безъ запаха. Ягоды заключаютъ внутри сочную сладковатую косточку, ядр которой весьма горько на вкусъ и запахомъ напоминаетъ горькій миндаль. Листья отличаются также горькимъ, нѣсколь вяжущимъ вкусомъ. Научныя изслѣдованія показали, что какъ ядра, такъ и листья, содержатъ въ себѣ синильную кислоту, почему они и считаются весьма ядовитыми и требуютъ осторожнаго обращенія. Изъ листьевъ готовится въ антикахъ лавровишневая вода.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ лавровишневой воды довольно обширно. Она успокаиваетъ возбужденную нервную систему, уменьшаетъ приступы кашля и сердеченіе. Въ большихъ количествахъ лавровишневая вода опасна: можетъ вызвать отравленіе находящейся въ ней синильной кислотой. На приемъ для взрослыхъ даютъ отъ 5-ти до 10-ти капель 3—4 раза въ день, для ребенка больше 3—5 капель въ день. Чтобы развести лавровишневую воду, къ ней прибавляютъ равное количество спиртной настойки валеріановаго корня, и такую смѣсь взрослые принимаютъ.

15-ти капель 3 раза въ день. дѣти по одной, двѣ капли: въ особенности эта смѣсь рекомендуется отъ сердцебіенія, безсонницы и вообще нервнаго разстройства. При кашлѣ и чувствѣ царапанія въ горлѣ лавровишневую воду соединяють съ анисовыми каплями тоже поровну, иногда къ нимъ-же прибавляютъ спиртную настойку ипеакауаны въ такомъ-же количествѣ, и такую смѣсь принимаютъ по 10—15 капель 3 раза въ день. Отъ болей въ животѣ, частыхъ позывовъ на мочу и болѣзненнаго мочеиспусканія, лавровишневую воду кладутъ въ миндальное молоко. На стаканъ миндальнаго молока вливаютъ одну чайную ложку лавровишневой воды и принимаютъ смѣсь черезъ два часа по столовой ложкѣ.

Въ гомеопатіи лавровишневая настойка рекомендуется отъ скоротечной чахотки. Кроме того, ее даютъ: при состояніи общей слабости нервной системы, съ пониженной силой воли и упадкомъ силъ, при слабости, чувствѣ зябкости, при судорогахъ, параличахъ послѣ апоплексическаго удара, безсонницѣ, тифѣ, при слабой дѣятельности головного мозга, глухотѣ, головокруженіи, истерической головной боли, истерическихъ спазмахъ глотки и гортани, отъ икоты, при боляхъ въ животѣ, холерѣ, параличѣ мочевого пузыря, воспаленіи легкаго, нервномъ сердцебіеніи и чувствѣ сдавливанія груди. Даютъ 1—2 капли 1-го, 2, 3 разведенія каждые 2, 3, 4, 6, 8, 12 или 24 часа.

Въ ветеринарной медицинѣ лавровишневая вода дается животнымъ въ тѣхъ-же заболѣваніяхъ, что и людямъ, главнымъ образомъ отъ кашля, судорогъ и воспаленія кишокъ. Собакѣ дается отъ 5-ти до 15-ти капель на пріемъ.

Лавровишня, см. Лавровишневое дерево (*Cerasus Lauracerasus* Loisl.).

Лавровое дерево (*Laurus nobilis* L.). Лавръ, Бобковое дерево. Вѣчнозеленое дерево изъ семейства «лавровыхъ» (*Lauraceae*), родомъ изъ Азіи, въ Россіи въ дикомъ состояніи встрѣчающееся въ западномъ Закавказьѣ, выш. отъ 2 до 3 сажень. Листья очередные, коротко-черешковые, ланцетовидные, кожистые, по брѣямъ слегка волнистые. Околоцвѣтникъ 4-храздѣльный, желтовато-бѣлый. Число тычинокъ вдвое или въ нѣсколько разъ превышаетъ число долей околоцвѣтника; пыльники раскрываются створками снизу вверхъ. Завязь верхняя, одногнѣздная, съ однимъ яичкомъ. Плодъ—черно-синія ягоды, величиною съ небольшую вишню. Разводится на югѣ Европы. Листья идутъ на приправу кушанья. (Рис. 145.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Изъ плодовъ выжимается масло, которое прежде употребляли въ медицинѣ; въ настоящее время масло это идетъ только изрѣдка въ смѣси съ другими веществами для наружнаго употребленія. Въ Германіи въ народѣ оно употребляется отъ чесотки.

Въ народной медицинѣ наружное употребленіе лавроваго масла въ особенности рекомендуется, какъ средство, размягчающее опухоли, также успокаивающее судороги и способ-

ствующее излечиванію параличей. Его соединяють съ скипидаромъ или-же къ нему примѣшиваютъ испанскихъ мушекъ. Въ послѣднемъ соединеніи лавровое масло вызываетъ сильную красноту на кожѣ и дѣйствуетъ, какъ отвлекающее средство, что въ особенности полезно при болѣзняхъ легкихъ. Въмѣсто дорогого стоящаго лавроваго масла, можно приготовить самимъ мазь слѣдующаго состава: взять 6 частей порошка лавроваго листа, 1 часть можжевельныхъ листьевъ и 12 частей несоленого сливочнаго масла, все это хорошо мелко столочь и смѣшать, отчего получится хорошая, мягкая мазь.

Въ ветеринарной медицинѣ внутрь лавровое растеніе дается животнымъ очень рѣдко; для внутренняго употребленія служатъ лавровыя ягоды. Ихъ толкутъ и готовятъ въ видѣ каши, пилуль или порошковъ. Больнымъ животнымъ даютъ отъ 15,0 до 30,0 граммъ ($\frac{1}{2}$ унца до 1 унца), свиньямъ отъ 1,0 до 2,0 грм. (отъ 15-ти до 30-ти гранъ), собакамъ—отъ 0,1 до 0,2 грм. (отъ 1 до 2 гранъ), при судорогахъ и другихъ нервныхъ болѣзняхъ.

Лавророза, см. Олеандръ (*Nerium Oleander* L.).

Лаврочеремха, см. Лавровишнее дерево (*Cerasus Lauro-cerasus* Lois.).

Лавруша, см. Волчье лыко (*Daphne mezereum* L.).

Ладанъ, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Ладанъ верховой, см. Синюха обыкновенная (*Polemonium coeruleum* L.).

Ладанъ дикій, см. Грушанка круглолистная (*Pirola rotundifolia* L.).

Ладанъ земляной, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Ладанъ земляной, см. Зеленчукъ желтый (*Galeobdolon luteum* Sm.).

Ладанъ земляной, см. Гравилатъ прямой (*Geum strictum* L.).

Ладанъ земляной, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Ладанъ кошачій } см. Валеріана лекарственная (*Valeriana of-*

Ладанъ лѣсной } *ficialis*).

Ладанъ рѣсной, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea millefolium* L.).

Ладанъ снѣговой, см. Гравилатъ прямой (*Geum strictum* L.).

Ладанка, см. Параличная трава (*Ajuga Chamaepitys* L.).

Ладанка, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Ладанка, см. Душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.).

Ладанникъ испанскій (*Cistus ladaniferus* L.). Невысокій вѣтвистый кустарникъ, произрастающій въ южныхъ странахъ Европы, преимущественно у береговъ Средиземнаго моря выделяетъ благовонную смолистую массу, известную подъ именемъ «испанской манны», употреблявшуюся въ древности у грековъ въ медицинѣ; нынѣ входитъ иногда въ составъ курительныхъ порошковъ. Кустарникъ разводится нерѣдко для украшенія въ садахъ.

Ладанница, см. Валериана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Ладанное дерево, см. Солнечник обыкновенный (*Helianthemum vulgare* Gaertn.).

Ладанное африканское дерево (*Boswellia paprifera* Hoeschst. sly. *Boswellia floribunda* Royle.). Дерево родомъ изъ восточной Аравіи. Корень состоитъ изъ тонкихъ бумагообразныхъ слоевъ. Выдѣляетъ благовонную смолу, идущую въ торговлю изъ Адена подъ названіемъ африканскаго, абиссинскаго или аравійскаго ладана.

Ладанное индѣйское дерево (*Boswellia serrata* Stackh.). Дерево изъ Ост-Индіи, выдѣляетъ благовонную смолу, играющую роль въ религіозныхъ обрядахъ индусовъ; въ Бомбей она, однако, неизвѣстна и не составляетъ предмета торговли.

Ладолучье, см. Вязель разноцвѣтный (*Caranilla varia* L.).

Ладонникъ, см. Чина луговая (*Orobis pratensis* L.).

Ладошникъ, см. Подмаренникъ мареновидный (*Galium rubioides* L.).

Ладьянъ, см. Ладьянъ обыкновенный (*Corallorhiza innata* R. Br.).

Ладьянъ обыкновенный (*Corallorhiza innata* R. Br.). Ладьянъ, Петровъ крестъ трава. Нѣжная желтоватая или буроватая, многолѣтняя травка безъ корней, съ ползучимъ коралловиднымъ корневищемъ, на которомъ развиваются корневые волоски, изъ семейства «орхидныхъ» (*Orchidaceae* Juss.), распространенное въ горахъ сѣверной и средней Европы, въ сѣверной, средней и юго-западной Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ, въ Сибири. Стебель выш. $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$; верш., съ чешуйчатыми листьями. Цвѣточный колосъ состоитъ изъ небольшого числа мелкихъ зеленовато-желтыхъ цвѣтковъ. Лепестковидный околоцвѣтникъ состоитъ изъ 3 наружныхъ и 3 внутреннихъ листочковъ. Одинъ изъ послѣднихъ, по своей формѣ отличающійся отъ другихъ, составляетъ овальную бѣловатую губу, по бокамъ съ тупымъ зубцомъ, при основаніи съ красными крапинками. Тычинка, сросшаяся съ столбикомъ завязи въ одну колонку, образуетъ «гнностелій»; пыльникъ 2-гнѣздный. Завязь нижняя, одногнѣздная; рыльце находится на колонкѣ подъ пыльникомъ. Произрастаетъ въ лѣсахъ, на влажной перегнойной почвѣ. Принадлежитъ къ сапрофитнымъ растеніямъ, то-есть, извлекающимъ изъ разлагающихся растительныхъ и животныхъ организмовъ, находящихся въ почвѣ, всѣ необходимыя для питанія органическія вещества. (Рис. 144.)

Лазиха, см. Пасленъ сладко-горькій (*Solanum dulcamara* L.).

Лазоръ, см. Касатикъ сибирскій (*Iris sibirica* L.).

Лазорникъ, см. Румянка лекарственная (*Anchusa officinalis* L.).

Лазунъ, см. Жасминъ полевой (*Lyctum barbarum* L.).

Лакмусовая трава (*Crotophora tinctoria* A. Juss.). Однолѣтняя трава съ пушистыми листочками, произрастающая на морскихъ берегахъ въ сѣверной Африкѣ и южной Европѣ. Выжатый сокъ изъ листьевъ, обработанный съ известью и съ

уриной, даетъ синюю краску, употребляемую на подкрашиваніе, напр., сахарной бумаги, головъ голландскаго сыра, на выдѣлываніе «лакмуса»; при соединеніи съ кислотами она получаетъ красную окраску; въ такомъ видѣ ее употребляли ранѣе въ качествѣ румянъ, а также для подкрашиванія въ кондитерскомъ производствѣ.

Лаковое дерево, см. Анакардіе вѣсть-индскій (*Anacardium occidentale* L.).

Лаковое малабарское дерево (*Butea frondosa* Roxb.). Дерево, произрастающее въ Остѣ-Индіи. Въ жаркое время изъ трещинъ его коры сочится темно-красный сокъ. цвѣтомъ напоминающій рубинъ; въ твердомъ видѣ этотъ сокъ доставляетъ камедь, извѣстную въ торговлѣ подъ названіемъ «бенгальскаго или азіатскаго кино». Вѣтви дерева часто покрываются блестящимъ гуммилакомъ, который также поступаетъ въ торговлю. Корни доставляютъ красное красильное вещество, цвѣты-же даютъ желтую краску; волокна употребляются, какъ придильный матеріалъ.

Лаконосъ, см. Чечевичная ягода (*Phytolacca decandra* L.).

Лакрица русская, см. Солодковый корень (*Glycyrrhiza echinata* L.).

Лакрица испанская, см. Лакричникъ обыкновенный (*Glycyrrhiza glabra* L.).

Лакричникъ, см. Солодковый корень (*Glycyrrhiza echinata* L.).

Лакричникъ испанскій, см. Лакричникъ обыкновенный (*Glycyrrhiza glabra* L.).

Лакричникъ обыкновенный (*Glycyrrhiza glabra* L.). Фармацевтическ. названіе обыкновеннаго лакричника: *Liquiritia* s. *Glycyrrhiza hispanica* (Radix). Лакричникъ испанскій, Лакрица испанская. Многолѣтняя трава, выш. отъ 1½ арш. до 1 сажени, изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.), распространенная въ Венгріи, Турціи, Греціи, въ Крыму, на Кавказѣ, въ Сибири и въ М. Азіи, на югѣ Европы и въ сѣв. Африкѣ, встрѣчающееся въ южныхъ и юго-восточныхъ губерніяхъ Россіи. Все растеніе коротко-ц. листое, и въ особенности листья на нижней сторонѣ, железистое, съ длиннымъ (въ 1½ арш.) стеблемъ и толстымъ корнемъ. Листья непарно-перистые, листочки многочисленные (11—15) цѣльнокрайніе, яйцевидные. Бѣловато-фіолетовые или синеватые цвѣты расположены удлинненными колосовидными кистями. Чашечка трубчатая, 5-тизубчатая, съ зубцами, по длинѣ равными трубчкѣ; вѣнчикъ бѣловато-фіолетовый, 5-тилепестный, мотыльковый (верхній лепестокъ—флагъ, боковые 2—крылья, нижніе 2 сросшіеся образуютъ лодочку; флагъ узкій, лодочка острая). Тычинокъ 10, изъ которыхъ 9 сросшихся вмѣстѣ, а 10-я верхняя свободна; гнѣзда пыльниковъ при верхушкѣ сливаются; столбикъ нитевидный, голый; плодъ—продолговатые, многосѣмянные, голые или шиповато-железистые бобы. Цвѣтетъ лѣтомъ. Разводится лакричникъ черезъ разсаживаніе корней. (Рис. 146.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Сладкій на вкусъ корень, извѣстный подъ названіемъ солодковаго корня, и сжатый сокъ его (лакрица) употребляются въ медицину.

Лакрица считается средствомъ, обволакивающимъ слизистыя оболочки, и въ особенности охотно давалась прежде при кашлѣ. Лакричный сиропъ и теперь часто употребляется отъ кашля; его принимаютъ или въ чистомъ видѣ чайными ложками, или-же его прибавляютъ въ различные микстуры. Лакрица входитъ въ составъ грудного порошка.

Въ ветеринарной медицинѣ лакрица обыкновенно употребляется въ случаяхъ быстро протекающаго заболѣванія дыхательныхъ путей; ее соединяютъ болѣею частью съ другими болѣе сильно дѣйствующими веществами, она-же служитъ для приготовления пилюль и кашекъ. Больнымъ животнымъ даютъ отъ 15—30—45 грм. на приемъ ($1\frac{1}{2}$ унца, 1 унцъ— $1\frac{1}{2}$ унца), собакамъ отъ 1,0 до 5,0 грм. (отъ 15-ти гранъ до 1 драхмы). Лакричный сиропъ дается маленькимъ домашнимъ животнымъ отъ кашля въ растворѣ съ водою или другимъ лекарственнымъ веществомъ, на приемъ 2,0—4,0 грм. (30 гранъ до 1 драхмы).

Лаконосъ, см. Желтофіоль садовый (*Cheiranthus Cheiri* L.).

Лампадочникъ, см. Коровякъ черный (*Verbascum nigrum* L.).

Ландишъ

Ландошъ

Ландуха

Ландушка

Ландушка, см. Брюква (*Brassica Napus* L.).

Ландушникъ

Ландышъ

Ландышъ, см. Кукушкины слезы (*Orchis maculata* L.).

Ландышъ, см. Фиалка почная (*Platanthera bifolia* L.).

Ландышъ, см. Грушанка круглолистная (*Pirola rotundifolia* L.).

Ландышъ боровой, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).

Ландышъ боровой, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).

Ландышъ бѣлый, см. Хлопушка (*Silene inflata* Smith.).

Ландышъ бѣлый, см. Грушанка круглолистная (*Pirola rotundifolia* L.).

Ландышъ двулистный, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).

Ландышъ глухой, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).

Ландышъ луговой, см. Грушанка круглолистная (*Pirola rotundifolia* L.).

Ландышъ луговой, см. Грушанка малая (*Pirola minor* L.).

Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.). Ванникъ (Малор.),

Виновникъ (Гамб.), Воронецъ (Нижег.), Гладышъ (Смол., Орл.),

Галадушникъ (Пск.), Заячья капуста (Курск.), Кукоричка (Волин.),

Крыжовникъ удольный, Конвалія (Малор., Гродн., Черн., Хар.,

Кіев.), Ландишъ, Ландышъ (въ б. ч. Россіи), Ландышникъ (Волин.), Ландышка (Яросл.), Ландушка (Ворон., Екат.), Лантусъ (Курск.), Ланушъ (Могил.), Ланышъ (Кіевск.), Ландошъ (Полт.), Ланушки (Грод.), Ландышъ боровой (Влад.), Ланушникъ (Петерб.), изм. Ландушникъ, Ландуха, Молодишникъ (Тамб.), Мытная (Костр.), Прострѣлъ (Волог.), Крипъ удольный (у Слав.), Полевая лилія, Ранникъ, Залчя соль, Сорочка, Сорока, Трехлистная (Нижег.), Заячьи ушке, ушки (Олон., Новг., Ниж.), Ушко суходольное (Олон.), Ушки (Волог.), Кокушкины ушки (Ниж.), Чемерица луговая (Волин.), Черомха полевая (Екат.), Язычникъ (Пет.), Языкъ лѣсной (Волин.), Языкъ собачій (Олон., Гродн.), Языкъ свиной (Олон.), Волчьи ягоды (Мог.), Серебrenникъ, Шпшешникъ, Шиповникъ (Кондр.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «лилейныхъ» (Liliaceae Dc.), распространенное по всей Европѣ, въ сѣверной, средней и юго-западной Россіи, обыкновенное въ Сибири, выш. 1³/₄—3¹/₂ вершк. Корневище ползучее, съ длинными ползучими побѣгами, снабженными влагалищными листьями. Стебель несетъ 2 коротко-черешковыхъ, сердцевидныхъ, заостренныхъ листа и верхушечную кисть мелкихъ бѣлыхъ душистыхъ цвѣтовъ. Околоцвѣтникъ шаровидно-колокольчатый, 5-тизубчатый; тычинокъ 6, прикрѣпленныхъ къ основанію околоцвѣтника; столбикъ короткій, толстый, съ 3-хграннымъ рыльцемъ; завязь 3-хгрѣздная, съ 2 сѣмянчиками въ каждомъ грѣздѣ; плодъ — красныя ягоды. Ландышъ майскій цвѣтетъ въ маѣ и въ іюнѣ и растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками. (Таб. XXIV, фиг. 135.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Цвѣты майскаго ландыша такъ-же, какъ и ягоды (послѣднія въ меньшемъ размѣрѣ), служатъ для приготовленія отвара и спиртной вытяжки или настойки. Спиртная настойка майскаго ландыша, *tinctura convallariae majalis*, употребляется очень часто и съ хорошимъ успѣхомъ отъ нервнаго сердцебиенія, отъ бессонницы, разстройства нервовъ и даже отъ падучей болѣзни. Очень часто при сердцебиеніи спиртную настойку майскаго ландыша смѣшиваютъ вмѣстѣ съ валеріановой настойкой поровну, и такую смѣсь принимаютъ 3—4 раза въ сутки по 15—20 капель, или же, если преобладаютъ нервныя явленія, ландышевую настойку прибавляютъ къ раствору бромистаго калия или натрія. Для этого готовятъ слѣдующую микстуру: 1 драхму (4 грамма) бромистаго калия разводятъ 12-тью столовыми ложками воды и прибавляютъ къ нимъ 1 чайную ложку ландышевой настойки; такую микстуру пьютъ 3 раза въ день по столовой ложкѣ. Она помогаетъ отъ бессонницы и успокаиваетъ нервы. Въ народной медицинѣ отваръ ландышей ввидѣ примочки употребляется отъ глазной боли; внутрь его принимаютъ: отъ боли въ животѣ (въ Вологодской и Нижегородской губ.), отъ родимца (во Владимірской губ.), отъ боли сердца и отъ остановки кровей (въ Нижегородской губ.), отъ лихорадки ввидѣ настоя на винѣ (въ Саратовской губ.). Настойка на винѣ готовится изъ свѣжихъ цвѣтовъ слѣдующимъ образомъ: бутылку насыпаютъ полную свѣжими цвѣтами и,

заливъ водкой, плотно закупориваютъ и ставятъ на солнцѣ для настаиванія въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ; затѣмъ настой процеживается черезъ чистую полотняную тряпочку, переливается въ чистую бутылку, хорошо закупоривается и хранится въ прохладномъ мѣстѣ. Настойка эта, или элексиръ, поправляетъ худое пищевареніе, укрѣпляетъ желудокъ, помогаетъ отъ коликъ въ животѣ и остановки мѣсячнаго кровотеченія. Принимается настойка 1 разъ въ день по столовой ложкѣ.

Сушенныя ягоды ландыша даютъ ввидѣ порошка отъ перемежающейся лихорадки: передъ пароксизмомъ отъ 10-ти до 20-ти гранъ (0,6—1,3 грм.), а въ безлихорадочное время вдвое больше, т. е., отъ 20-ти до 40 гранъ (1,3—2,5 грм.) 2 раза въ день. Сушенныя цвѣты теряютъ свой запахъ и, превращенные въ порошокъ, вызываютъ сильное чиханіе, почему въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ихъ кладутъ въ нюхательный порошокъ.

Ландышка } см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).
Ландышникъ }

Ландышное дерево (*Clethra arborea* Air.), кустарникъ родомъ изъ Сѣверной Америки, культивируемый у насъ въ садахъ.

Ланка, см. Брюква (*Brassica Napus* L.).

Лантусъ } см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).
Ланушъ }
Ланышъ }

Лапъ-морозка, см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).

Лапа вовча, см. Купальница европейская (*Trollius europaeus* L.).

Лапа волчья, см. Зюзникъ европейскій (*Lycopus europaeus* L.).

Лапа гусиная, см. Пустырникъ обыкновен. (*Leonurus cardiaca* L.).

Лапа гусиная, см. Купырь лѣсной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.).

Лапа кошачья, см. Ланка кошачья (*Antennaria dioica* Gärtn.).

Лапа кошачья, см. Бѣлоголовка (*Trifolium montanum* L.).

Лапа куриная, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Лапка львова, или львиная, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).

Лапа медвѣжья, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).

Лапа медвѣжья, см. Василекъ перистый (*Centaurea scabiosa* L.).

Лапа медвѣжья, см. Герацъ луговая (*Geranium pratense* L.).

Лапа медвѣжья, см. Борщевикъ сибирскій (*Heracleum sibiricum* L.).

Лапа медвѣжья, см. Чистецъ шерстистый (*Stachys lanata* Jacq.).

Лапа медвѣжья, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).

Лапани (*Pterocarya caucasica* С. А. М.). Дерево, произрастающее на Кавказѣ. Плоды его употребляются въ пищу, а древесина на издѣлія.

Лапачуга, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Лапишникъ, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).

Лапишникъ, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).

- Лапка болотная, см. Гусиная лапка (*Potentilla anserina* L.).
 Лапка гусиная, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).
 Лапка заячья, см. Кошачья лапка (*Antennaria dioica* Gärtn.).
 Лапка кошачья, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gärtn.).
 Лапка куряча, см. Бѣлоголовка (*Trifolium montanum* L.).
 Лапка орлиная, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).
 Лапки, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gärtn.).
 Лапки вовчі, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).
 Лапки гусячі, гусячіи, см. Гусиная лапка (*Potentilla anserina* L.).
 Лапки заячьи, см. Серпуха вѣнченосная (*Serratula coronata* L.).
 Лапки заячьи, см. Клеверъ пашенный, или кошачій (*Trifolium arvense* L.).
 Лапки заячьи, см. Кокушникъ (*Gymnadenia conopsea* Rich.).
 Лапки коцъ
 Лапки кошачьи } см. Цминъ (*Helichrisum arenarium* Dc.).
 Лапки котячьи }
 Лапки кошачьи, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gärtn.).
 Лапки медвѣжьи, см. Бѣлокрыльникъ болотный (*Calla palustris* L.).
 Лапки медвѣжьи, см. Гравилатъ прямой (*Geum strictum* L.).
 Лапки сорочі, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* L.).
 Лапки сорочі, см. Бѣлоголовка (*Trifolium montanum* L.).
 Лапки сорочьи, см. Горчакъ (*Polygonum Persicaria* L.).
 Лапокъ, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum dens leonis* Desf.).
 Лапотникъ, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).
 Лапухъ водяной, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).
 Лапухъ водяной, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).
 Лапухъ подорожный, см. Подорожникъ большой (*Plantago major* L.).
 Лапуха водяная, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).
 Лапуха горная, см. Чертополохъ огородный (*Cirsium oleraceum* All.).
 Лапуха горькая, см. Лопушникъ большой (*Lappa major* Gärtn.).
 Лапуха луговая, см. Вербейникъ обыкновенный (*Lysimachia vulgaris* L.).
 Лапуха студеная, см. Чертополохъ огородный (*Cirsium oleraceum* All.).
 Лапуха студеная, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).
 Лапушка, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).
 Лапушка боровая, см. Орлякъ обыкновенный (*Pteris aquilina* L.).
 Лапушникъ, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).
 Лапушникъ, см. Чернокорепъ обыкновенный (*Cynoglossum officinale* L.).
 Лапушникъ, см. Лопушникъ большой (*Lappa major* Gaertn.).
 Лапушникъ, см. Запникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa* L.).

Лапушникъ большой, см. Лилія водяная (*Nymphaea alba* L.).
Лапушникъ водяной, см. Бѣлокрыльникъ болотный (*Calla palustris* L.).

Лапушникъ дикий, см. Гравилатъ водяной (*Geum rivale* L.).
Лапушникъ водяной красный, см. Бадма (*Nelumbium caspicum* Fisch.).

Лапушникъ лѣсной, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).
Лапушникъ малый, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).

Лапушникъ мелкій, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).
Лапушникъ рѣчной, см. Вахта трилистная (*Menyanthes trifoliata* L.).

Лапушникъ полевой, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).

Лапушокъ, см. Серпуха красильная (*Serratula tinctoria* L.).

Лапчатка, см. Гусиная лапка (*Potentilla anserina* L.).

Лапчатка весенняя (*Potentilla verna* L.). Кокусъ (Укр.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), распространенное въ западной и восточной (на Уралѣ) Россіи, въ Крыму и на Кавказѣ, образуетъ дерновинки. Вѣтвистое корневище выпускаетъ многочисленные короткіе (дл. 2—6 вершк.) лежаціе или приподнимающіеся стебли, покрытые, какъ и черешки листьевъ, короткими оттопыренными волосками. Листья пальчатые, нижніе—длинно-черешковые, о 5—7 листочкахъ, верхніе—коротко-черешковые, о 3—5 листочкахъ; прилистники линейные или овальные. Золотисто-желтые цвѣты расположены рыхлыми, неправильными кистями на верхушкѣ стеблей. Чашечка пятираздѣльная, прикрѣпленная къ полусферовидному цвѣтоложу, снабженная подчашиемъ изъ 5 листочковъ; вѣнчикъ пятилепестный, лепестки обратно-сердцевидные, немного длиннѣе чашечки. Тычинокъ и плодолистиковъ неопредѣленное число; плодолистники съ короткимъ боковымъ столбикомъ, расположенные на выпукломъ цвѣтоложѣ. Плодъ сухой, состоящій изъ сѣмянокъ. Растетъ на сухихъ холмахъ, лугахъ. Цвѣтетъ въ маѣ и въ іюнѣ.

Лапчатка ползучая (*Potentilla reptans* L.). Фармацевтическое название: *Pentaphyllum* s. *Quinquefolium majus* (Herba et Radix.). Жабовникъ, Жабникъ, Могучникъ пятилистный, Мохна (Укр., Земл. Войск. Донск.), Мошна, Печерникъ (Пятерникъ) пятилистный, Пятиперстникъ, Пятипалашникъ, Пятилистникъ, Пятерникъ, Расперстная. Ползучая лапчатка представляетъ изъ себя многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), распространенное почти во всей Европѣ, въ западной, средней и южной Россіи, въ западной Сибири и Туркестанѣ. Стебель большей частью простой, дл. 7—14 вершковъ, ползучій, укореняющійся въ узлахъ. Листья черешковые, о 5-ти обратно-лицевидныхъ, крупно-пальчатыхъ листочкахъ. Золотисто-желтые цвѣты на длинныхъ цвѣтонож-

кахъ сидятъ поодинокѣ въ пазухахъ листьевъ; чашечка пяти-, рѣже 4-храздѣльная, снабженная подчашемъ о 5 (4) листочкахъ; лепестковъ 5, рѣже 4, обратно-сердцевидныхъ, длиннѣ долей чашечки. Тычинокъ и плодолистиковъ неопредѣленное число, плодолистники съ короткимъ боковымъ столбикомъ расположены на выпукломъ пѣтлѣ; плодъ сухой, состоящій изъ немного бугорчатыхъ сѣмянокъ. Цвѣтетъ съ мая до августа. Растетъ на сырыхъ лугахъ и между кустарниками. (Рис. 147.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Лапчатка ползучая врачами почти никогда не прописывается, хотя она имѣетъ очень хорошія свойства дѣйствовать вяжущимъ образомъ какъ при наружномъ, такъ и при внутреннемъ употребленіи, потому употребляется въ народѣ видѣ отвара для полосканія рта при кровоточивости десенъ, также отъ трещинокъ и язвъ на языкѣ. Корень растенія, очищенный и истертый въ мелкій порошокъ, считается прекраснымъ зубнымъ порошкомъ.

Внутрь отваръ растенія принимается отъ поноса, обильныхъ слизистыхъ отдѣленій и отъ кровотеченій. Изъ травы или сушеннаго корня растенія готовятъ отваръ; для этого берутъ отъ $\frac{1}{2}$ —1 унца (15—30 грм.) корня и заливаютъ его 1 стаканомъ кипятка, ставятъ настояться на самоваръ или на плитѣ на 10—15 минутъ, затѣмъ процеживаютъ и пьютъ черезъ 2 часа по столовой ложкѣ.

Въ ветеринарной медицинѣ лапчатка ползучая употребляется также въ тѣхъ случаяхъ, когда надо вызвать остановку усиленнаго отдѣленія крови или слизи. Въ особенности она хорошо дѣйствуетъ при отдѣленіи кровяной мочи. Вяжущія свойства лапчатки очень сильныя, потому не слѣдуетъ ее давать продолжительное время; хотя растеніе само по себѣ не ядовитое, но можетъ подѣйствовать дурно при неумѣренномъ и продолжительномъ употребленіи.

Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.). Фармацевтическое назв.: *Argentea*, v. *Quinquefolium minus* (*Herba et Radix*). Бѣшеная травка (Вор.), Воробьиное сѣмя (Вор.), Галоза (Вор.), Горлянка (Костр., Яросл., Каз., Твер.), Горлянка бѣлая (Могил., Смол., Орл.), Горловая трава, Горловка (Вор.), Грудная трава (Тв., Рж.), Горланная трава (Смол.), Грибовая трава (Уф.), На желтую грыжу трава, Грабликъ (Костр.), Деревянка (Черн., Кіев., Гродн.), Дубровка (Минск., Могил., Черн.), Дубровникъ бороной (Черн.), Жабная (Моск., Тул., Влад., Вор., Твер.), Мужская жабная (Моск. въ торг.), Мужской жабникъ (Кал.), Жабовникъ, Желѣзнякъ (Вят.), Завязный корень (Влад., Нижегород.), Лапшиникъ (Екат.), Молка, Непросыпка (Волог.), Натотикъ, Нечуй вѣтеръ (Курск.), Пятилистникъ, Пятипалочникъ, Подслипая трава (Кал., Пот.), Простудная трава (Тв., Пут.), Разрѣзъ трава (Яросл.), Рытница (Екат.), Ростинка (Харьк.), Растопырь (Ворон.), Свитукъ (Вор.), Свиная трава (Курск.), Серебренникъ, Серебрянка, Собачка (Тамб.), Сяворцовыя ягоды (Влад.), Улабникъ (Новор.), Царь-зелье (Курск.), Черноголовникъ, Червивая трава (въ б. ч.

Россіи), Червивка (по истребленію глистовъ и червей, Вятск.), Червишникъ (Малор.), Червичникъ, Червитчикъ (Малор.), Червоточникъ, Червоточина (Тул.), Червянецъ (Вор.), Червецъ (Вор., Орл., Полт., Курск.), по нахожденію кернеса и вслѣдствіе этого Канцелярское сѣмя. Серебристая лапчатка представляетъ изъ себя многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), распространенное почти по всей Европѣ и почти во всей Россіи. Стеблей обыкновенно нѣсколько, приподнимающихся, рѣже прямыхъ, дл. $5\frac{1}{2}$ —7 вершк., наверху вилообразно-вѣтвистыхъ, вмѣстѣ съ нижней стороной листьевъ было-войлочныхъ. Листья пятипальчатые, съ ланцетными прилистниками; листочки крупно-пильчатые, съ загнутыми внизъ краями, сверху обыкновенно темно-зеленые, снизу бѣлые, войлочно-волосистые; желтыя цвѣты собраны щитковидной метелкой. Цвѣтоножки послѣ цвѣтенія верхстоячія. Чашечка 5-тираздѣльная, прикрѣпленная къ полушаровидному цвѣтоложу и снабженная подчашиемъ о 5-ти листочкахъ; вѣнчикъ 5-тилепестный; лепестки обратно-яйцевидные, выемчатые, столь-же длинныя, какъ доли чашечки, или немного длиннѣе. Тычинокъ и плодолистиковъ неопредѣленное число; плодолистики съ короткимъ боковымъ столбикомъ расположены на выпукломъ цвѣтоложѣ. Плодъ состоитъ изъ сухихъ морщинистыхъ сѣмянокъ. Лапчатка цвѣтетъ съ мая до осени, растетъ на лугахъ, около дорогъ и между кустарниками. (Рис. 148.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Медицинское употребленіе лап-

чатки серебристой—то-же, что и лапчатки ползучей.

Лапчатка сѣровая (*Potentilla anconescens* Bess.). Горлянка (Моск.), Переломная (Вятск.), Червецъ (Курск.). Лапчатка сѣровая есть многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), распространенное почти по всей Европѣ, на юго-западъ и югъ Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ и въ Сибири. Стебли приподнимающіеся, довольно высокіе, вилообразно-вѣтвистые, пушистые и мягковолосистые; листья о 5-ти листочкахъ, съ разсѣченнымъ, иногда на-трое, среднимъ листочкомъ; листочки продолговато-клиновидные, надрѣзано-пильчатые, на нижней сторонѣ сѣрые отъ звѣздчатыхъ волосковъ; цвѣтоножки верхстоячія; чашечка пятираздѣльная, прикрѣпленная къ полушаровидному цвѣтоложу, снабженная пятилистнымъ подчашиемъ; доли чашечки острия; вѣнчикъ о 5-ти обратно-сердцевидныхъ лепесткахъ, немного превышающихъ чашечку, тычинокъ и плодолистиковъ неопредѣленное число; плодолистики съ короткимъ боковымъ столбикомъ прикрѣплены къ выпуклому цвѣтоложу. Плодъ состоитъ изъ сухихъ, немного морщинистыхъ, сѣмянокъ. Сѣровая лапчатка цвѣтетъ лѣтомъ, растетъ на холмахъ и между кустарниками.

Лапчатка-узикъ (*Potentilla Tormenilla* Schrenk; sin. *Tormenilla erecta* L., *Consolida rubra*, *Heptaphyllum*. Фармацевтическое названіе: *Tormentilla* s. *Dysenterica*, s. *Heptaphylla*, s. *Consolida*

rubra (Rad.) Балабанъ (Кіев.). Вязъ-трава. Вязиль (Полт.), Завязный корень (Моск.), Завязникъ (Полт.), Завязникъ стоячій, Деревянка (съ пол. Полт., Вил., Мог., Гродн., Минск.), Древянка (Яросл.), Дубровка (Зап. Росс., Мал. и др.), Дубровный корень, Заплеть (Олон.), Дикій калганъ (Тв., Тул., Новг., Пск., Влад.), Костоломъ (Пет.), Куръ-зелье, Куръ-зілле (Малор.), Курачье зелье (Подол.), Курьякъ (Меленки), Кустарное дерево (Вил.), Пушная трава (Пет.), Пушовникъ, Пушовное коренье (Пск.), Поносная трава (по употреб. отъ поноса Перм.), Перевязиха (Даль), Порошки (Полт.), Семипалочникъ, Сухостря (Перм.), Сердечный корень (Волог. Двиг.), Терментилъ (Малор., Водыч.), Термелина (Подол.), Сурмашна (Вит.), Узикъ (Моск., Двиг.), Червошникъ (Вор., Тар.), Черепъ (Курск.), Чебрець (Хар.), Червецъ, Шалашникъ (Черн.), Шентуха (Олон.). Лапчатка-узикъ представляетъ многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «розовцвѣтныхъ» (Rosaceae Hook et Benth.), распространенное почти во всей Европѣ и весьма обыкновенное во всей Россіи. Корневище толстое, деревянистое; стебель прямостоячій или приподнимающійся, выш. $3\frac{1}{2}$ —9 вершковъ. Прикорневые листья черешковые, тройчатые или пятинальчатые, стеблевые—тройчатые, сидячіе; прилистники большіе 3—5-тираздѣльные. Золотисто-желтые цвѣты сидятъ на длинныхъ цвѣтоножкахъ въ развѣдкахъ стебля или въ пазухахъ верхнихъ листьевъ. Вѣтчикъ о 4 (рѣдко о 5) золотисто-желтыхъ обратно-сердцевидныхъ лепесткахъ. Чашечка 4-храздѣльная, прикрѣпленная къ полушаровидному сухому цвѣтоложу, снабженная подчашиемъ о 4 листочкахъ. Тычинокъ и плодолистиковъ неопредѣленное число. Плодолистики съ короткимъ боковымъ столбикомъ расположены на выпукломъ цвѣтоложѣ. Плодъ сухой, состоящій изъ сѣмянокъ. Цвѣтетъ съ мая до августа. Растетъ на лугахъ, между кустарниками и въ лѣсахъ. Корень можетъ быть пригоденъ для дубленія кожи. (Рис. 149.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Лапчатка-узикъ употребляется въ медицинѣ въ тѣхъ-же случаяхъ, какъ и лапчатка ползучая. Корень его имѣетъ сильно вяжущія свойства, еще болѣе сильныя, чѣмъ лапчатки ползучей.

Лапы сорочьи, см. Шикма обыкновенная (*Tanacetum vulgare* L.).

Лапышка, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).

Ласъ, см. Хохлатка плотная (*Corydalis solida* Smith.).

Ласъ, см. Кокушникъ (*Gymnadenia Conopsea* Rich.).

Ласъ, см. Кукушкины слезки (*Orchis maculata* L.).

Ласъ
Ласикъ
Ласкавецъ(ь) } см. Ласковецъ круглолистный (*Bupleorum rotundifolium* L.).

Ласковецъ круглолистный (*Bupleorum rotundifolium* L.). Фармацевтическое названіе: *Perfoliata*. Володушка, Ласковци, Ласковці (Малор.), Ласкавецъ, Ласкавицъ, Ласкавица, Ласъ, Ласикъ, Ласочъ трава (Кален. Ставр.). Круглолистный ласкавецъ есть однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «зонтич-

ныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), распространённое въ средней и южной Европѣ, въ Привислянскомъ краѣ, въ юго-западныхъ губерніяхъ и на Кавказѣ, голубовато-зеленое, выш. 3—5 вершковъ, съ прямымъ, наверху вѣтвистымъ, круглымъ стеблемъ. Нижніе листья овальные, при основаніи суженные; стеблевые—яйцевидные или почти округлые, произзенные. Желтые цвѣты въ сложныхъ зонтикахъ о 5—10 лучахъ безъ обвертокъ. Обверточки-же состоятъ изъ 3—5 яйцевидныхъ, заостренныхъ прицвѣтничковъ, вдвое длиннѣе зонтичковъ. Зубцы чашечки незаметны; лепестковъ 4—5, съ загнутою внутрь верхушкою и съ выдающеюся на наружной сторонѣ ввидѣ бугра жилкою. Тычинокъ 5; завязь нижняя, 2-хлѣздная; столбиковъ 2, расширенныхъ при основаніи въ дискъ, покрывающій верхушку завязи. Плодъ, овальный по формѣ, состоитъ изъ 2-хъ сѣмянокъ, на разрѣзѣ 5-тигранныхъ, съ нитевидными ребрами, отдѣляющихся снизу вверхъ отъ остающагося на цвѣтоножкѣ столбика, обыкновенно, раздвоеннаго. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на поляхъ и сорныхъ мѣстахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Медицинское употребленіе ласковца въ настоящее время совсѣмъ оставлено. Въ народѣ (въ Киевской губерніи) въ отварѣ травы купаютъ дѣтей отъ грыжи.

Ласковицъ

Ласковица

Ласковци

Ласковці

Ласочъ-трава

} см. Ласковецъ круглолистный (*Bupleorum rotundifolium* L.).

Ластъ, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematidis* L.).

Ластовень, см. Ласточникъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* Moench).

Ластовень, см. Борщевикъ сибирскій (*Heracleum sibiricum* L.).

Ластовинная трава

Ластовица

Ластовичная трава

} см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).

Ластовичникъ, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).

Ластовичный корень, см. Ласточникъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* L.).

Ластовникъ, см. Репяшокъ обыкн. (*Agrimonia Eupatorium* L.).

Ласточникъ, см. Асклепιάсъ сирійскій (*Asclepias syriaca* L.).

Ласточникъ, см. Ласточникъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* Moench).

Ласточникъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* Moench.).

Фармацевтическое названіе: *Vincetoxicum* s. *Hirundinaria* (Radix).

Вородачь (Малор.), Николина бородка (Перм.), Чертова борода

(Кондр.), Борядь (Курск.), Вошючка (около Гурьева), Гавязь (Екат.),

Горлачникъ (Черн.), Горлачь, Змѣиный корень, Змѣиный корень,

Костка жабы, Кутра, Котовы сѣмена (Полтав.), Корень ластович-

ный, Ласточникъ (Могил.), Ластовень (Курск. Мызг.), Лускачь

(Кондр., Сл. Церк.), Ломинусъ (Екат.), Молочникъ, Норичникъ (Екат.),

Отрава, Противоядная трава, Простовидная трава, Палашенецъ

(Могил.), Ранникъ (Малор.), Росадникъ (Орлов.), Скалзубъ (Даль), Молочные стручки (Полт. ок. Гурьева), Стручковатое зелье, Стручковатая трава, Стручная трава (Екат.), Стручечникъ (Полт.), Стручки (Полт.), Сторчикъ (Екат.), Стулусье (Хар.), Тайна трава, Тогестъ, Траестъ, Ударникъ, Луговая вереника (Владим.), Горошекъ луговой (Минск.), Дягилъ (Черн.), Волики степные (Полт.), Вѣхъ (Екат.) Чертушка (Ворон.), Бергаметь (Екат.), Чернушка (Курск.), Терловый копотъ. Обыкновенный ласточникъ представляетъ многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «ласточниковыхъ» (*Asclepiadaceae* R. Br.), распространенное въ Средней Европѣ, въ средней и южной Россіи, съ ползучимъ корневищемъ и прямостоячимъ, простымъ или немного вѣтвистымъ стеблемъ, иногда наверху вьющимся и достигающимъ въ такомъ случаѣ болѣе ари. длины. Междоузлія его вдоль одной стороны пушистыя, листья короткочерешковые, по жилкамъ и по краямъ пушистые, съ округлымъ или сердцевиднымъ основаніемъ, заостренные, нижние—яйцевидные, средние—лйцевидно-ланцетные, верхніе—ланцетные. Цвѣты желтовато-бѣлые, вонючіе, въ конечныхъ и пазушныхъ, болышею частью вѣтвистыхъ зонтикахъ. Вѣтчикъ колесовидный, глубоко - пятираздѣльный; чашечка 5-тираздѣльная, съ 5-ю тупыми лопастями; тычинокъ — пять, сросшихся нитями въ трубочку, окружающую короткій столбикъ. Пыльники тѣсно прилегаютъ къ рыльцу и снабжены снаружи при основаніи придатками, образующими мясистую коронку. Цвѣтень образуетъ пыльцевыя массы, снабженныя ножками, пристающими къ железкамъ, находящимся по угламъ рыльца. Пестикъ состоитъ изъ 2 свободныхъ плодолистиковъ, несущихъ сросшіеся наверху столбики и одно широкое 5-угольное рыльце; послѣ цвѣтенія плодолистики расходятся и превращаются въ многосѣмянные заостренные голые листочки, раскрывающіеся по брюшному шву. Сѣмена снабжены пучкомъ волосъ на одномъ концѣ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками, причисляется къ числу ядовитыхъ.

Никакой скотъ, кромѣ козла, не употребляетъ его въ пищу. Стебли его могутъ быть обрабатываемы подобно коноплѣ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Прежде растеніе употреблялось отъ водной болѣзни, отъ заразительныхъ лихорадокъ и укушенія змѣй. Въ настоящее время оно совсѣмъ оставлено. Листья, приложенныя къ тѣлу, производятъ жаръ и раны.

Лататтѣ, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).

Лататтѣ біле

Лататтѣ жіноче

Лататтѣ жовтѣ

Лататтѣ чоловіче

Лататтѣ желто

Лататтѣ желтая, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith).

Латахъ, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).

Латукъ дикій, или салатъ дикій (*Lactuca Scariola* L.). Фармацевтическое названіе: *Lactuca silvestris*, s. *Scariola*. Зайчикъ

(Ворон.), Заячій позелець, Какпнъ (Малор., Сред., Екат.), Салатъ полевой, Молоканъ (Вор., Тар.), Молочка, Молочко (Малор.), Молочай (Сарат.). Дикій латукъ, или салатъ дикій представляетъ изъ себя двулѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ средней и южной Россіи, въ Сибири и Туркестанѣ. Стебель плотный, твердый, выш. $13\frac{1}{2}$ —28 вершк. Стеблевые листья въ вертикальной плоскости (повернутые на ребро), стоячіе, съ стрѣловиднымъ состояніемъ, по краямъ шиловато-зубчатые, снизу вдоль средней жилки съ жесткими пестинками; нижніе и средніе листья большею частью струговидные, верхніе—цѣльные, ланцетные. Все растеніе болѣе или менѣе сѣро-зеленое. Корзинки, содержащія отъ 6—12 блѣдно-желтыхъ цвѣтовъ, расположены пирамидальной метелкой и снабжены оберткой изъ нѣсколькихъ рядовъ черепичатыхъ листочковъ, изъ которыхъ внутренніе значительно длиннѣе наружныхъ и одинаковы между собою; цвѣтоложе голое. Всѣ цвѣты язычковые. Тычинокъ 5; нити ихъ свободны, пыльники-же спаяны въ трубочку, черезъ которую проходитъ столбикъ. Завязь нижняя, одногнѣздная, односѣмянная, съ однимъ столбикомъ и раздвоеннымъ рыльцемъ. Плодъ—буроватый, наверху острошиноватый сѣмянки. Цвѣтеть во второй половинѣ лѣта. Растетъ на поляхъ, при дорогахъ и сорныхъ мѣстахъ. (Рис. 150.)

Латукъ-салатъ, салатъ кочанный (*Lactuca sativa* L.). Салатъ, Салатъ-латукъ, Салата, Латуха. Латукъ-салатъ (кочанный) есть однолѣтняя трава изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), весьма похожая на предыдущій видъ: латукъ дикій, *Lactuca scariola* L. (см. описаніе), отъ котораго отличается обратно-щитковидной метелкой и горизонтально-расположенными овальными, иногда волнистыми, по краямъ зубчатыми листьями. Разводится на огородахъ. Цвѣтеть лѣтомъ.

Латукъ стѣнной (*Lactuca muralis* Less.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное почти повсемѣстно въ Европѣ, въ средней, южной и западной Россіи. Стебель прямостоящій, голый, полый, мягкій, выш. 7—22 вершк. Листья суженные въ крылатый черешокъ, лировидные, съ угловато-зубчатыми долями. Корзинки, содержащія по 5 желтыхъ цвѣтковъ, собраны наверху пирамидальной метелкой. Всѣ цвѣты язычковые. Нити тычинокъ свободны, пыльники спаяны въ трубочку, черезъ которую проходитъ столбикъ, оканчивающійся 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Завязь нижняя, одногнѣздная, односѣмянная. Плодъ—сѣмянка съ простымъ хохолкомъ. Цвѣтеть лѣтомъ, растетъ въ лѣсахъ. (Рис. 151.)

Латукъ ядовитый (*Lactuca virosa* L.). Фармацевтическое названіе ядовитаго латука: *Lactuca virosa*, s. *Intybus angustus* (Herba), *Lactuca foetida*. Лопуценъ (Курск.). (Табл. XXIV, фиг. 136.) Ядовитая вонючая двулѣтняя трава изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенная въ средней

Европѣ и въ средней Россіи, выш. отъ 14 вершк. до 2 ари. Листья горизонтальные, продолговато-яйцевидные, зубчатые, снизу вдоль средней жилки съ жесткими щетинками; нижніе листья цѣльные, суженные въ черешокъ, остальные—сидячіе, цѣльные или лопастные, при основаніи стрѣловидные. Корзинки, содержащія болѣе 5 цвѣтковъ, расположены рыхлой пирамидальной метелкой. Цвѣты желтые язычковые. Тычиннокъ 5, съ спаянными въ трубочку пыльниками, черезъ которую проходитъ столбикъ, оканчивающійся 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Завязь нижняя, одногнѣздная, односѣмянная. Плодь—черная, наверху и по краямъ остро-бугорчатая сѣмянка. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на каменистыхъ мѣстахъ и между кустарниками.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Всѣ части латука ядовитаго, такъ-же, какъ латука дикаго и латука-салата, содержатъ въ изобиліи млечный сокъ — «лактукарій», на вкусъ острый и горькій, обладающій несприятнымъ дурманящимъ запахомъ и дѣйствующій на животный организмъ подобно быленѣ; онъ во многихъ случаяхъ можетъ замѣнять опиѣ. Снотворное дѣйствіе латука ядовитаго было извѣстно еще Гиппократу. Первые медицинскія изслѣдованія надъ дѣйствіемъ латука надъ животными были произведены въ 1792 году. Изслѣдованія эти показали, что сокъ латука дѣйствуетъ подобно маковому соку, но только не всегда одинаково, что зависитъ и отъ способа добыванія сока, и отъ того, какой видъ латука берется. Въ настоящее время латукъ врачами не выписывается, также и въ народѣ онъ не употребляется.

Латуха, см. Латукъ-салатъ (*Lactuca sativa* L.).

Лахачи, см. Голубика (*Vaccinium uliginosum* L.).

Лационъ, см. Жасминъ полевой (*Lyculum Barbarum* L.).

Леандръ, см. Олеандръ (*Nerium Oleander* L.).

Лебеда, см. Лебеда морская (*Atriplex Halimus* L.).

Лебеда, см. Лебеда садовая (*Atriplex hortensis* L.).

Лебеда, см. Лебеда татарская (*Atriplex patula* L.).

Лебеда вонючая, см. Марь вонючая (*Chenopodium vulvaria* L.).

Лебеда душистая, см. Кудрявецъ (*Chenopodium Botrys* L.).

Лебеда мексиканская, см. Марь цѣльнолистная (*Chenopodium Bonus Henricus* L.).

Лебеда мелкая, см. Марь многосѣмянная (*Chenopodium polyspermum* L.).

Лебеда морская (*Atriplex Halimus* L.). Лебеда, Портулакъ морской. Морская трава съ мясистыми цѣльными листьями, произрастающая въ сѣверной Африкѣ. Изъ нея добываютъ сокъ.

Лебеда перуанская, см. Марь Квиноа (*Chenopodium Quinoa* Willd.).

Лебеда садовая (*Atriplex hortensis* L.). Лебеда, въ Малор.—Лобода червона, жовта, Лобода, Лобідка, Лободина, Лободина, Лобдила. Садовая лебеда представляетъ изъ себя прямостоящую однолѣтнюю траву, выш. 22—23 вершковъ, изъ се-

мейства «маревыхъ» (*Chenopodiaceae* Vent.), родомъ съ Востока, распространенную въ западной, средней и южной Россіи, въ Сибири и Туркестанѣ. Нижніе листья крупные, треугольные, продолговато-сердцевидные или копьевидные, цѣлюкрайные или выемчато-зубчатые; верхніе листья ланцетные, цѣлюкрайные. Многочисленные цвѣты расположены длинное верхушечной метелкой, однополые; мужскіе, или тычиночные, цвѣты съ 5-тираздѣльнымъ околоцвѣтникомъ и 5-ю тычинками; женскіе—пестичные, безъ околоцвѣтника, но съ травянистымъ, при плодахъ разстростоящимся, покрывальцемъ, состоящимъ изъ 2 болѣе или менѣе сросшихся между собою округло-яйцевидныхъ, тупыхъ или островатыхъ, сѣтчато-жилковатыхъ прицвѣтниковъ. Завязь свободная, одногнѣздная, съ однимъ яичкомъ и съ столбикомъ, оканчивающимся 2-мя нитевидными рыльцами. Все растеніе иногда кроваво-краснаго цвѣта. Плодъ заключенъ въ околоцвѣтникъ или между прицвѣтниками и слабо хрящеватымъ или перепончатымъ околоплодникомъ, раскрывающимся неправильно. Принадлежитъ къ числу сорныхъ травъ, произрастаетъ на бесплодныхъ мѣстахъ около жилья и въ садахъ. Цвѣтетъ въ іюлѣ и августѣ. Воздѣлывается кое-гдѣ на огородахъ, какъ овощъ, а кроваво-красная форма—въ садахъ для украшенія. (Рис. 152.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Употребленіе лебеды садовой извѣстно въ народной медицинѣ. Прежде растеніе давалось и врачами, но теперь оставлено. Отвары листьевъ и цвѣтовъ садовой лебеды пьютъ отъ кашля, сопровождающагося большимъ количествомъ вязкой, трудно отдѣляющейся, мокроты. Сѣмена садовой лебеды даются въ небольшомъ количествѣ отъ англійской болѣзни; принятые въ большомъ количествѣ (до драхмы—4 грам.) они вызываютъ тошноту, рвоту и поносъ. Снаружи лебеда садовая идетъ въ смягчительныя припарки, которыя кладутся на болящія геморроидальныя шишки, на подагрическія опухоли и другія болящія опухоли. Отваръ травы вмѣстѣ съ льнянымъ масломъ употребляется для клистировъ. Весною свѣжую отваренную траву ѣдятъ вмѣсто салата отъ запоровъ и желтухи. Изъ зрѣлыхъ сѣмянъ лебеды готовятъ крупу. Свареная въ молоко она даетъ довольно питательную и вкусную кашу.

Лебеда татарская (*Atriplex patula* L.). Лебеда, Воробьиные или вороньи столбы (Нижег.), Мелкій репейникъ (Нижег.). (Таб. XXV, фиг. 137.) Татарская лебеда представляетъ изъ себя свѣтло или темно-зеленую однолѣтнюю траву изъ семейства «маревыхъ» (*Chenopodiaceae* Vent.), распространенную во всей Европѣ и весьма обыкновенную въ Россіи. Татарская лебеда обыкновенно вся покрыта болѣе или менѣе мучнистымъ налетомъ. Стебель ея выш. отъ 6½ до 22 вершк. съ растопыренными вѣтвями. Листья треугольно-ланцетные, нижніе—зубчатые и обыкновенно копьевидные, верхніе—ланцетные или линейные. Цвѣты однодомные, однополые, въ клубочкахъ, собранныхъ тонкими колосьями. Мужскіе цвѣты съ 5-тираздѣльнымъ около-

цвѣтникомъ и 5 тычинками: женскіе—безъ околоцвѣтника, снабжены 2-мя копьевидно-ромбическими припцвѣтниками, сохраняющимися при плодахъ. Завязь свободная, одногнѣздная, съ однимъ яичкомъ. Пестикъ сжатый съ боковъ, съ 2 нитевидными рыльцами. Плодъ снабженъ перепончатымъ хрящеватымъ околоплодникомъ, неправильно раскрывающимся. Растетъ на сорныхъ и бесплодныхъ мѣстахъ около дорогъ. Цвѣтетъ въ іюль и августъ.

Лебедеръ, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa Pastoris* Moench.).

Лебедна, см. Маіоранъ (*Origanum majorana* L.).

Леванда, см. Благовонный колосъ (*Levandula spica* DC.).

Леванда желтая, см. Цминъ (*Helichrysum arenarium* L.).

Леваши терновые, см. Терновникъ (*Prunus spinosa* L.).

Левкой, см. Желтофіоль садовый (*Cheiranthus Cheiri* L.).

Левкой (*Matthiola annua* L.). Лилія бѣлая, Фіалокъ бѣлый, Фіалка гвоздичная, Фіалка душистая. Левкой представляетъ изъ себя травянистое, красиво цвѣтущее, съ пріятнымъ ароматнымъ запахомъ, однолѣтнее растение изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), произрастающее на югѣ Европы. Стебель достигаетъ до $\frac{1}{2}$ арш., листья очередные, ланцетные, сѣровато-пушистые, иногда слабо-зубчатые; чашечка 4-хлестная; лепестковъ 4; тычинокъ 6; плодъ—линейный, заостренный на концѣ, стручечекъ, раздѣленный перегородкой на 2 гнѣзда, съ сѣменами, расположенными въ одинъ рядъ. У насъ разводится въ многочисленныхъ видахъ, какъ любимое садовое и комнатное растение.

Левкой воздушный, см. Фіалка ночная (*Hesperis matronalis* L.).

Левкой озимый (*Matthiola incana* L.). Травянистое, съ ароматическимъ запахомъ, двулѣтнее и многолѣтнее растение изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), произрастающее на морскихъ берегахъ южной Европы. Стебель достигаетъ $\frac{1}{2}$ арш., вѣтвистый, съ ланцетными или продолговатыми тупыми сѣро-пушистыми листьями, иногда по краямъ волнисто-зубчатыми. Чашечка 4-хлестная; вѣнчикъ 4-хлепестный; тычинокъ 6; стручечекъ тупой на концѣ, раздѣленъ перегородкой на 2 гнѣзда; сѣмена расположены въ одинъ рядъ. Разводится, какъ ароматическое растение, для украшенія у насъ въ садахъ.

Левконія полевая, см. Иванъ чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Левконія полевая, см. Плакунъ трава (*Lythrum Salicaria* L.).

Левурда, см. Черемша (*Allium ursinum* L.).

Левурда, см. Горлецъ, раковая шейка (*Polygonum Bistorta* L.).

Легнотникъ, см. Пролѣска (*Anemone Hepatica* L.).

Легочница, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).

Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.). Фармацевтическое названіе: *Pulmonaria maculosa* (Hb. et Rd). Братъ и сестра (Умань), Бѣлостойка (Вятск.), Гуньба, Гоньба (Wied.) и изм. Коньба (Костр.), Дзвоники (Рог.), Живая трава лѣсовая.

(Кіев.), Згарь (Умань), Крупенки (Могил.), Лѣсное копыто (Тв.), Синенькій корешокъ (Вятск.). Легочница (Сп. Церк.), Медунница (въ б. ч. Россіи), Медунница лѣсная (Кіев.), Мединица (Вор.), Медунника, Медунка, Медунчики (Кіев., Перм.), Медовичокъ, Медунничникъ (Хар.), Медяникъ (Полт.), Мединика (Полт.), Медвѣжья трава (Моск.), Нервоцвѣтъ (Вятск.). Плющевая трава, Подорѣшникъ (Кал., Смол.), Попель (Вор.), Посѣчная трава (Вятск.), Припарная трава (Пет.), Снитка (Смол., Ельн.), Суконце (Перм.), Червленый листь (Ниж.), Щемелина (Малор.), Щемелица, Щемелина (Курск., Черн.), Языкъ воловій, Языкъ собачій (Вор.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «бурачниковыхъ» (Boraginaceae Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и въ Россіи до Кавказа и Урала, снабженное вѣтвистымъ корневищемъ, несущимъ пучки длинночерешковыхъ листьевъ, вмѣстѣ съ стеблемъ шершаво и коротко-железистымъ и дающимъ ежегодно цвѣтушіе стебли, снабженные сидячими листьями, продолговатыми, при основаніи суженными и полустеблеобхватывающими. Цвѣты первоначально красные, затѣмъ синіе, поникающіе, съ короткими цвѣтоножками, въ многоцвѣтковыхъ завиткахъ, собраны на верхушкѣ стебля щиткомъ и снабжены верхушечными листьями. Чашечка 5-тилопастная, при плодахъ колокольчатая и повислая; вѣнчикъ ворончатый, съ 5 группами волосковъ въ зѣвѣ, съ 5-тираздѣльнымъ отгибомъ. Тычинокъ 5. Завязь верхняя, 4-хгнѣздная, 4-хлопастная. Столбикъ съ 2-раздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ сухой, распадающийся при созрѣваніи на 4 округло-яйцевидныхъ орѣшка съ острымъ килемъ и острой верхушкою. Растетъ обыкновенно между кустарниками и въ лѣсахъ, цвѣтеетъ большею частью весною. (Габ. XXV, фиг. 139.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Прежде легочница употреблялась врачами отъ болѣзней легкихъ, теперь она извѣстна только какъ народное средство. Изъ травы завариваютъ чай, который пьютъ отъ охриплости, кашля и даже кровохарканія. Кромѣ того, въ народѣ отваръ легочницы принимаютъ отъ грыжи и изъ нея дѣлаютъ ванны при золотухѣ.

Ледъ, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq.).

Ледвенецъ, см. Ледвенецъ рогатый (*Lotus corniculatus* L.).

Ледвенецъ рогатый (*Lotus corniculatus* L.). Фармацевтическое названіе: *Lotus silvestris* s. *Trifolium corniculatum* (Hb. et Fl.). Акація полевая (Мог., Смол.), Батогень (Полт.), Заячьи братки (Гродн.), Вингрохъ (Орл.), Воробышья стручья (Самар.), Гороховникъ, Горицвѣтъ (Малор.), Лапчатый горошекъ, Лататый горошекъ (Волог.), Горобиный горошикъ (Малор.), Стручинный горохъ (Хар.), Желтушка (Яросл., Петр.), Заячья трава (Могил.), Комоница, Леденецъ (Собол.), Лядвянецъ, Ледвенецъ (въ б. ч. Росс.), Лядвенецъ (Мал), Лотія, Лоть, Черелеть (Черн., Кіев.), Перстинецъ (Подол.), Рута полевая (Гродн.), Стручечный клей, Тройчистое сѣмя (Волин.), Холостой конецъ (Курск., Том.), Черевички, Трилистникъ розовый. Рогатый ледвенецъ представляетъ

многочѣе травянистое растеніе изъ семейства «мотыльковыхъ» (Papilionaceae Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и въ Россіи. Стебель приподнимающійся и лежащій, дл. 2—13 вершк. Тройчатые листья снабжены прилистниками, по величинѣ и по виду очень сходными съ листочками листьевъ, отчего эти послѣдніе кажутся состоящими изъ 5 листочковъ. Цвѣтоносы въ нѣсколько разъ длиннѣе листьевъ; довольно крупные золотисто-желтые цвѣты собраны въ небольшомъ числѣ (обыкновенно по 5—7) зонтиками. Чашечка 5-тизубчатая, двугубая; вѣнчикъ 5-тилепестный, мотыльковый, флагъ снаружи чисто-красноватый; тычинокъ 10, двубратственныхъ. Плодъ — бобъ. Растетъ на лугахъ и на поляхъ; цвѣтетъ постоянно съ конца мая по октябрь.

Леденецъ см. Леденецъ рогатый (*Lotus corniculatus* L.).

Ледокъ, см. Хрустальная травка (*Mesembrianthemum cristallinum* L.).

Ледуночка, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq.).

Ледяная трава, } см. Хрустальная травка (*Mesembrianthemum cristallinum* L.).

Лежанка, } см. Вероника лекарственная (*Veronica officinalis* L.).

Лемъ, см. Вязъ обыкновенный (*Ulmus effusa* Willd.).

Ленъ, см. Ленъ посѣвной (*Linum usitatissimum* L.).

Ленъ, см. Ленъ слабительный (*Linum catharticum* L.).

Ленъ дикий, см. Иванъ чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Ленъ дикий (*Linaria vulgaris* Mill.). Фармацевтическое названіе: *Antirrhinum vulgare* s. *Osyris*. Дикій ленъ имѣетъ слѣдующія названія: Баганъ (Пск.), Баранчики (Вор.), Будра (Гв.), Башмачникъ, Библинъ, Библинъ ядовитый (Пск.), Выжлинъ, Выжликъ (Сл. Церк.), Виждикъ, Выдальникъ, Внутренникъ, Путренникъ, Гладовникъ (Кіев.), Гримонъ (Орл.), Горловая трава (Арх.), Дележникъ (Уф.), Долгоперникъ (Ниж.), Дрочица (Полт.), Жаберникъ, Жабрей (Приарг. кр.), Жабра (Моск.), Желтушка (Курск.), Желунецъ (Даль.), Жолуницъ (Вят.), Заиоъ (Могил.), Звоникъ (Тавр.), Звоники желтые (Екат.), Зорница (Могил.), Львиный зѣвъ (Яросл.), Заячья кровь (Полт.), Зайцевъ ленъ (Малор.), Клопецъ (Костр.), Коровье масло (Могил.), Коровникъ (Курск.), Кукушкины слезы (Влад.), Котовы яйца (Вятск.), Ленъ дикий, Ленъ Дѣвы Маріи, Ленокъ (Малор.), Лопокъ, Ленокъ (Малор.), Ленъ полевой (Приарг. кр.), Ленокъ польный (Гродн.), Лыница льсная (Гродн.), Лыника (Двин.), Ленovníкъ (Сарат.), Ленникъ, Люнецъ (Волын.), Маточникъ (Могил., Вятск.), Медовики (Вятск.), Медунка (Курск.), Медунка (Астр., Уфим.), Молошникъ (Тульск.), Молошничокъ (Умань), Микифорцы (Тул.), Мглѣтникъ (Нижег.), Мурокъ полевой (Вор.), Младенческая (Влад., Ниж.), Нѣмица льсная (Полт.), Остудникъ (Укр.), Огурешникъ степной (Полт.), Никульки (Пск.), Никупечникъ (Волог.), Платикъ (Вятск.), Поскрышникъ (Тамб.), Путникъ (Вятск.), Пыная трава (Ниж.), Расходникъ (Вор.), Ря-

бинка (Вор.), Рыжикъ (Влад.), Розмаринъ полевой (Минск.), Сокирка, Серпорвзъ (Черн.), Сословникъ, Сорокопитникъ, Сорокоперникъ (Костр.), Собачки (Пенз.), Стаканчики (Арх., Костр.), Соска, Соски (Ниж.), Сахарники (Моск.), Стоголовникъ (Полт.), Серпій (Вор.), Серикъ (Олон.), Узкая трава (Олон.), Урвзная трава (Волог.), Чистикъ (Черн.), Чистецъ (Полт.), Чистецъ (Малор.), Чай полевой, Черевички зазулины, Щелчокъ (Вятск.), Яснодушникъ. Травянистое многолѣтнее растеніе изъ семейства «норичниковыхъ» (*Scrophulariaceae* R. Br.), распространенное въ сѣверной и средней Европѣ и весьма обыкновенное въ Россіи, голое, только содвѣтіе покрыто железистымъ пушкомъ. Стебель прямостоящій, выш. 6—22½ вершковъ; листья многочисленные, очередные, узко-ланцетные или линейные, съ завороченными краями, острые, съ тремя жилками. Крупные сѣрно-желтые цвѣты собраны длинною верхушечною кистью; чашечка 5-тираздѣльная, голая, съ ланцетными острыми долями; вѣничикъ двугубый, съ трубочкой, снабженной при основаніи шпорою, сѣрно-желтый, съ оранжевой выпуклиной на нижней губѣ, заслоняющей зѣвъ вѣничка. Тычинокъ 4; завязь верхняя, двугнѣздная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—почти округлая двугнѣздная коробочка, раскрывающаяся наверху по сторонамъ перегородки 6—8 зубцами. Растетъ на поляхъ между посѣвами, въ степяхъ на бесплодныхъ и сорныхъ мѣстахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Полупаразитное растеніе.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Растеніе имѣетъ мочегонныя и слабительныя свойства и часто употребляется въ народной медицинѣ отъ водяной болѣзни, желтухи, отъ боли въ животѣ, отъ головной боли, грыжи, золотухи, глестовъ и отъ хроническихъ накожныхъ болѣзней и снаружи. ввидѣ припарки и мази—отъ геморроидальныхъ шишекъ. Для внутренняго употребленія горсть цвѣтущей травы заливается 6 унциями (180 грм.) кипящей воды, которой даютъ немного настояться, потомъ процеживаютъ, подслащиваютъ и принимаютъ черезъ 1 часъ или черезъ 2 часа по столовой ложкѣ. Для припарокъ берется свѣжая толченая трава или-же вареная съ молокомъ. На геморроидальныя шишки прикладываютъ свѣжевыжатый сокъ съ небольшимъ количествомъ квасцовъ. Свѣжевыжатымъ сокомъ также примачиваютъ глаза отъ воспаленія вѣкъ. Для приготовления мази выжимаютъ сокъ изъ всего растенія и смѣшиваютъ его съ сливочнымъ масломъ. Скотъ эту траву не ѣстъ, но ее полезно разсыпать въ стойлахъ для истребленія насккомыхъ.

Изъ цвѣтущаго растенія готовится вода, которую съ уснѣхомъ употребляютъ для уничтоженія прыжиковъ и угрей на лицѣ.

Ленъ дикій, см. Ленъ слабительный (*Linum catharticum* L.).

Ленъ дикій, см. Звѣздчатка злачная (*Stellaria graminea* L.).

Ленъ Двѣи Маріи, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

Ленъ зайчій, см. Кукушкинъ ленъ (*Polytrichum commune* L.).

Ленъ зайцевъ, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

ЛЕНЬ ко(у)кушкинъ, см. ЛЕНЬ слабительный (*Linum catharticum* L.).

ЛЕНЬ ко(у)кушкинъ, см. Кукушкинъ лЕНЬ (*Polytrichum commune* L.).

ЛЕНЬ лѢСНОЙ, см. Звѣздчатка злачная (*Stellaria graminea* L.).

ЛЕНЬ Марьянъ, см. Ковыль перистый (*Stipa pennata* L.).

ЛЕНЬ новозеландскій (*Phormium tenax* Forst.). Растеніе изъ семейства «лилейныхъ» (*Liliaceae* Juss.), произрастающее въ Новой Зеландіи. Его линейно-ланцетные вѣчно-зеленые листья доставляютъ извѣстный свою крѣпостью и прочностью волокна, употребляемая преимущественно на выдѣлываніе корзинъ, ковриковъ, сѣтей, бичевокъ, лесъ для удочекъ и т. п. Культивируется нынѣ съ успѣхомъ и на югѣ Европы, даетъ оно въ 3 раза болѣе волоконъ, нежели нашъ лЕНЬ; принадлежитъ къ вѣчно-зеленымъ растеніямъ и имѣетъ еще то преимущество, что для сбора волоконъ достаточно срѣзывать его листья, не выдергивая самого растенія. Волокна его въ большомъ количествѣ препровождаются въ Англію, гдѣ изъ нихъ выдѣлываютъ канаты и ткани для парусовъ. Кромѣ того, все растеніе нерѣдко культивируется въ качествѣ декоративнаго. Корень его содержитъ горькій сокъ, которымъ матери въ Новой Зеландіи мажутъ грудныя соски во время отнятія дѣтей отъ груди.

ЛЕНЬ полевой, см. ЛЕНЬ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

ЛЕНЬ посѣвной (*Linum usitatissimum* L.). Однолѣтнее травянистое красивое растеніе изъ семейства «леновыхъ» (*Linaceae* DC.), родомъ, какъ предполагаютъ, съ западной Азии, выш. 7—14 вершковъ. Стебель тонкій, прямостоящій, наверху вѣтвистый, съ спирально-расположенными узко-ланцетными листьями. Довольно крупныя голубыя цвѣты собраны кистевидными полузонтиками; чашелистикомъ, лепесткомъ, тычинокъ и стебелькомъ по 5. Плодъ — шаровидная коробочка. Разводится въ Россіи въ большомъ количествѣ, какъ одно изъ весьма полезныхъ растеній. Цвѣтетъ съ іюня до августа. Лубяныя волокна его идутъ на выдѣлываніе тканей; масло, выжимаемое изъ сѣмянъ, идетъ на освѣщеніе, приготовленіе лаковъ, а также употребляется въ медицину. (Таб. XXV. фиг. 138.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Отваръ льняного сѣмени имѣетъ свойства обволакивать своею слизью ткани и тѣмъ притуплять ихъ чувствительность; отваръ принимается внутрь, а также употребляется снаружи. Для наружнаго употребленія изъ льняного сѣмени дѣлаются, кромѣ того, припарки. Льняное масло въ народѣ идетъ для приготовленія различныхъ мазей. Сѣмена очищенные употребляются внутрь, какъ слабительное. Для приготовленія отвара льняного сѣмени берутъ горсть (отъ $\frac{1}{2}$ —1 унца=15—30 грм.) цѣльныхъ сѣмянъ, заливаютъ ихъ бутылкою кипящей воды, даютъ вскипеть одинъ разъ, затѣмъ процеживаютъ и пьютъ по чайной чашкѣ нѣсколько разъ въ день. Отваръ льняного сѣмени, такъ-же, какъ и конопляный отваръ такой-же крѣпости, очень хорошо помогаетъ отъ частыхъ позывовъ и болей при мочеиспусканіи. Отваръ льня-

ного сѣмени пьютъ отъ кашля, чувства щекотанія въ горлѣ и при трудномъ отдѣленіи мокроты.

Для наружнаго употребленія берется такой-же отваръ льняного сѣмени. Онъ идетъ для сиринцеванія при сильныхъ боляхъ въ животѣ у женщинъ и при рѣзи при мочеиспусканіи, его употребляютъ также для клистировъ отъ поносовъ съ частыми позывами и отдѣленіемъ слизи и крови въ испражненіяхъ. Льняное масло, выжимаемое безъ поджариванія сѣмянъ, не скоро горкнетъ и у крестьянъ служитъ вмѣсто деревяннаго и миндальнаго масла. Крестьяне пьютъ его отъ глистовъ, отъ свинцовой колики и отъ запоровъ. При кровохарканіи его даютъ съ чистымъ желткомъ, также въ этомъ видѣ его принимаютъ при кровавомъ поносѣ и боляхъ въ животѣ. Прежде врачи давали льняное масло столовыми ложками при геморроѣ и каменной болѣзни желчнаго и мочевого пузыря. Къ льняному маслу прибавляется камфора, и такое камфорное масло служитъ для втираній при ломотѣ въ ногахъ и рукахъ, при боляхъ въ груди и животѣ. Внутрь свѣжее льняное масло принимается столовыми ложками нѣсколько разъ въ день. Къ клистиру прибавляется на два стакана воды или отвара ромашки отъ 6 до 8 столовыхъ ложекъ масла. Масляные клистиры дѣйствуютъ гораздо скорѣе и сильнѣе простыхъ водяныхъ. Обожженные мѣста смазываются льнянымъ масломъ, смѣшаннымъ съ яйцами: на $\frac{1}{2}$ бутылки масла берутъ 4 свѣжихъ сырыхъ яйца, хорошо размѣшиваютъ и прикладываютъ на обожженные мѣста; другая мазь отъ ожоговъ состоитъ изъ льнянаго сѣмени, смѣшаннаго поровну съ известковой водой.

Изъ сѣмянъ льна приготовляютъ припарки въ двухъ видахъ: сухія и влажныя. Сухія припарки дѣлаются изъ сухого цѣльнаго сѣмени: его кладутъ на сѣвородку и согреваютъ въ печи, затѣмъ насыпаютъ въ мѣшокъ, который прикладывается къ больному мѣсту. Такія сухія припарки полезны при боляхъ въ животѣ, зависящихъ отъ прохожденія камней, также отъ колющихъ болей въ груди при воспаленіяхъ оболочки легкихъ (плевритахъ). Влажныя припарки дѣлаются изъ толченаго льнянаго сѣмени: его разводятъ немного водою, грѣютъ и накладываютъ въ мѣшечки. Влажныя припарки кладутся только на ограниченныя пространства, напримѣръ, на вередъ и чирьи для ускоренія ихъ созрѣванія, на опухшія лимфатическія железы; влажныя припарки сохнутъ скорѣе, потому ихъ приходится чаще мѣнять.

Очищенные сѣмена льна идутъ въ продажу въ аптекахъ и служатъ слабительнымъ средствомъ; люди, страдающіе хроническими запорами, принимаютъ ежедневно на ночь чайную ложку цѣльнаго льнянаго сѣмени, смѣшаннаго въ $\frac{1}{2}$ стаканѣ воды. На нѣкоторыхъ сѣмена эти дѣйствуютъ хорошо, но безъ назначенія или совѣта доктора ихъ принимать не слѣдуетъ.

Въ ветеринарной медицинѣ льняное сѣмя употребляется въ тѣхъ-же случаяхъ, какъ и у людей, т. е., при всѣхъ раздраженіяхъ слизистой оболочки пищеварительнаго канала, легочныхъ путей и мочевого пузыря. Также отваръ льнянаго сѣмени даетъ

ся какъ обволакивающее, при отравленіяхъ ѣдкими веществами. Отваръ готовится такой-же крѣпости, какъ и для людей; для достиженія большей густоты его оставляютъ дольше кипѣть.

При выжимкѣ масла изъ сѣмянъ остается избоина; изъ нея готовятъ лененки, которые кладутъ въ кормъ скоту, отчего они даютъ болѣе богатое жиромъ молоко.

Ленъ проносный, см. Ленъ слабительный (*Linum catharticum* L.).

Ленъ рыжій, см. Рыжикъ посѣвной (*Camelina sativa* Crantz.).

Ленъ слабительный (*Linum catharticum* L.). Ленокъ, Ленъ дикій, Ленъ кукушкнѣ, Сорочій ленъ, Ленъ проносный. Однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «леновыхъ» (*Linaceae* DC.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель выш. 2½—7 вершковъ, вилообразно-развѣтвленный, съ продолговатыми супротивными листьями, по краямъ рѣсничато-шереховатыми. Нижніе листья обратно-яйцевидные. Цвѣты мелкіе, бѣлые. Чашелистиковъ, лепестковъ, тычинокъ и столбиковъ по 5; чашелистики острые, по краямъ железистые, вдвое короче лепестковъ; лепестки бѣлые, при основаніи желтые. Цвѣтоножки прямостоячія. Плодъ—коробочка съ 5 полными и 5 неполными перегородками. Встрѣчается на сыроватыхъ лугахъ и между кустарниками. Цвѣтетъ съ іюня до сентября. Всѣ части растенія обладаютъ сильнымъ слабительнымъ свойствомъ. (Рис. 153.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Ленъ слабительный употребляется только въ народной medicinѣ. Сушеную траву слабительнаго льна принимаютъ отъ запоровъ, водянки въ начальномъ ея состояніи и отъ каменной болѣзни почекъ и мочевого пузыря.

Двѣ драхмы (8,0 грм.) сушеной травы заливаютъ 12-ю столовыми ложками кипящей воды или сыворотки и принимаютъ черезъ 2 часа по столовой ложкѣ. Сушеную траву настаиваютъ еще на винѣ. На бутылку вина кладутъ 1 унцію (30 грм.) сушеной травы, настаиваютъ 12 часовъ, затѣмъ процеживаютъ и пьютъ по рюмкѣ передъ ѣдой. Также настаиваютъ сушеные листья на льняномъ маслѣ, которое даютъ вмѣсто кастороваго, въ слѣдующихъ дозахъ: взрослымъ отъ 1—2 унцъ (30—60 грм.), дѣтямъ отъ 1—4 драхмъ (4,0—15,0 грм.).

Домашнее слабительное готовится слѣдующимъ образомъ: 3 драхмы (12,0 грам.) сухихъ листьевъ льна слабительнаго заливаются пивной бутылкой кипящей воды, туда-же прибавляется 1 драхма (4,0 грм.) сѣмянъ укропа или аниса и 2 драхмы (8,0 грм.) изрѣзаннаго корня. Все это настаивается ½ часа, затѣмъ процеживается и принимается по чайной чашкѣ; если одна чашка, принятая на ночь, не дѣйствуетъ, на утро принимаютъ другую такую-же порцію.

Ленъ сорочій, см. Ленъ слабительный (*Linum catharticum* L.).

Ленъ сорочій, см. Повелка (*Cuscuta Tourn.*).

Ленекъ, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).

Ленецъ, см. Ленецъ ленолистный (*Thesium linophyllum* L.).

Ленецъ ленолистный (*Thesium linophyllum* L.). Гвоздичка, Ленецъ (Гродн.), Ленолистъ, Ленолистникъ, Лынянка. Ленецъ есть многолѣтнее зеленое полупаразитное травянистое растеніе, присасывающееся своими корнями къ корнямъ другихъ растений, изъ семейства «сандиловыхъ» (*Santalaceae* R. Br.), распространенное въ средней Европѣ, въ средней и южной Россіи, выш. до 3 верш. Листья очередные, ланцетные или линейные. Соцвѣтіе метельчатое, съ отстоящими вѣтвями; цвѣты мелкіе, невзрачныя, съ 4—5-тираздѣльнымъ, снаружи зеленоватымъ, внутри бѣлымъ околоцвѣтникомъ. Тычиночекъ 4—5. Завязь нижняя, одногнѣздная, съ 2—4 яичками и однимъ столбикомъ. Плодъ—орѣшекъ. Растетъ на лугахъ и между кустарниками. Цвѣтетъ лѣтомъ. (Рис. 154.)

- Ленникъ** }
Леновникъ } см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).
Ленодушникъ трава }
Ленокъ }
Ленокъ, см. Дрокъ красивый (*Genista tinctoria* L.).
Ленокъ лѣсовой, см. Истодъ хохлатый (*Polygala comosa* Schk.).
Ленолистъ } см. Ленецъ ленолистный (*Thesium linophyllum* L.).
Ленолистникъ }
Ленчикъ, см. Горлица ястребинковая (*Picris hieracioides* L.).
Лепехъ, см. Аиръ обыкновенный (*Acorus calamus* L.).
Лепеха, см. Ежеголовка вѣтвистая (*Sparganium ramosum* L.).
Лепеха, см. Камышъ лѣсной (*Scirpus silvaticus* L.).
Лепецъ, см. Подмаренникъ цѣпкій (*Gallium Aparine* L.).
Лепешка } см. Аиръ обыкновенный (*Acorus calamus* L.).
Лепешникъ }
Лепешникъ, см. Алтей лекарственный (*Althaea officinalis* L.).
Лепешникъ, см. Ежеголовка вѣтвистая (*Sparganium ramosum* L.).
Лепешникъ трава, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).
Лепешня, см. Ежеголовка вѣтвистая (*Sparganium ramosum* L.).
Лепешнякъ, см. Камышъ лѣсной (*Scirpus silvaticum* L.).
Лепилки } см. Репяшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatoriolum* L.).
Лепильникъ }
Лепица } см. Острица лежащая (*Asperugo procumbens* L.).
Лепчица }
Лепчица, см. Подмаренникъ цѣпкій (*Gallium Aparine* L.).
Лепчица } см. Подмаренникъ сѣверный (*Gallium boreale* L.).
Летучая трава }
Летучка, см. Жабникъ пашенный (*Filago arvensis* L.).
Летучка, см. Ястребинка зонтичная (*Hieracium umbellatum* L.).
Летучка, см. Клеверъ пашенный, или кошачій (*Trifolium arvense* L.).
Летучки, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).
Лечуха, см. Люцерна серповидная (*Medicago falcata* L.).
Лечуха, см. Люцерна посѣвная (*Medicago sativa* L.).

Лешина
 Лешина }
 Лешинникъ } см. Олъха (*Alnus Tourn.*).
 Лешинникъ }
 Лешинникъ }

Лешка }
 Леща } см. Орѣхъ лѣсной (*Corylus Avellana L.*).
 Лещина }

Лещина, см. Чечевица настоящая, или посѣвная (*Ervum Lens L.*).

Лещиха, см. Купальница европейская (*Trollius europaeus L.*).

Лизунъ, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa L.*).

Ликтра, см. Вьюнокъ луговой (*Convolvulus arvensis L.*).

Лилейка, см. Голубки обыкновенные (*Aquilegia vulgaris L.*).

Лилейка, см. Василистникъ голубковый (*Thalictrum aquilegifolium L.*).

Лилея, см. Лилія бѣлая (*Lilium candidum L.*).

Лилея лазоревая, см. Касатикъ нѣмецкій (*Iris germanica L.*).

Лилія, см. Голубки обыкновенные (*Aquilegia vulgaris L.*).

Лилія, см. Лилія бѣлая (*Lilium candidum L.*).

Лилія бѣлая, см. Левкой (*Matthiola annua Sweet.*).

Лилія бѣлая (*Lilium candidum L.*). Лилея, Лилія. Бѣлая лилія есть многолѣтнее луковичное травянистое растеніе изъ семейства «лилейныхъ» (*Liliaceae* Dc.), встречающееся въ Закавказьѣ. Луковича его состоитъ изъ многихъ мясистыхъ чешуй, черепичатыхъ и легко отламывающихся. Цвѣточный стебель голый, облиственный; листья всѣ спиральные, узкіе—обратно-яйцевидные, верхніе—ланцетные. Крупные, душистые бѣлые цвѣты собраны въ числѣ 8 наверху стебля желтою поникающею кистью. Околоцвѣтникъ колокольчатый, бѣлый, внутри безъ бородавокъ, 6-тилистный, отпадающій, съ отогнутыми листочками, снабженными продольною медовою бороздкою при основаніи. Тычинокъ 6, съ качающимися пыльниками, прикрѣпленными въ срединѣ къ тычиночной нити; завязь верхняя, 3-хгѣздная, съ 1 столбикомъ, сверху утолщеннымъ и снабженнымъ толстымъ 3-хлопастнымъ рыльцемъ. Плодъ—тупо-6-угольная коробочка, съ многочисленными сплюснутыми семенами въ каждомъ гнѣздѣ. Цвѣтетъ лѣтомъ и извѣстна, какъ одно изъ самыхъ красивыхъ декоративныхъ растений, разводимыхъ въ садахъ.

Лилія водяная, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum Smith.*).

Лилія водяная (*Nuphar alba L.*). Фармацевтическое названіе: *Nuphar alba*, *Nenuphar*. Водяная лилія имѣетъ слѣдующія названія: Адалень, Одолень, Одалень, Водолей, Вѣденскій одалень, Балаболка (Перм.), Гуски или Бабки, Залапокъ (Влад., Вятск.), Латагга жіноче, Латагга біле (Малор.), Лагушнякъ большой, Плывучникъ (Волг., Под.). Бѣлая курочки (Кал., Смол.). Воднопцѣтъ (Олон.), Водяной попутникъ, Водяная маковка, Тямька (Олон.), и всѣ, какъ при «кувшинкѣ желтой», съ прибавленіемъ только «бѣлый». Водяная лилія представляетъ изъ себя водяное многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства

«кувшинковыхъ» (*Nymphaeaceae* Dc.), распространенное почти по всей Европѣ и Россіи. Корневище ползучее, отъ котораго отходятъ округлые, съ глубоко-сердцевиднымъ основаніемъ, листья и длинныя цвѣтоножки, несущія одиночные, красивые, бѣлые цвѣты, плавающие на поверхности воды. Чашечка 4-хлестная, съ чашелистиками, снаружи зеленого цвѣта; многочисленные бѣлые лепестки немного длиннѣе чашелистиковъ; внутренніе изъ нихъ съ многочисленными тычинками и прикрѣплены къ диску, покрывающему всю поверхность завязи. Завязь многогнѣздная, съ сидячимъ лучистымъ рыльцемъ, съ многочисленными яйчками, прикрѣпленными къ боковымъ стѣнкамъ гнѣздъ завязи. Плодъ — ягодообразный, съ измѣняющеюся мякотью и съ поверхностью, покрытой рубцами. Растетъ въ рѣкахъ, озерахъ, прудахъ и заливахъ. Цвѣтетъ съ конца мая до августа. (Рис. 155.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Употребленіе водяной лиліи извѣстно только въ народной медицинѣ. Пользуются корнемъ, цвѣтами и плодами растенія. Отваръ изъ корней, приготовляемый изъ 1—2 унцій (30—60 грм.) корня на фунтъ воды, принимаютъ черезъ 2 часа при задержаніи мочи, боляхъ и частыхъ позывахъ на мочеиспусканіе. При слізетеченіяхъ и обильныхъ гнойныхъ выдѣленіяхъ пьютъ винную настойку корня бѣлой лиліи. Для приготовленія отвара изъ цвѣтовъ горсть свѣжихъ цвѣтовъ заливаютъ стаканомъ кипятка, отваръ принимаютъ внутрь глотками для утоленія жажды, отъ жара и бессонницы; къ листьямъ иногда прибавляютъ и корня, тогда отваръ становится крѣпче, и его принимаютъ отъ запоровъ и желтухи. Корни, отваренные въ сусль, даютъ пить больнымъ отъ чахотки, также его даютъ кормилицамъ для увеличенія количества молока.

Толченые листья прикладываютъ къ воспаленнымъ опухолямъ и къ подошвамъ для уменьшенія жара. Для этой-же цѣли прикладываютъ разрѣзанные на пластинки свѣжіе корни. При боли въ глазахъ толченые листья или разрѣзанные корни прикладываются къ вискамъ. Корни варятъ въ шивѣ, этою жидкостью моютъ голову отъ выпаденія волосъ. Въ Турціи перегоняютъ воду съ бѣлыми цвѣтами лиліи и приготовляютъ косметическую воду, изъ этой-же воды приговляется напитокъ, извѣстный подъ именемъ шербета.

Лилия водяная желтая, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Лилия желтая, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).

Лилия индійская, см. Азедарахъ обыкновен. (*Melia Azederach* L.).

Лилия красная, см. Кудри царекія (*Lilium Martagon* L.).

Лилия красная (*Lilium bulbiferum* L.). Златовласка (Даль.). Лилия красная есть травянистое многолѣтнее луковичное растеніе изъ семейства «лилейныхъ» (*Liliaceae* Dc.), произрастающее въ средней Европѣ. Луковича состоитъ изъ мясистыхъ, легко отламывающихся чешуй, черенчато расположенныхъ. Стебель прямой, вып. 7—14 вершковъ, при основаніи пушистый, съ очердными ли-

нейно-ланцетными листьями, изъ которыхъ верхніе съ луковичками въ пазухахъ. Цвѣты прямостоячіе, числомъ отъ 1—5, въ зонтикахъ. Околоцвѣтникъ ворончато-колокольчатый, ярко оранжевый, съ бурыми пятнами, усаженный съ внутренней стороны при основаніи буровато-красными мясистыми бородавками, 1-листный, опадающій. Тычинокъ 6, съ качающимися пыльниками; завязь 3-хгнѣздная, съ 1 столбикомъ, сверху утолщеннымъ, снабженнымъ толстымъ 3-хлопастнымъ рыльцемъ. Плодъ—6-угловая тупая коробочка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Разводится въ садахъ.

Лилия лісна

Лилия лѣсная

Лилия пестрая

см. Кудри царскія (*Lilium Martagon* L.).

Лилия въ тернахъ, см. Жимолость душистая (*Lonicera Caprifolium* L.).

Лилия турецкая

Лилия чалмовидная

см. Кудри царскія (*Lilium Martagon* L.).

Лимбовое дерево, см. Кедръ сибирскій (*Pinus Cembra* L.).

Лимонъ обыкновенный (*Citrus limonium* Risso.). Лимонное дерево, Цитронъ, Бадронки. Лимонъ обыкновенный представляетъ изъ себя дерево выш. отъ 1 саж. и болѣе изъ семейства «померанцевыхъ» (*Aurantaceae*), родомъ изъ тропической Азии, но давно уже воздѣлываемое въ средиземно-морской области. Цвѣтетъ почти въ продолженіе всего года. Плоды его, подобно апельсинамъ, составляютъ важный предметъ торговли. Лимонъ обыкновенный разводится въ Россіи въ садахъ, по восточному побережью Чернаго моря, около Сухума и Батума. Плоды его употребляются не только въ домашнемъ обиходѣ, но и въ медицинѣ. (Таб. XXV, фиг. 140.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Изъ лимоннаго сока добывается лимонная кислота, которая находится въ продажѣ и употребляется для приготовленія лимонадовъ и шипучихъ смѣсей. Лимонный сокъ одобряется, какъ лекарство противъ цынги. Свѣже-выжатымъ лимоннымъ сокомъ смазывали прежде дифтеритные налеты въ горлѣ. Отъ упорной рвоты беременныя свѣжій разрѣзанный лимонъ прикладываютъ поверхностью разрѣза въ подложечную ямку и держать на ней, пока не наступитъ сильная боль. На мѣстѣ прикладыванія лимона получается рѣзкая краснота, и часть крови отвлекается отъ желудка на кожу; такое отвлеченіе, подобное дѣйствию горчичника, успокаиваетъ рвоту. Кромѣ того, было предложено врачами прикладывать лимонную кислоту къ раковымъ опухолямъ для уменьшенія стрѣляющихъ болей.

Изъ свѣжихъ лимоновъ дѣлаютъ лимонадъ, нарѣзавъ въ стаканъ воды 2—3 кусочка лимона и прибавивъ сахара по вкусу. Такой лимонадъ охотно пьютъ больные, имѣющіе повышенную температуру. Изъ лимонной корки, изъ ея самаго верхняго мясистаго вещества, добывается дорогое душистое лимонное масло.

Въ гомеопатіи лимонный сокъ употребляется, какъ противоядіе дурману.

Лимонникъ, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).

Лимонное дерево, см. Лимонъ обыкновенный (*Citrus Limonium* Risso.).

Лимоновый цвѣтъ, см. Коровякъ черный (*Verbascum nigrum* L.).

Линнея, см. Линнея сѣверная (*Linnaea borealis* L.).

Линнея сѣверная (*Linnaea borealis* L.). Линнея, Брюшница (Вят.), Бѣшеная трава (Влад.), Волосовая (Вят.), Волосяникъ (Вят.), Золотничная трава (Олон.), Лѣсная поползиха (Яросл.), Призорная трава (Костр., Олон.), Лѣсной чай (Перм.), Клюква (Влад., Ниж.), Толокнянка. Сѣверная линнея представляет низенькій вѣчно зеленый кустарникъ изъ семейства «жимолостныхъ» (*Caprifoliaceae* Juss.), распространенный въ сѣверной Европѣ, въ горахъ средней Европы, въ сѣверной и средней Россіи и въ Сибири, со стелющимися стеблями и кругловатыми черешковыми листьями. Цвѣточные стебли сѣверной линнеи несутъ обыкновенно по два цвѣтка на длинныхъ, прямостоячихъ, железисто-пушистыхъ ножкахъ. Чашечка о пяти ланцетныхъ опадающихъ зубахъ; вѣнчикъ колокольчатый, бѣлый или розовый, внутри съ темно-красными жилками, 5-тилонастный, съ болѣе широкою нижней лопастью; тычинокъ 4, прикрепленныхъ у основанія вѣнчика, изъ нихъ 2 длиннѣе. Столбикъ согнутый; завязь 3-хлѣздная, съ 2-мя пустыми и 1 плодунимъ хлѣздами. Плодъ — сухая односѣмянная ягода. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта. Растетъ обыкновенно на горахъ и мшистыхъ лѣсахъ. Свое названіе это растение получило въ честь шведскаго ботаника Карла Линнея. (Рис. 156.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Линнея сѣверная употребляется только въ народной медицинѣ. Цвѣтущая трава линнеи (3 драхмы—12,0 грм. травы) заливается стаканомъ кипятка или кипящимъ молокомъ, настаивается, процеживается и принимается отъ ломоты въ поясницѣ, боляхъ въ суставахъ, отъ задержки мочи. Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ отваръ пьютъ отъ поноса. Изъ свѣжей травы кладутъ припарки на болящіе опухоли. Многие пьютъ траву вмѣсто чая.

Липа, см. Липа мелколистная (*Tilia parvifolia* Ehrh.).

Липа, см. Липа крупнолистная (*Tilia grandifolia* Ehrh.).

Липа крупнолистная (*Tilia grandifolia* Ehrh.). Описаніе этой липы см. ниже: липа мелколистная; она отличается отъ послѣдней мохнатыми почками, листьями болѣе крупными, съ обѣихъ сторонъ зелеными, снизу коротко-волосистыми. Соцвѣтіе у нея всего съ 2—3 цвѣтками. Произрастаетъ почти во всей Европѣ и въ Россіи: на Кавказѣ, Волынѣ и Украинѣ. Липа, вообще, одно изъ самыхъ большихъ европейскихъ деревьевъ и достигаетъ весьма преклоннаго возраста—до 800 лѣтъ и болѣе. Душистые цвѣты богаты медомъ и охотно посѣщаются пчелами (липовый медъ считается наилучшимъ). Мягкая бѣловатая древесина представляетъ хорошій матеріалъ для столярныхъ и токарныхъ работъ. Въ Германіи древесина называется святымъ деревомъ,

такъ какъ на ней вышутся иконы; изъ дуба готовятъ мочала, рогожи и циновки; уголь служитъ для рисованія и для производства пороха. (Табл. XXVI, фиг. 142.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Цвѣты липы употребляютъ, какъ потогонное средство. Липовый цвѣтъ содержитъ эфирное масло, которое и составляетъ главное дѣйствующее вещество. Чай изъ липового цвѣта дѣйствуетъ подобно бузины; чашка теплаго липового чая вызываетъ потъ. Для приготовленія чая берется отъ 1 драхмы до $\frac{1}{2}$ унціи (4,0—15 грм.) липового цвѣта, который заливается стаканомъ кипятка и настаивается минутъ 15—20. Липовый цвѣтъ вполне безвредное средство, его даютъ въ тѣхъ случаяхъ, когда температура повышена и надо вызвать потъ, напримѣръ, при тифлѣ, при сопровождаемой кашлемъ, также при ревматическихъ боляхъ.

Въ аптекахъ продается: 1) перегнанная вода липовыхъ цвѣтовъ, она приятно пахнетъ и дается дѣтямъ при судорогахъ, отъ 3-хъ до 6-ти драхмъ въ день (12,0—24,0 грм.), 2) угольный порошокъ.

Угольный порошокъ, добываемый при сжиганіи липы, отличается своею мягкостью и большою способностью дѣйствовать противогнилостно. Онъ идетъ на приготовленіе зубного порошка, который предохраняетъ зубы отъ гніенія и устраняетъ непріятный запахъ изъ рта. Еще въ древности люди употребляли для сохраненія мяса уголь, вмѣстѣ соли, въ настоящее время при помощи угля очищаютъ загнивающую воду. Врачи даютъ угольный порошокъ внутрь людямъ, которые жалуются на непріятную отрыжку, сопровождаемую запахомъ, при чувствѣ вздутія кишекъ газми, также при цынги. На пріемъ берутъ чайную ложку порошка, размѣшиваютъ въ $\frac{1}{2}$ стаканѣ воды и выпиваютъ заразъ: въ день такіе пріемы повторяютъ два—три раза. Изъ порошка угля готовятъ настилки, которыя принимаются также 2—3 раза въ день послѣ ѣды. На пріемъ идетъ двѣ—три настилки. Уголь кромѣ того, дается внутрь, какъ хорошее противоядіе при отравленіи мышьякомъ.

Въ гомеопатіи древесный липовый уголь употребляется, главнымъ образомъ, какъ противогнилостное средство; кромѣ того, онъ назначается отъ болѣзней глазъ, отъ носовыхъ кровотеченій, воспаления легкихъ, отъ холеры, желтухи, крапивной лихорадки, отъ перемежающейся лихорадки и отъ отравленія ртутью.

Липа мелколистная (*Tilia parvifolia* Ehrh.). Липа, Дутошка (Перм.), Лубнякъ (Вят.), Мочальникъ (Вят.). Мелколистная липа есть дерево, выш. 14—21 вершк., изъ семейства «липовыхъ» (*Tiliaceae* Juss.), произрастающее почти во всей Европѣ, за исключеніемъ самыхъ сѣверныхъ окраинъ, и въ большей части Россіи. Листья очередные, округло-сердцевидные, неравнобокие, съ обѣихъ сторонъ голые, снизу сизо-зеленые и въ углахъ жилочекъ съ пучками волосковъ. Бѣловатые душистые цвѣтки въ щитковидныхъ полузонтикахъ, снабженныхъ проросшимъ къ оси соцвѣтія прицвѣтникомъ. Чашечка 5-тилистная, отпадающая; лепестковъ 5, тычинокъ много, съ 2-хвѣздными пыльниками,

раскрывающимися продольными щелями; завязь 5-тигнѣзная съ простымъ столбикомъ и 5-тизубчатымъ рыльцемъ. Плодь—яйцевидно-шаровидные, пушисто-войлочные орѣшки, съ довольно тонкимъ и крутымъ околоплодникомъ и 4—5 неясными гранями. Цвѣтетъ въ концѣ іюня и въ іюль.

Липина, см. Верескъ обыкновенный (*Calluna vulgaris* Salisb.).

Липиха, см. Колокольчикъ крапиволистный (*Campanula Trachelium* L.).

Липица, см. Верескъ обыкновенный (*Calluna vulgaris* Salisb.).

Липица красная, см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).

Липка, см. Грудничникъ (*Abutilon Avicennae* Gaertn.).

Липка, см. Липучка репейчатая (*Echinospermum Lappula* Lehm.).

Липка, см. Земляные орѣшки (*Spiraea filipendula* L.).

Липкая трава, см. Подмаренникъ цѣпкій (*Galium Aparine* L.).

Липкая трава, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).

Липки, см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).

Липникъ, см. Зеленчукъ желтый (*Galeobdolon luteum* Sm.).

Липникъ, см. Репяшокъ обыкновен. (*Agrimonia Eupatorium* L.).

Липнякъ, см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).

Липнякъ, см. Иванъ да Марья (*Melampyrum nemorosum* L.).

Липокъ, см. Острица цыпкая (*Asperula Aparine* Bleb.).

Липочка, см. Грудничникъ (*Abutilon Avicennae* Gärtn.).

Липочки, см. Травянка лекарственная (*Dianthus deltoides* L.).

Липухъ, см. Липушникъ большой (*Lappa major* Gärtn.).

Липучка, см. Репяшокъ обыкновен. (*Agrimonia Eupatorium* L.).

Липучка, см. Липучка репейчатая (*Echinospermum Lappula* Lehm.).

Липучка, см. Щетинникъ зеленый (*Setaria viridis* Beauv.).

Липучка репейчатая (*Echinospermum Lappula* Lehm.). Фармацевтическое названіе репейчатой липучки: *Cynoglossum minus*.) Дерябка, Кужучки, Кожушки (Малор.), Конечникъ (Пенз.), Липка (Малор.), Липучка (Вор.), Любимъ (Уфим.), Незабудка (Сарат.), Привяжуха (Курск.), Репей. Репешки (Екат.), Репяшокъ (Укр.), Рипъ-яшокъ (Малор.), Собачка, Собачки (Укр.), Липушникъ, Куриная слѣпота (Курск.), Турица (Малор.), Турица (Екат.). Репейчатая липучка есть однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «бурачниковыхъ» (*Boraginaceae* Juss.), распространенное въ средней Европѣ и почти во всей Россіи. Стебель вѣтвистый, жестковолосый, отъ 6—10 верш. Ланцетные листья покрыты прижатыми волосками. Цвѣты мелкіе, голубые. Чашечка 5-тираздѣльная, вѣнчикъ колосовидный, съ 5-тираздѣльными отгибомъ; тычинокъ 5; завязь верхняя, 4-хгнѣзная, 4-хлопастная; столбикъ съ 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Плодь распадается на 2 орѣшка, усаженныхъ вдоль боковыхъ реберъ 2-мя рядами крючковатыхъ шиповъ. Растетъ на каменистыхъ сорныхъ мѣстахъ, около дорогъ и на паровыхъ поляхъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Въ медицинѣ совсѣмъ не употребляется. (Рис. 157.)

Липушникъ, см. Липучка репейчатая (*Echinospermum Lappula* Lehm.).

- Липушникъ**, см. Подмаренникъ цѣлкій (*Galium Aparine* L.).
- Липчица**, см. Острица лещачая (*Asperugo pro umbens* L.).
- Липчица**, см. Лишучка репейчатая (*Echinospermum Lappula* Lahm.).
- Липчица**, см. Подмаренникъ цѣлкій (*Galium Aparine* L.).
- Липчица**, см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).
- Лисъ**, см. Хохлатка плотная (*Corydalis solda* Smith.).
- Лисица(я)**, см. Качимъ стѣнной (*Gypsophila muralis* L.).
- Лисичка** (*Cantharellus cibarius* Fr.). Лисички, Лисочка желтая, Опенокъ, Сплоень. Лисичка представляетъ изъ себя небольшой грибъ изъ семейства «шляпныхъ» грибовъ, или «гименомицетовъ» (*Hymenomycetes*), съ шляпкой неправильной формы, съ пенькомъ, желтый. Пластинки волнообразно-вѣтвистыя, нѣбѣгающія (т. е., спускающіяся по пеньку); «спороносный слой» (т. е., слой базидіевъ *) со спорами находится по обѣимъ сторонамъ пластинокъ. Встрѣчается группами въ хвойныхъ и березовыхъ лѣсахъ. Употребляется въ пищу. (Таб. XXVI, фиг. 143.)
- Лисички**, см. Лисичка (*Cantharellus cibarius* Fr.).
- Лисій хвостъ**, см. Лисохвостъ полевой (*Alopecurus pratensis* L.).
- Лисій хвостъ**, см. Амарантъ (*Amarantus caudatus* L.).
- Лиска**, см. Орѣхъ лѣсной (*Corylus Avellana* L.).
- Лисове зилье**, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq.).
- Лисохвостъ колѣнчатый** (*Alopecurus geniculatus* L.). Аржанецъ (Вор.), Арженникъ, Орижанецъ, Ржанникъ, Поплавникъ (Волын.), Ростиль (Ряз.), Муровой султанчикъ, Батланчикъ колѣнчатый. однолѣтнее растение изъ семейства «злаковъ» (*Gramineae* Juss.), распространенное почти повсемѣстно, развѣтвленное, съ колѣнчато-приподнимающимися стеблями: листья и ихъ влагалища голубоватыя: язычекъ листа длинный, тупой; цвѣточки собраны въ колоски, которые образуютъ соцвѣтія; въ каждомъ соцвѣтіи по одному или по два колоска. Кроющія чешуи (т. е., два прицвѣтника, которыми снабженъ каждый колосокъ) срослись только при основаніи, туповатыя, съ немногo расходящимися верхушками, длинно-рѣсничатыя; цвѣточная чешуя (т. е., два прицвѣтника, которыми снабженъ каждый изъ цвѣточковъ) имѣетъ остъ, выходящую выше основанія ея спинки и вдвое превышающую колосокъ. Тычинокъ 3; нити ихъ тонкія; пыльники двугнѣздные, ввидѣ буквы X, повиселые. Пестикъ простой, содержащій обыкновенно 1 сѣмянку; столбики сросшіеся при основаніи, съ длинными перисто-нитевидными рыльцами, выступающими изъ верхушки колосковъ; пыльники сперва желтые, потомъ буроватыя. Соцвѣтіе все сѣроватое. Растетъ на влажныхъ мѣстахъ, болотахъ, канавахъ, на лугахъ. Цвѣтетъ въ юнѣ и юлѣ. Довольно хорошая луговая трава, полезная для скота.
- Лисохвостъ луговой** (*Alopecurus pratensis* L.). Батланчикъ

*) Т. е., утолщенные концы особыхъ длинныхъ нитей, образующихъ ткань гриба и называемыхъ гифами.

(Мор.), Батлачикъ (Херс.), Дивій боръ, Глашникъ (Сл. Церк.), Колосокъ (Яросл.), Пыръ, Пырей (Арх.), Пырей луговой (Вор.), Перей (Полт.), Лисій хвостъ (въ Кат. пер.). Луговой лисохвость есть травянистое многолѣтнее растеніе изъ семейства «злаковъ» (Gramineae Juss.), съ короткими подземными побѣгами; стебель изъ приподнимающагося основанія прямой; листья и влагалища ихъ нѣсколько голубоватыя; язычекъ листа довольно короткій, тупой; соцвѣтіе цилиндрическое; вѣточки его съ 4—10 колосками; кроющія чешуи (два прицвѣтника, которыми снабженъ каждый изъ колосковъ соцвѣтія) почти до середины сросшіяся, снабженныя тремя жилками, у верхушки прямая, на спинкѣ длинно-мохнато-рѣсничатая; цвѣточная чешуя (два прицвѣтника, которыми снабженъ каждый изъ цвѣточковъ) съ 5-ю жилками и съ остію, выходящей близъ ея основанія и вдвое превышающей колосокъ; колоски по отцвѣтаніи блѣдныя, бѣловатыя или пепельно-черныя. Тычинокъ три, съ двугнздыми пыльниками ввидѣ буквы X; повислыми; столбики—сросшіяся при основаніи, съ длинными перисто-нитевидными рыльцами, выступающими изъ верхушки колосковъ; зерно продолговатое, сжатое, отваливающееся вмѣстѣ съ цѣльнымъ колоскомъ. Цвѣтетъ въ маѣ и юнѣ, нерѣдко опять въ августѣ и сентябрѣ. Очень обыкновенное и повсемѣстно распространенное растеніе. Отъ схожей съ нимъ Тимофеевой травы легко отличается по ости, выходящей изъ спинки цвѣтковой чешуи. Сѣмена созреваютъ въ юлѣ, августѣ и сентябрѣ. (Таб. XXVI, фиг. 144.)

Многочисленные опыты доказали, что лисохвость луговой—одна изъ лучшихъ кормовыхъ травъ по своей питательности. Солома и листья его мягки, сочны, сладки. Поспѣваетъ онъ ранѣе другихъ травъ; послѣ покоса опять скоро поднимается, такъ что въ хорошемъ климатѣ можетъ доставить до трехъ покосовъ въ лѣто. Черезъ его употребленіе можно значительно сберегать овесъ. Гусеница нпвяной фалены (*Phalena graminis*) нападаетъ на это растеніе только въ рѣдкихъ случаяхъ, тогда какъ охотно истребляетъ прочія луговые травы. Ввиду всего вышесказаннаго, луговой лисохвость очень выгоденъ для за-сѣванія искусственныхъ луговъ. Его можно сѣять заблаговременно осенью и весной. На десятину требуется около пуда сѣмянъ.

Лисохвость оранжевый (*Alopecurus fulvus* Sm.). Болотникъ мелкій (Ниж.), Горланка (Волог.), Осока (Тул.). Батланчикъ оранжевый. Это—однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «злаковъ» (Gramineae Juss.), сходное совершенно съ лисохвостомъ колѣнчатымъ (см. лисохвость колѣнчатый, *Alopecurus geniculatus* L.), отличается отъ вышеназваннаго цвѣтомъ влагалища, которое съ голубымъ налетомъ, кроющими чешуями (два прицвѣтника, которыми снабженъ каждый колосокъ) не расходящимися: ость цвѣточной чешуи (двухъ прицвѣтниковъ, которыми снабженъ каждый цвѣточекъ) выходитъ изъ середины или немного выше середины цвѣточной чешуи и почти не вы-

дается изъ кроющихъ чешуй. Пыльники оранжевые. Растеніе распространено почти по всей Россіи. Растетъ на болотахъ, влажныхъ мѣстахъ и канавахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Представляетъ изъ себя довольно хорошую кормовую траву.

Лисочка желтая, см. Лисичка (*Cantharellus cibarius* Fr.).

Листъ александрійскій, см. Александрійскій листъ (*Cassia lenitina* Bisch.).

Листъ дикій, см. Медуница (*Spiraea ulmaria* L.).

Листъ заячій, см. Синеголовникъ плосколистный (*Eryngium planum* L.).

Листъ львовый, см. Мыльнянка восточная (*Leontice Leontopetalum* L.).

Листъ мачихинъ, см. Мята полевая (*Mentha arvensis* L.).

Листъ пчелиный, см. Кадило пахучее (*Melittis melissophyllum* L.).

Листъ пчельный, см. Мелисса лекарств. (*Melissa officinalis* L.).

Листъ семиратскій, см. Мелкошестникъ ѣдкій (*Erigeron acris* L.).

Листъ серебряный, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.).

Листъ червонный, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).

Лиственка, см. Лиственница сибирская (*Larix sibirica* Lebed.).

Лиственница, см. Лиственница сибирская (*Larix sibirica* Lebed.).

Лиственница, см. Лиственница европейская (*Larix europaea* Dc.).

Лиственница европейская (*Larix europaea* Dc.). Лиственница,

Пегла (Волог.). Европейская лиственница представляетъ изъ себя высокое, отъ 15 саж. и выше, дерево съ пирамидальнымъ шатромъ, изъ семейства «хвойныхъ» (*Coniferae* Juss.) и подсемейства «елевыхъ» (*Abietineae* Rich.), распространенное въ средней Европѣ и въ Россіи, въ Привислянскомъ краѣ и Прибалтійскихъ губерніяхъ. Вѣтви его расположены неправильно. Кора сначала желтовато-буроватая, затѣмъ сѣрая. Хвои мягкія, свѣтло-зеленыя, на зиму опадающія: на удлиненныхъ побѣгахъ онѣ сидятъ по-одиночкѣ, а на укороченныхъ—пучками, по 10—12 въ каждомъ пучкѣ. Цвѣты однодомные. Мужскіе цвѣты одиночные, почти шаровидные, сидячіе, желтоватыя. Женскія соцвѣтія, большею частью, пурпуровыя. Шишки маленькія, овальныя, примостяныя, не рассыпающіяся, съ выступающими кончиками прицвѣтничковъ; чешуи ясно-полосатыя, голыя. Цвѣтетъ осенью. Сѣмена крылатыя, созрѣвающія въ одинъ годъ. Лиственница доставляетъ хорошее топливо и цѣнится, какъ отличный строительный матеріалъ, пригодный и для подводныхъ построекъ. Кора молодыхъ вѣтвей содержитъ много дубильнаго вещества и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на Альпійскихъ горахъ употребляется для дубленія кожъ. Смола, выделяемая древесиной, собирается въ видѣ прозрачной и почти безцвѣтной жидкости и поступаетъ въ продажу, гдѣ пзвѣстна подъ именемъ «венеціанскаго терпентина»; запахъ ея довольно прият-

ный, вкусъ горькій и острый. Вогуличи и другіе сибирскіе народы, живущіе близъ лѣсовъ, жуютъ ее почти безпрестанно въ большомъ количествѣ, какъ питательное и противоцинготное средство. По свидѣтельству ихъ, она утоляетъ жажду и очищаетъ зубы. (Р и с. 158.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Получаемый изъ лиственницъ терпентинъ по чистотѣ предпочитается всѣмъ другимъ бальзамамъ; запахъ его скипидарный, вкусъ острый и менѣе противный, чѣмъ вкусъ простого соснового терпентина. Терпентинъ, или скипидарное масло, имѣетъ обширное примѣненіе въ медицинѣ, какъ для внутренняго употребленія, такъ и для наружнаго.

Терпентинъ дается: отъ глистовъ, главнымъ образомъ, отъ ленточной глисты, отъ камней въ желудкѣ и мочевомъ пузырьѣ, отъ застарѣлыхъ гнойныхъ отдѣленій изъ мочевыхъ путей, отъ хроническаго катарра бронхъ, сопровождающагося усиленнымъ отдѣленіемъ гнойной мокроты; далѣе терпентинъ принимается внутрь, какъ противовоспалительное средство, уменьшающее чувство вздутія въ животѣ и боли отъ скопленія газовъ. Терпентинъ успокоиваетъ общее нервное разстройство и боли въ спинѣ у людей, страдающихъ подвижною почкою.

Принятый внутрь терпентинъ вызываетъ чувство теплоты въ желудкѣ и отрыжку, которая первое время, пока не образуется привычка къ средству, довольно неприятна. На пріемъ берутъ отъ 3-хъ до 5-ти капель терпентина и повторяютъ такіе пріемы 3 раза въ день, стараясь брать ихъ не сразу на пищу, а часа черезъ 2 или 3. Всего лучше принимать терпентинъ въ рюмкѣ молока и молокомъ-же запивать; въ особенности такой способъ пріема рекомендуется врачами при болѣзни легкихъ. Отъ глистовъ и болей въ животѣ терпентинъ смѣшиваютъ съ гофманскими каплями: на 1/2 унца (15,0 грм.) гофманскихъ капель берется 1/2 драхмы (2,0 грм.) терпентина; такую смѣсь принимаютъ аккуратно черезъ 4 часа по 15-ти—20 ти капель. Для того, чтобы избавиться отъ неприятнаго вкуса и запаха въ этомъ растворѣ, очень удобно брать терпентинъ въ эластическихъ капсуляхъ, которыя продаются въ аптекахъ. На пріемъ берется отъ 10-ти до 15-ти капель смѣси 3 раза въ день.

Терпентинъ примѣняется также и снаружи. Чайная ложка терпентина, смѣшанная съ двумя желтками и разведенная въ двухъ стаканахъ воды, служитъ отличнымъ средствомъ для клистира въ тѣхъ случаяхъ, когда больной жалуется на чувство вздутія живота и простой водяной клистиръ не дѣйствуетъ. Кромѣ того, терпентинъ входитъ въ составъ различныхъ мазей.

Его смѣшиваютъ съ свинымъ саломъ, съ камфорною мазью и съ прованскимъ масломъ. На унцѣ (30 грм.) масла берутъ одну или двѣ драхмы терпентиннаго масла (4,0—8,0 грм.). Отъ соединенія съ нашатыремъ образуется такъ наз. летучая мазь. Всѣ мази съ терпентиннымъ масломъ служатъ отвлекающимъ средствомъ, вызываютъ легкую красноту и чувство теплоты въ кожѣ; онѣ употребляются для втираній, главнымъ образомъ, отъ ломоты въ су-

ставахъ и отъ мышечныхъ болей, отъ колющихъ болей въ груди и отъ кашля.

Молодые зеленые отростки лиственницы варятъ весною съ молокомъ или сывороткою и употребляютъ, какъ слабительное средство. Изъ коры дерева весною выступаетъ смолистый сокъ, который сгущается подъ вліяніемъ солнечныхъ лучей и превращается въ бѣловатая зерна, имѣющія слабительное дѣйствіе.

Въ ветеринарной практикѣ терпентиномъ лечатъ у животныхъ, въ особенности у лошадей, червивыя язвы.

Лиственница сибирская (*Larix sibirica* Lebed.). Лиственница, Листвякъ, Лиственъ, Лиственка, Карагай (Вят.). Хвои сибирской лиственницы значительно длиннѣе и расположены гораздо гуще, чѣмъ у предыдущаго вида, см. лиственница европейская (*Larix europaea* De). Женскія соцветія обыкновенно свѣтло-зеленыя, и кончики прицвѣтниковъ въ зрѣлой инникѣ скрыты подъ неясно-полосатыми, пушистыми чешуями. Произростае въ сѣверо-восточной Россіи и въ Сибири.

Лиственъ } см. Лиственница сибирская (*Larix sibirica*
Листвякъ } Lebed.).

Лиственъ, см. Вороній глазъ (*Paris quadrifolia* L.).

Листича, см. Купальница европейская (*Trollius europaeus* L.).

Листики малиновые, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).

Листоватая трава, см. Медуница (*Spiraea ulmaria* L.).

Листовникъ, см. Василекъ перистый (*Centaurea scabiosa* L.).

Листовникъ, см. Земляника (*Fragaria vesca* L.).

Листопадная, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).

Листопаръ, см. Подмаренникъ сѣверный (*Gallium boreale* L.).

Листуха, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).

Листья опухольные, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).

Лисякъ, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).

Литпа, см. Колдунъ-трава (*Circaea lutetiana* L.).

Лиферія желтая, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq.).

Лиходѣй, см. Соколій перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).

Лиходѣйка, см. Чернокорень обыкновенный (*Cynoglossum officinale* L.).

Лихоманникъ, см. Соколій перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).

Лихорадочникъ, см. Авранъ лекарственный (*Gratiola officinalis* L.).

Лихорадочникъ, см. Вахта трилистная (*Menyanthes trifoliata* L.).

Лихорадочная трава, см. Валериана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Лихорадочная трава, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Лихорадочная трава, см. Дубровникъ (*Teucrium Chamadrys* L.).

Лихорадочная трава, см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).

Лихорадочная трава, см. Лютикъ ядовитый (*Ranunculus sceleratus* L.).

Лихорадочная трава, см. Кукушкины слезы (*Orchis maculata* L.).

Лихорадочная трава, см. Вшивица болотная (*Pedicularis comosa* L.).

Лихорадочная трава, см. Незабудка болотная (*Myosotis palustris* With.).

Лихорадочная трава, см. Клоповникъ (*Lepidium ruderafe* L.).

Лихорадочная трава, см. Ястребинка волосистая (*Hieracium pilosella* L.).

Лихорадочная трава, см. Авранъ лекарственный (*Gratiola officinalis* L.).

Лихорадочная трава, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Лихорадочная трава, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematidis* L.).

Лихорадочная трава, см. Живучка ползучая (*Ajuga reptans* L.).

Лихорадочное зелье, см. Авранъ лекарственный (*Gratiola officinalis* L.).

Лихорадочный корень, см. Запникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa* L.).

Лихорадочный корень, см. Валериана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Лица

Лиціанъ } см. Жасминъ полевой (*Lycium Barbarum* L.).

Лицій

Лишай, см. Лишай бородастый (*Usnea barbata* Fries).

Лишай бородастый (*Usnea barbata* Fries). Чихрица, Борода лесова. Лишай, распространенный въ еловыхъ лѣсахъ и произрастающій на сучьяхъ деревьевъ. Ростецъ его имѣетъ видъ длинныхъ развѣтвленныхъ сѣровато-бѣлыхъ нитей. Апотеции (т. е., блюдцевидныя вмѣстилища сумокъ со спорами) довольно крупныя, ввидѣ щитковъ, по краямъ рѣсничатыя.

Лишай коробочный, см. Очитокъ бобовый (*Sedum Fabaria* Koch).

Лишай лакмусовый шведскій (*Lecandra tatarica* Ach.). Лишай родомъ изъ Швеціи, откуда его вывозятъ въ громадномъ количествѣ, отчего онъ еще называется шведскимъ мхомъ. Этотъ лишай употребляется на приготовленіе лакмуса, изъ котораго выдѣлывается красное красильное вещество — красное индиго.

Лишай письменный (*Graphis scripta* Ach.). Весьма распространенный лишайникъ, гнѣздящійся обыкновенно на корѣ деревьевъ, которой придаетъ бѣлый или сѣроватый видъ. Апотеции (блюдцевидныя вмѣстилища сумокъ со спорами) узкія, вѣтвистыя, похожія на трещинки коры и имѣющія видъ какихъ-то письменъ.

Лишай собачій, см. Пельтигера (*Peltigera venosa* L.).

Лишайникъ, см. Колокольчикъ жестковолосый (*Campanula Cervicaria* L.).

Лишки, см. Клеверъ бѣлый ползучій (*Trifolium repens* L.).

Лищина } см. Орѣхъ лѣсной (*Corylus Avellana* L.).
Лищина }

Лобазка, см. Медуница (*Spiraea ulmaria* L.).

Лобазникъ, см. Вербейникъ обыкновенн. (*Lysimachia vulgaris* L.).

Лобазникъ, см. Медуница (*Spiraea ulmaria* L.).

Лобастъ } см. Медуница (*Spiraea ulmaria* L.).
Лобасникъ }

Лобдуда, см. Лебеда садовая (*Atriplex hortensis* L.).

Лобелія водяная (*Lobelia Dortmanna* L.). Многолѣтняя трава изъ семейства «колокольчиковыхъ» (*Campanulaceae* Juss.), распространенная въ сѣв. Европѣ и изрѣдка встрѣчающаяся въ сѣв. и зап. губ. Россіи. Прямостоящій, простой, болѣею частью безлиственный, цвѣточный стебель выступаетъ на 7—11 вершковъ надъ поверхностью воды. Листья прикорневые, расположенные розеткой, линейные, почти цилиндрическіе, внутри полые и раздѣленные продольною перегородкою. Пониклые цвѣты собраны верхушечною кистью; чашечка глубоко-пятираздѣльная; вѣнчикъ неправильный, бѣлаго цвѣта, съ голубоватою трубкой, 5-тилопастный; тычинокъ 5, съ спаянными пыльниками; завязь 5-тигнѣздная, съ однимъ столбикомъ, оканчивающимся двухраздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ—коробочка. Цвѣтетъ въ іюлѣ и въ августѣ. Растетъ на днѣ озеръ и прудовъ. Красиво-цвѣтущіе тропическіе виды лобеліи очень часто служатъ для украшенія цвѣтниковъ. (Рис. 159.)

Лобідка, см. Лебеда садовая (*Atriplex hortensis* L.).

Лобода дика, см. Марь обыкновенн. (*Chenopodium album* Moqu.).

Лобода жовта, см. Лебеда садовая (*Atriplex hortensis* L.).

Лобода собача, см. Марь обыкновенная (*Chenopodium album* Moqu.).

Лобода черзона, см. Лебеда садовая (*Atriplex hortensis* L.).

Лобоза, см. Борець желтый (*Aconitum lycoctonum* L.).

Логонецъ, см. Ястребника зонтичная (*Hieracium umbellatum* L.).

Лодышникъ, см. Окопникъ лекарственный (*Symphytum officinale* L.).

Лоекъ, см. Живучка мохнатая (*Ajuga genevensis* L.).

Лоекъ, см. Живучка ползучая (*Ajuga reptans* L.).

Ложечная трава (*Cochlearia officinalis* L.). Варуха, Отваръ, Ложечникъ, Ложечный хрѣнъ, Морской салатъ, Цитотная трава. Сочная двухлѣтняя травка, вып. отъ 3½—7 вершковъ, изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), распространенная на морскихъ берегахъ въ сѣверной и западной Европѣ и около соленыхъ источниковъ внутри страны; въ Россіи произрастаетъ по берегамъ Ледовитаго океана и Балтійскаго моря. Нижніе листья черешковые, широко-овальные, при основаніи сердцевидные, средніе—сидячіе, яйцевидные, зубчатые, верхніе—стеблеобъемлющіе. Чашечка 4-хлестная; вѣнчикъ 4-хлестный, тычинокъ 6; плодъ—округленный стручечекъ, раздѣленный на 2 гнѣзда, створки его съ выдающеюся срединною жилкою. Цвѣтетъ съ мая по августъ, созрѣваетъ съ іюля по сентябрь.

Для врачебнаго употребленія собираютъ въ апрѣлѣ и маѣ или корневые листья съ черешками, или цѣлыя растенія для выжиманія сока и приготовленія варенья, или, наконецъ, цвѣтущія вершины для перегонки черезъ нихъ воды и спирта.

Свѣжіе листья травы въ растертомъ видѣ издаютъ довольно спланный ѣдкій запахъ; вкусъ ихъ острый, такъ какъ содержатъ въ себѣ летучее масло. Въ нѣкоторыхъ странахъ траву употребляютъ ввидѣ салата; въ Исландіи готовятъ изъ нея разныя кушанья и даже запасаютъ разными способами въ уксусъ и другихъ приправахъ впрокъ для употребленія въ зимнее время. Главнымъ-же образомъ, ложечная трава служитъ для медицинскихъ цѣлей.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Ложечная трава въ настоящее время врачами не назначается и извѣстна только въ народной медицинѣ.

Свѣжее цвѣтущее растеніе при разламываніи даетъ острый запахъ, имѣетъ вкусъ, зависящій отъ содержащагося въ немъ эфирнаго масла.

Свѣжевыжатый сокъ или свѣжеприготовленный салатъ изъ ложечной травы служатъ отличнымъ средствомъ отъ цынготныхъ десентъ; его также употребляютъ при вяломъ пищевареніи съ обильнымъ отдѣленіемъ слизи и отъ нѣкоторыхъ сыпныхъ болѣзней. Въ сѣверныхъ странахъ листья собираются, солятся и сохраняются въ бочкахъ на зиму. Они служатъ пищею для матросовъ на корабляхъ, какъ средство, предупреждающее цынготную порчу десентъ.

Въ аптекахъ продается ложечный спиртъ. Онъ употребляется съ успѣхомъ для полосканія рта отъ цынги, зубной боли и дурныхъ зубовъ.

Въ народѣ употребляется сокъ, выжатый изъ свѣжей травы, или отваръ травы въ сывороткѣ и свѣжее сѣмя.

Сокомъ ложечной травы, смѣшаннымъ пополамъ съ водкою или водою, полощатъ ротъ отъ цынготныхъ десентъ, а также его прикладываютъ на кровоподтеки, находящіеся на ногахъ у цынготныхъ больныхъ. Для приготовленія отвара горсть травы заливаютъ стаканомъ кипящей сыворотки, выжимаютъ ее, процеживаютъ и пьютъ по чайной чашкѣ 2—3 раза въ день. Такой отваръ считается очень полезнымъ противъ цынги. Также цынготные больные ѣдятъ ежедневно свѣжую траву вмѣсто салата или толкутъ траву, смѣшиваютъ ее съ медомъ и ѣдятъ ввидѣ кашки; для этого берется 1 унція (30.0 грм.) травы и сѣдается за сутки въ 2—3 приема. Свѣже-выжатый сокъ тоже принимаютъ внутрь—на приемъ по 1—2 столовыхъ ложки два—три въ день. Свѣжее толченое сѣмя ложечной травы въ количествѣ 1 драхмы (4.0 грм.) смѣшивается съ медомъ и дается, какъ мочегонное средство.

Въ ветеринарной медицинѣ ложечная трава употребляется при тѣхъ-же заболѣваніяхъ, при которыхъ употребляется и хрѣнь.

Ложечникъ, см. Ложечная трава (*Cochlearia officinalis* L.).

Лоза, см. Ива ушастая (*Salix aurita* L.).

Лоза, см. Ива козья (*Salix capraea* L.).

Лоза, см. Черноталь (*Salix pentandra* L.).

Лоза (*Salix viminalis* L.). Бѣлоталь, Бѣлый тальникъ, Верба (Мамт.), Верболозъ (на Терекѣ), Вербовая лоза (Бесс.), Вязинникъ, Ива, Ива модаванска (Малор.), Ива гибкая, Ива лозная, Ива плетневая, Лоза корзинна, Корзиночникъ, Кузовица (Укр.), Лозникъ (Яросл.), Лоза-вить (въ Пол.), Малокитникъ, Ракита, Ракитникъ, Таложчаникъ (Борон.), Талаженникъ. Лоза представляетъ изъ себя кустарникъ, выш. отъ 1³/₄ до 6 саж., изъ семейства «ивовыхъ» (*Salicineae* Rich.), распространенный почти по всей Европѣ и почти во всей Россіи, съ длинными, густо-облиственными, прутьевидными вѣтками. Листья длинные, ланцето-линейные, заостренные, почти дѣльнокрайніе, сверху темно-зеленые, снизу серебристо-шелковистые, блестящіе, лапустные; прилистники короче листового черешка. Цвѣтки однополые, двудомные, одиночные, въ углахъ кроющихъ припѣтничковъ, собранные колосьями, развивающимися изъ прошлогоднихъ почекъ; вмѣсто околочцѣтника 2 железки (1 передняя, 1 задняя); тычинокъ 2, желтаго цвѣта. Завязь верхняя, одногнѣздная, съ однимъ столбикомъ, раздѣляющимся на 2 нитевидныхъ рыльца, по величинѣ равныхъ столбику. Плодъ—яйцевидноконическая, бѣло-войлочная, многосѣмянная, двустворчатая коробочка. Цвѣтетъ рано весною. Растетъ на влажныхъ мѣстахъ и по берегамъ рѣкъ. Эта ива, благодаря очень гибкимъ и упругимъ вѣткамъ, чаще другихъ видовъ употребляется на плетеніе корзинъ. (Рис. 160.)

Лоза, см. Ива бѣлая (*Salix alba* L.).

Лоза, см. Ива миндальная, бѣлоталь (*Salix amygdalina* L.).

Лоза білая, см. Ива бѣлая (*Salix alba* L.).

Лоза бѣлая, см. Ива презимистая (*Salix depressa* L.).

Лоза золотуха, см. Черноталь (*Salix pentandra* L.).

Лоза корзинна, см. Лоза, ива корзиночная (*Salix viminalis* L.).

Лоза красная, см. Ива миндальная (*Salix amygdalina* L.).

Лоза красная, см. Ива козья (*Salix capraea* L.).

Лоза нищая, см. Колокольчикъ боровой (*Campanula ranunculo-ides* L.).

Лоза цареградекая, см. Лохъ (*Elaeagnus hortensis* M. A. B.).

Лозига, см. Насленъ сладко-горькій (*Solanum dulcamara* L.).

Лозина, см. Ива козья (*Salix capraea* L.).

Лозина, см. Черноталь (*Salix pentandra* L.).

Лозникъ, см. Желтолозникъ (*Salix purpurea* L.).

Лозникъ } см. Лоза, ива корзиночная (*Salix viminalis* L.).
Лозовить }

Лойникъ, см. Черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris* L.).

Ломъ каменный трава } см. Земляные орѣшки (*Spiraea filipendula* L.).
Ломъ красный }

Ломатникъ, см. Лютикъ ѣдкій (*Ranunculus acris* L.).

Ломатникъ, см. Ива миндальная, бѣлоталь (*Salix amygdalina* L.).

Ломатникъ, см. Черноталь (*Salix pentandra* L.).

Ломенецъ, см. Ломоносъ прямой (*Clematis recta* L.).

Ломенусъ, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).

Ломкамень красный, см. Земляные орѣшки (*Spiraea filipendula* L.).

Ломинисъ }
 Ломинисъ } см. Ломоносъ прямой (*Clematis recta* L.).
 Ломиносъ }

Ломинусъ, см. Ласточникъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* Moench.).

Ломонисъ, см. Ломоносъ прямой (*Clematis recta* L.).

Ломоносъ, см. Ломоносъ прямой (*Clematis recta* L.).

Ломоносъ, см. Ясенецъ бѣлый (*Dictamnus Fraxinella* Pers.).

Ломоносъ, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).

Ломоносъ прямой (*Clematis recta* L.). Фармацевтическое названіе прямого ломоноса: *Clematis erecta*, s. *Flammula Jovis*. Богородичная коса (Волын.), Вородавочные волосы, Жигунецъ (Могил.), Жигучка (Тамб.), Криванникъ (Подол.), Кустерень, Ломоносъ, Ломонисъ, Ломиносъ, Ломинисъ, Ломенецъ (Балга), Любистокъ лѣсной (Полт. и Курск.), Ясенокъ (Курск. и Вор.), Девесиль, Романова трава. Ломоносъ прямой представляетъ изъ себя многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «лютиковыхъ» (*Ranunculaceae* Juss.), распространенное въ южной и средней Европѣ, въ средней и южной Россіи. Стебель высокій; листья супротивные, перистые, съ яйцевидными или ланцетными листочками, снабженными черешочками; бѣлые цвѣтки въ полузонтикахъ, собранныхъ на верхушкѣ стебля метельчатымъ соцвѣтіемъ; чашелистиковъ 4, на краю снаружи пушистыхъ; лепестковъ нѣтъ, тычинокъ много; плодъ состоитъ изъ многихъ сѣмянокъ, снабженныхъ длинными пушистыми столбиками. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ между кустарниками и въ рощахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Трава и цвѣты ломоноса прямого *) имѣютъ довольно обширное примѣненіе въ народной медицинѣ. При растираніи травы между пальцами появляется острый, кусающій глаза запахъ; свѣжая трава имѣетъ жгучій вкусъ и оставляетъ во рту пузыри; высушенная трава также имѣетъ горько-соленый вкусъ и содержитъ въ себѣ желѣзистое дубильное вещество и другое летучее жгучее начало, ближе не изслѣдованное. Въ небольшихъ пріемахъ растеніе дѣйствуетъ, какъ мочегонное и потогонное; въ большихъ пріемахъ его пьютъ отъ венерической болѣзни, отъ ночныхъ болей въ костяхъ, отъ костяныхъ опухлей, появляющихся въ поздней степени развитія сифилиса, также отъ головныхъ болей, отъ меланхоліи и отъ чесотки. Для отвара берутъ 2—3 драхмы (8,0—12,0 грам.) свѣжей травы, заливаютъ стаканомъ кипятка, даютъ 1 разъ вскипеть, процеживаютъ и пьютъ по ¼ стакана 2—3 раза въ день. Такимъ-же отваромъ обмываютъ боль-

*) Названіе ломоноса произошло отъ того, что, если скрутить листъ этого растенія и вложить въ носъ, то дѣлается носовое кровотеченіе.

ныхъ, страдающихъ чесоткою. Сушеную траву и листья ломоноса принимаютъ ввидѣ порошка: на приемъ берутъ отъ одного до 4-хъ гранъ (0,1—0,2 грм.). Для приготовления порошковъ толченые цвѣты или листья смѣшиваютъ съ двойнымъ количествомъ сахара и развѣшиваютъ такъ, чтобы на порошокъ приходилось отъ 6-ти до 10-ти гранъ. Такихъ порошковъ принимаютъ отъ 2-хъ до 3-хъ въ день. Отъ перемежающейся лихорадки сушеную траву въ такомъ-же количествѣ смѣшиваютъ съ корнемъ горечавки, для чего берутъ 4 грана (0,2 грам.) этой травы и 20 гр. (1,3 грм.) корня горечавки, 3 раза въ день. Свѣжая трава, приложенная на кожу, вызываетъ на ней пузыри, потому она употребляется, какъ отвлекающее средство, при подагрическихъ боляхъ. При головной боли траву растираютъ, дѣлаютъ припарку, которую и накладываютъ на затылокъ, при боляхъ въ суставахъ—на больные суставы.

Въ гомеопатіи изъ свѣжаго цвѣтущаго растенія дѣлаютъ спиртную вытяжку, которую даютъ отъ перемежающейся лихорадки, сильныхъ воспаленій глазъ, зубной боли, различныхъ воспалительныхъ страданій мочевого пузыря, при злокачественныхъ сыпяхъ и лишаихъ.

Ломоносъ цѣпкій (*Clematis Vitalba* L.). Фармацевтическое назв. *Clematis Vitalba s. silvestris*. Бородавникъ, Дикорадь, Жигунекъ, Жигунецъ, Жигучка, Дѣдушкины кудри, Тормашникъ, Чермалукъ. Лазящій кустарникъ, вып. часто въ нѣсколько аршинъ, цвѣляущійся за посторонние предметы черешками листьевъ; изъ семейства «лютиковыхъ» (*Ranunculaceae* Juss.), распространенный въ южной Европѣ, въ Привислянскомъ краѣ и на югѣ Россіи. Листья перистые, съ яйцевидными, при основаніи иногда сердцевидными, цѣльными или крупнопильчатыми листочками. Бѣлые цвѣты собраны метельчатымъ соцветіемъ; чашелистиковъ 4, на обѣихъ сторонахъ пушисто-войлочныхъ. Тычинокъ много. Плодъ состоитъ изъ нѣсколькихъ сѣмянокъ, несущихъ перистые длинные столбики. Цвѣтетъ съ іюля по сентябрь. Растетъ между кустарниками и въ лѣсахъ. Какъ этотъ ломоносъ, такъ и нѣкоторые другіе красиво цвѣтущіе виды этого растенія разводятся иногда въ садахъ для украшенія. Ядовитый и весьма острый сокъ ломоноса производитъ на кожѣ нарывы. (Табл. XXVI, фиг. 146.)

МЕДИЦИНСКАЯ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Медицинское народное употребленіе то-же, что и ломоноса прямого. Въ части свѣжаго растенія очень бѣдки и производятъ на кожѣ пузыри и нарывы. Внутрь отваръ свѣжей травы дается, главнымъ образомъ, отъ ревматизма и сифилиса.

Ломотная трава, см. Колокольчикъ круглолистный (*Campanula rotundifolia* L.).

Ломотная трава, см. Герань кроваво-красная (*Geranium sanguineum* L.).

Ломотная трава, см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.).

Лонокъ

Лонокъ польный } см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.)

Лопышъ, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).
 Лопай, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).
 Лопаски, см. Пулавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).
 Лопатникъ, см. Череда трехраздѣльная (*Bidens tripartita* L.).
 Лопаточникъ, см. Ярутка полевая (*Thlaspi arvense* L.).
 Лопажъ, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).
 Лопки, см. Дурманъ воюющій (*Datura Stramonium* L.).
 Лопухъ, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).
 Лопухъ, см. Лопушникъ большой (*Lappa major* Gärtn.).
 Лопухъ, см. Бѣлокопытникъ лекарств. (*Petasites officinalis* Moench.).
 Лопухъ болотный, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).
 Лопухъ водяной, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).
 Лопуха, см. Бѣлокопытникъ лекарств. (*Petasites officinalis* Moench.).
 Лопуха } см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum*
 Лопуха водяная } Smith.).
 Лопуха пригодная, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).

Лопуцентъ, см. Латука ядовитый (*Lactuca virosa* L.).
 Лопушка, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).
 Лопушки, см. Бурачокъ маленький (*Alyssum minimum* L.).
 Лопушникъ, см. Лопушникъ большой (*Lappa major* Gärtn.).
 Лопушникъ большой (*Lappa major* Gärtn. sin. *Lappa officinalis* All., *Arctium Lappa* L.) Фармацевтическое названіе корня
Radix Bardanæ s. Lappæ majoris, s. Personate.

Брили, Брилевникъ (Мор.), Дѣдки (Смол.), Дѣдовникъ, Дідовникъ (Малор.), Дзедовникъ (Могил.), Зѣдерка (Смол.), Лопухъ (повсюду въ Вел. Росс.), Собаки (Кал.), Липухъ, Линухъ (Умань), Лапуха горькая (Вор.), Лопушникъ (повсюду), Репей, Репейникъ, Репецъ, Репикъ, Рипей, Рѣнецъ, Арепьи (Орл.), Арепешникъ (Вор.), Лепельникъ (Твер.), Репьякъ, Репьяхи (Малор.), Собачникъ (Смол.), Королевина трава, Шишоборъ (Вят. и Волог.), Шишки шишучія, Конскій павій (Вол. и Подол.). Большой лопушникъ есть крупное травянистое двулѣтнее растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное почти по всей Европѣ и Россіи. Стебель вѣтвистый, выш. 1½ арш., съ очень крупными и широкими сердцевидно-яйцевидными листьями, снизу паутинисто-войлочными. Корзинки пурпуровыхъ цвѣтовъ почти шаровидныя, расположенныя щиткомъ и снабженныя обертками, листочки которыхъ зеленые, шиловидныя и на верхушкѣ загнуты крючкомъ, вслѣдствіе чего головки цвѣтовъ легко зацѣпляются и пристають къ платью. Цвѣтоложе покрыто щетинками, цвѣтки всѣ обоеполовыя, трубчатые. Тычинокъ 5, пыльники ихъ при основаніи съ шиловидными придатками; завязь нижняя, однопѣздная, односѣмянная, съ однимъ двураздѣльнымъ столбикомъ, который при основаніи рылецъ утолщенъ и снабженъ въ этомъ мѣстѣ кольцомъ волосковъ. Плодъ—сжатая съ боковъ, наверху немного морщинистая сѣмянка съ летучкой изъ короткихъ зазубренныхъ, легко отпадающихъ, щетинокъ. Растетъ между кустарниками, на сор-

ныхъ мѣстахъ и около дорогъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Запахъ лопушника сладкій, но непріятный; вкусъ травы и корня горько-слизистый, у корня нѣсколько острый. Для употребленія собираются, главнымъ образомъ, корни, которые вырываютъ или поздно осенью, или рано весною; предпочитаютъ молодые и сочные. Ихъ разрѣзываютъ вдоль на части и сушатъ на воздухе. Употребляется лопушникъ въ медицинѣ, хотя и въ хозяйственномъ отношеніи заслуживаетъ нѣкотораго вниманія. Такъ, напримѣръ, корень его даетъ крахмалъ и, подобно мыльной травѣ, можетъ употребляться для очищенія бѣлья; нѣкоторые предлагали употреблять его въ кушанье вмѣсто сладкаго корня. Домбурней предлагалъ разводить его для выжиганія поташа, котораго изъ всѣхъ частей его получается значительное количество. Шефферъ выдѣлывалъ изъ стеблей его зеленоватую бумагу. (Табл. XXVII, фиг. 148.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ лопушника обширно въ народной медицинѣ; какъ лекарственное вещество, употребляется корень лопушника большого; онъ дѣйствуетъ, какъ сильное мочегонное и потогонное средство, и замѣняетъ отчасти мѣсто сассапарели. Изъ толченаго сушенаго корня готовится отваръ, который пьютъ отъ старыхъ сыней, застарѣлаго ревматизма, отъ подагрическихъ и сифилитическихъ болей, также отъ каменной болѣзни въ почкахъ и мочевомъ пузырьѣ и приливовъ крови къ полости живота. Для наружнаго употребленія берется вода, перегнанная со свѣжимъ корнемъ. Въ ней намачиваются триночки, которыя кладутся на болящія мѣста; для этой цѣли также варятъ корень въ водѣ. Вареный корень растенія, смѣшанный съ масломъ, даетъ мазь, которою смазываютъ голову для рожденія волосъ. Для этого берутъ корень, рубятъ его мелко, наливаютъ горячей водой, прибавляютъ немного сала, замазываютъ смѣсь въ муравленомъ горшкѣ и ставятъ въ горячую печь; когда устоится, вынимаютъ и по вечерамъ жидкостью смачиваютъ волосы и голову. Изъ травы и корня, мелко изрубленныхъ, приготавливаютъ мазь отъ ожога, для чего ихъ варятъ въ водѣ вмѣстѣ съ коровинымъ масломъ.

Въ ветеринарной народной медицинѣ снаружи отваръ корня лопушника употребляется для обмыванія лошадей, при кожномъ зудѣ и выпаденіи волосъ. Отваръ корня готовится изъ одной части корня съ 12-ю частями воды или пива, корень кипятятъ, пока не выкипитъ половина всего количества. Свѣжле листья лопушника и сокъ, изъ нихъ выжатый, дѣйствуютъ одинаково и употребляются крестьянами при ожогахъ, пораненіяхъ и опухоляхъ. Пастухи даютъ овцамъ отъ кашля мелкоизрубленный корень лопушника, который они прибавляютъ къ сѣну.

Лоскутница, см. Василекъ синий (*Centaurea cyanus* L.).

Лоскутница, см. Василекъ луговой (*Centaurea jacea* L.).

Лоскутница, см. Василекъ перистый (*Centaurea Scabiosa* L.).

Лоскутный цвѣтъ, см. Василекъ синий, или посѣвной (*Centaurea cyanus* L.).

Лоскутный цвѣтъ, см. Василекъ луговой (*Centauria jacea* L.).

Лотъ, см. Ледвенецъ рогатый (*Lotus corniculatus* L.).

Лотай, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).

Лотать, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).

Лотія, см. Ледвенецъ рогатый (*Lotus corniculatus* L.).

Лотошъ } см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).

Лотошки }
Лотуеъ, см. Лотуеъ истинный (*Nymphaea Lotus* L.).

Лотуеъ истинный (*Nymphaea Lotus* L.). Водяное растение съ сердцевидно-выемчатыми листьями, съ бѣлыми цвѣтами и клубневиднымъ корневищемъ. Растетъ въ Нилѣ. У древнихъ египтянъ считалось священнымъ растеніемъ, какъ символъ Исла. Всѣ части растенія съѣдобны.

Лохъ (*Elaeagnus hortensis* M. A. B.). Иерусалимская верба, Верба цареградская. Лоза цареградская (Малор.), Серебряное дерево, Масличное дерево (Малор.), Джидя, Маслина (Екат.), Дикая маслина. Лоховина, Лоховникъ. Лохъ представляетъ изъ себя высокій кустарникъ съ серебристыми молодыми вѣтвями и листьями, изъ семейства «лоховыхъ» (*Elaeagnaceae* R. Br.), распространенный въ Турціи, зап. Азій, Кавказѣ и Китаѣ. Листья продолговато-ланцетные, туповатые; цвѣтки обоюдовые, одиночные, душистые, съ желтымъ внутри колокольчатымъ 4-х-лопастнымъ околоцвѣтникомъ. Тычинокъ 4: завязь верхняя, свободная, плотно-заключенная въ нижней части трубочки околоцвѣтника, становящейся при плодѣ мясистою. Столбикъ простой, къверху утолщенный, съ косымъ одностороннимъ рыльцемъ; плодъ костяно-образный, овальный; косточка съ 8 бороздками. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта. Разводится иногда въ садахъ и на кладбищахъ,

Лохина }
Лохины } см. Голубика (*Vaccinium uliginosum* L.).

Лоховина } см. Лохъ (*Elaeagnus hortensis* M. A. B.).

Лоховникъ }

Лочига, см. Бородавникъ обыкновенный (*Lampsana communis* L.).

Лошадинная зычная трава, см. Ягода листовая (*Ruscus Hypoglossum* L.).

Лошадинникъ, см. Щавель рѣчной (*Rumex Hydrolapathum* Huds.).

Лошакова трава, см. Ослиникъ двулѣтній (*Oenothera biennis* L.).

Ложокъ, см. Живучка ползучая (*Ajuga reptans* L.).

Лубнякъ, см. Липа мелколистная (*Tilia parvifolia* Ehrh.).

Луговикъ, см. Луговикъ дернистый (*Aira caespitosa* L.).

Луговикъ, см. Луговикъ гибкій (*Aira flexuosa* L.).

Луговикъ гибкій (*Aira flexuosa* L. sin. *Deschampsia flexuosa* Trin.). Молоточникъ изгибистый (Двиг.). Гибкій луговикъ есть многолѣтняя трава, выш. 7—11 верш., изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенная по всей Европѣ, въ средней и южной Россіи. Отличается отъ луговика дернистаго,

Aira caespitosa L. (см. описаніе ниже), щетинообразными листьями и колѣнчатыми остями, значительно выдающимися надъ пленками. Метелка овальная, поникшая, съ тонкими извилистыми вѣтвями. Растетъ на сухихъ лугахъ и въ лѣсахъ. Цвѣтеть лѣтомъ.

Луговикъ дернистый, Щучка (*Aira caespitosa* L. *syn* Deschampsia caespitosa P. B.). Дернистый луговикъ имѣетъ слѣдующія названія: Луговикъ, Молоточникъ, Мурогъ (Могил.), Полевая осочка (Яр.), Щука, Щучка, Литла, Метлица, Метла пыренстая (Олон.). Дернистый луговикъ представляетъ изъ себя многолѣтнюю очень красивую многостебельную траву, выш. 14—30 верш., изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), образующую дерновинки, распространенную почти во всей Европѣ и всею обыкновенную въ Россіи. Листья узко-линейные, плоскіе, сверху остро-шершавые. Метелка сжатая, односторонняя, а во время и послѣ цвѣтенія пирамидальная, раскидистая, съ вѣтвями, направленными во всѣ стороны. Колоски двухцвѣтные: зеленые или фіолетовые. Колосковые чешуи, или створки, почти такой же длины, какъ колосокъ. Каждый цвѣтокъ въ колоскѣ снабженъ двумя пленками, или цвѣточными чешуями, изъ которыхъ наружная крупнѣе внутренней, на верхушкѣ зубчатая, близъ основанія съ небольшою прямою остью, почти не выступающей надъ пленкою. Тычинокъ 3; завязь одногнѣздная, односѣмянная, съ 2 столбиками, несущими перистыя рыльца. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ на лугахъ между кустарниками и на опушкѣ лѣсовъ. Хорошая кормовая трава. (Рис. 161.)

Луговка, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.).

Луговой чай (*Lysimachia Nummularia* L.). Фармацевтическое названіе лугового чая: *Nummularia s. Centum morbia* (Herbal). Базановецъ (Гродн.). Буквица маленькая (Екат.), Буквица заячья (Екат.). Грызникъ (Вит.), Денежникъ, Заросликъ (Гродн.). Колосенная трава. Полумичная трава (Костр.), Пенязникъ вербеникъ, Пенязникъ, Лужайникъ, Повитель желтая (Вор.), Поползушникъ (Орл.), Расходникъ обложной (Могил.), Цинобрикъ (Екат.), Чай болотный. Луговой чай представляетъ изъ себя травянистое многолѣтнее растеніе изъ семейства «вербейниковыхъ» (*Primulaceae* Vent.), распространенное почти во всей Европѣ и въ большей части Европейской Россіи. Стебель лежачій, укореняющійся, дл. 2—7 верш. Листья супротивные, округлые, коротко-черепковые. Довольно крупные лимонно-желтые цвѣты сидятъ поодиночкѣ или по 2 на короткихъ цвѣтоножкахъ въ углахъ листьевъ. Чашечка глубоко-5-раздѣльная съ яйцевидно-сердцевидными острыми долями; вѣничекъ колесообразный, 5-раздѣльный; доли его въ 2—3 раза длиннѣе долей чашечки, желтыя, съ бурыми точечками на внутренней сторонѣ. Тычинокъ 5, съ длинными нѣтями, при основаніи сросшимися между собою и выдающимся изъ короткой трубочки вѣничка; въ промежуткахъ между ними иногда встрѣчаются недоразви-

тыя тычинки. Завязь верхняя, одногнѣздная; стебелекъ простой, съ головчатымъ рыльцемъ. Плодь—шаровидная коробочка, раскрывающаяся створками, съ многочисленными сѣменами. Цвѣтеть лѣтомъ. Произрастаетъ на влажныхъ тѣнистыхъ мѣстахъ, между кустарниками, въ рощахъ, въ оврагахъ и по берегамъ рѣкъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ лугового чая то-же, что и вербейника обыкновеннаго (*Lysimachia vulgaris*).

Лужайникъ, см. Луговой чай (*Lysimachia Nummularia* L.).

Лузикъ, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Лукъ, см. Лукъ обыкновенный, или рѣпчатый (*Allium Cera* L.).

Лукъ, см. Лукъ огородный (*Allium oleraceum* L.).

Лукъ гадючій } см. Гусятникъ желтый (*Gagea lutea* Schult.).

Лукъ гусиный }
Лукъ дикій, см. Шнажникъ черепчатый (*Gladiolus imbricatus* L.).

Лукъ дикій, см. Рѣзанецъ (*Allium Schaenoprasum* L.).

Лукъ коневій, см. Дубровникъ чесночный (*Teucrium Scordium* L.).

Лукъ мелкій } см. Рѣзанецъ (*Allium Schaenoprasum* L.).

Лукъ зубчатый }

Лукъ обыкновенный, или рѣпчатый (*Allium Cera* L.). Фармацевтическое названіе Сера, Бутъ-лукъ (Тамб.), Бутъ (Вор.), Бутунъ, Батанъ (Костр.), Жемчугъ, Лукъ, Лукъ простой, огородный, Лукъ саженецъ, Лукъ черменный (червленый), Лучина (Вятск.), Стрѣлешникъ, Сяте, Цибуля (Смол., Мор.), Цибуль, Цѣбуля (Мал.). Обыкновенный, или рѣпчатый лукъ представляетъ изъ себя многолѣтнее травянистое луковичное растеніе изъ семейства «лилейныхъ» (*Liliaceae* Dc.), родомъ съ Востока. Луковица простая, сплюснуто-шаровидная, снаружи ярко-желтая, состоящая изъ многихъ мясистыхъ влагалищъ; стебель выш. 13—14 верш., голый, вздутый подъ серединой, вмѣстѣ съ листьями голубовато-зеленый; листья цилиндрическіе, полые, по срединѣ вздутые. Бѣловатые цвѣты на длинныхъ ножкахъ образуютъ крупное шаровидное зонтичное соцвѣтіе, снабженное 2-хлестнымъ покрываломъ. Околоцвѣтникъ 6-тилистный, остающійся, съ тупыми листочками; тычинокъ 6, прикрепленныхъ къ нижней части листочковъ околоцвѣтника; вѣнчики выдаются изъ околоцвѣтника; внутреннія тычинки при основаніи расширены и снабжены 2 маленькими тупыми зубцами. Столбикъ нитевидный, съ 3-хлостнымъ рыльцемъ. Плодь—3-гнѣздная коробочка съ немногочисленными гранистыми сѣменами, покрытыми черною кожурою. Цвѣтеть лѣтомъ. Разводится всюду въ многочисленныхъ сортахъ, какъ овощъ. Въ пищу употребляются луковица и листья.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Свѣжій луковичный корень и сокъ его имѣютъ тяжелый летучій запахъ и острый вкусъ. Свѣжая разрѣзанная луковица сильно раздражаетъ глаза своимъ рѣзкимъ запахомъ и вызываетъ слезы на глазахъ. Употребленіе лука, какъ

лекарственного вещества. известно со временъ Гиппократа, который давалъ его, какъ мочегонное средство и какъ средство отъ боли въ груди. Какъ мочегонное средство, онъ давалъ выжатый сокъ изъ луковицы по нѣсколько столовыхъ ложекъ въ день и для вкуса подслащалъ сокъ медомъ. Отъ грудной боли врачи давали печеный или жареный лукъ со свѣжимъ масломъ. Въ медицинѣ врачами въ настоящее время лукъ прописывается только въ противо-цинготную порцію, въ народѣ-же онъ до сихъ поръ имѣетъ очень обширное примѣненіе какъ для внутренняго, такъ и для наружнаго употребленія. Внутри лукъ употребляютъ въ различныхъ похлебкахъ отъ начинающейся водянки, его ѣдятъ съ кислою капустою отъ цинги. По своему мочегонному свойству обыкновенный лукъ подходит близко къ употребляемому въ медицинѣ морскому луку, который онъ и замѣняетъ при недостаткѣ послѣдняго. Наружное примѣненіе лука въ народѣ очень разнообразно. Печеный въ золѣ лукъ растираютъ съ коровьимъ масломъ и ввидѣ теплой припарки кладутъ на низъ живота отъ болей при мочеиспусканіи. Для припарокъ-же варятъ молодой лукъ въ молокѣ. Припарки изъ лука, свареннаго въ молокѣ, употребляются, главнымъ образомъ, для смягченія опухолей, железъ и для созрѣванія нарывовъ. Особенно часто луковый сокъ употребляютъ отъ простуднаго шума въ ушахъ и глухоты; для этого выжимаютъ сокъ изъ луковицы, смачиваютъ имъ хлопчатую бумагу и вкладываютъ въ ухо на ночь; кромѣ того, отъ шума въ ушахъ дѣлаютъ еще слѣдующаго свойства жидкость: вынимаютъ средину луковицы и заполняютъ ее тминомъ, вырѣзанное мѣсто покрываютъ срѣзаннымъ кускомъ, пекутъ луковицу въ золѣ и выжимаютъ изъ нея сокъ. Отъ простудной глухоты и шума въ ушахъ сокъ этотъ кладутъ на ваткѣ въ ухо. Выжатый сокъ изъ лука смѣшиваютъ съ медомъ и смазываютъ имъ глаза при слабомъ зрѣніи. Сырую истолченную луковицу съ небольшимъ количествомъ соли кладутъ на обожженные мѣста, отчего уменьшается боль и предохраняется кожа отъ появленія пузырей. Печеный лукъ съ кислымъ тѣстомъ крестьяне кладутъ на нарывы, чтобы ускорить ихъ созрѣваніе.

Лукъ считается въ народѣ средствомъ, предохраняющимъ отъ заразы. При существованіи прилипчивыхъ болѣзней, нанизываютъ лукъ на нитки и развѣшиваютъ его въ избахъ. Съ тою-же цѣлью предохраненія отъ падежа животныхъ надѣваютъ на шею нанизанныя на толстую нитку чесночницы и луковые головки.

Луковому соку приписывается свойство рожденія волосъ, почему луковымъ сокомъ вытираютъ кожу, плѣшь смазываютъ ежедневно луковымъ сокомъ, смѣшаннымъ пополамъ съ сотовымъ медомъ. Кромѣ того, лукъ считается въ народѣ глистогоннымъ средствомъ. Его настаиваютъ на бѣломъ винѣ и выпиваютъ каждый день по рюмкѣ натощакъ отъ мелкихъ глистъ. Эта-же вина въ народной извѣстна въ народѣ, какъ мочегонное средство, помогающее отъ каменной болѣзни.

Въ ветеринарной народной медицинѣ лукъ употребляется въ тѣхъ-же случаяхъ. Лошадямъ и коровамъ даютъ слабительное

изъ лука: три большихъ луковицы толкутъ съ горстью соли, разводить бутылкою воды и вливаютъ животному всю порцію заразъ.

Лукъ огородный (*Allium oleraceum* L.). Чеснокъ полевой, Чеснокъ дикій (Мог., Вор.). Огородный лукъ представляетъ изъ себя многолѣтнее травянистое луковичное растение изъ семейства «лилейныхъ» (*Liliaceae* Dc.), распространенное въ сѣверной и средней Европѣ, въ западной, средней и юго-западной Россіи. Стебель прямостоящій, до половины облиственный, выш. 13—14 вершк. Луковица простая, яйцевидная, съ бѣловатыми перепончатыми влагалищами; кромѣ главной луковицы, развивается еще другая меньшая, углубляющаяся въ почву помощью ножки. Листья тонко-линейные, желобчатые. Цвѣты на длинныхъ ножкахъ образуютъ зонтичное соцвѣтіе; зонтикъ, кромѣ того, содержитъ луковички. Покрывало 2-хлестное, длинно-заостренное. Околоцвѣтникъ 6-тилистный, колокольчатый, съ тупыми листочками. Листики околоцвѣтника бѣловато-зеленые или розовые, съ зеленою или пурпуровою полосою на спинкѣ. Тычинокъ 6, безъ зубцовъ. Столбикъ нитевидный, съ 3-хлопастнымъ рыльцемъ. Плодъ—3-хгнѣздная коробочка съ немногочисленными, гравистыми, въ черной кожурѣ, сѣменами. Встрѣчается на лугахъ, между кустарниками въ рощахъ и какъ сорная трава, на обработанныхъ мѣстахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. (Рис. 162.)

Лукъ огородный, см. Лукъ обыкновенный (*Allium Cera* L.).

Лукъ порей, см. Порей (*Allium Porrum* L.).

Лукъ простой, см. Лукъ обыкновенный, или рѣпчатый (*Allium Cera* L.).

Лукъ рѣпчатый } см. Лукъ обыкновенный, или рѣпчатый (*Allium Cera* L.).

Лукъ-саженецъ }

Лукъ червленый } см. Лукъ обыкновенный, или рѣпчатый

Лукъ чермевный } (*Allium Cera* L.).

Луковица, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

Луководоръ трава, см. Язвенникъ обыкновенный (*Anthyllis Vulneraria* L.).

Лумпина, см. Спиріусъ (*Nicandra physaloides* Gärtn.).

Лунная трава } см. Лунникъ многолѣтній (*Lunaria rediviva* L.).

Лунникъ }

Лунникъ многолѣтній (*Lunaria rediviva* L.). Фармацевтическое название: *Lunaria rediviva*, s. *Viola lunaria rotunda siliqua* v. *Viola latifolia*. Лунникъ, Лунная трава, Мѣсячникъ, Любезная травка, Лунная фиалка. Многолѣтній лунникъ представляетъ изъ себя многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), распространенное въ средней Европѣ и изрѣдка встрѣчающееся въ лѣсахъ средней и западной Россіи. Листья черешковые, глубоко-сердцевидные, по краямъ дважды-остро-зазубренные. Цвѣты лиловые, душистые, сначала расположенные щиткомъ, потомъ разрастаются въ кисть. Чашечка состоитъ изъ 2 паръ опадающихъ листочковъ, вѣнчикъ—изъ 4-хлестковъ, расположенныхъ на-крестъ. Тычинокъ 6, изъ которыхъ 2 короче остальныхъ. Плодъ—совершенно пло-

скіе, эллиптическіе, широко перепончатые, повислые стручечки. Цвѣтеть съ апрѣля по іюнь. Въ медицину употребленіе лупиника совершенно оставлено.

Лупинъ, см. Лупинъ желтый (*Lupinus luteus* L.).

Лупинъ желтый (*Lupinus luteus* L.). Лупинъ, Волчій бобъ, Волчанъ, Дикій кофе, Солнечникъ, Паникадило, Верисолнце (Малор.), долѣтнее травянистое растение изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Rapiponaceae* L.), произрастающее въ южной Европѣ. Стебель прямостоящій, выш. 14—22 вершковъ; листья пальчатые, о 9 продолговатыхъ листочкахъ; желтые душистые цвѣты расположены мутовками, собранными на концахъ стебля и его вѣтвей въ длинныя полусовидныя соцвѣтія; чашечка двугубая; вѣничекъ 5-тиленестный; 2 нижніе сросшіеся лепестка образуютъ клювообразную лодочку. Тычинокъ 10, сросшіеся нитями въ трубочку; пыльники поочередно, одни короткіе, другіе длинныя. Столбикъ шиловидный, наверху внутрь загнутый, съ головчатымъ рыльцемъ. Бобъ болѣе или менѣе сплюснутый, снаружи опушенный, внутри съ поперечными перегородками между сѣменами; раскрывающійся 2-мя створками. Цвѣтеть въ маѣ и въ іюнь. Разводится на поляхъ для зеленого удобренія и на кормъ скоту. Для той-же цѣли въ Россіи воздѣлывается еще узколиственный лупинъ (*Lupinus angustifolius*); сѣмена послѣдняго, а также и бѣлаго лупина (*Lupinus albus*) употребляются иногда, какъ суррогатъ кофе. Пѣкоторые виды, какъ, напр., лупинъ садовый (*Lupinus hirsutus*), мохнатый и съ голубыми цвѣтами, разводятся въ садахъ, какъ очень красивое декоративное растение. (Табл. XXVII, фиг. 151.)

Лупуль, см. Василецникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).

Лускавка, см. Хлопушка (*Silene inflata* Smith.).

Лускачъ, см. Ласточкинъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* Moench.).

Лускница, см. Эммеръ (*Triticum dicoccum* Schr.).

Лутошка, см. Луна мелколистная (*Thia parvifolia* Ehrh.).

Лучевка обыкновенная (*Radiola imoides* Gmel.). Пизенъкая (выш. $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$ вершка) травка изъ семейства «леновыхъ» (*Lipaseae* DC.), распространенная почти по всей Европѣ, въ средней и южной Россіи. Стебель нитевидный, виллообразный; листья супротивные, яйцевидные. Цвѣты очень мелкіе бѣлые; чашечка 4-храздѣльная; лепестковъ, тычинокъ и столбиковъ по 4; завязь съ 4 полными и 4 неполными перегородками, 8-мигнѣздная, съ осевымъ сѣмяносекомъ и 1 повислымъ яичкомъ въ каждомъ гнѣздѣ. Плодъ—коробочка съ 4 полными и 4 неполными перегородками, раскрывающаяся у верхушки, вълѣдствіе расклепыванія плодолистиковъ другъ отъ друга и отъ срединнаго столбика. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ на песчаныхъ мѣстахъ, въ сосновыхъ лѣсахъ. (Рис. 163.)

Лучина, см. Лукъ обыкновенный, или рѣпчатый (*Allium Cera* L.).

Лучинникъ, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.)

Лыко волчье, см. Волчье лыко (*Daphne Mezereum* L.).

Лыко волчье, см. Бересклетъ европейскій (*Evonymus europaeus* L.).

Лыпухъ, см. Лопушникъ обыкновенный (*Lappa major* Gärtn.).

Лычакъ, см. Аврикула (*Primula Auricula* L.).

Львинохвостъ, см. Пустырникъ обыкновенный (*Leonurus cardiaca* L.).

Львиный зѣвъ большой (*Antirrhinum majus* L.). Фармацевтическое названіе *Orontium majus* s. *Caput Vuli* s. *Antirrhinum* (*Herba*). Выжлийъ, Выжлийъ полевой, Копачій глазъ, Собачья голова, Жабрей, Жабра, Львиная пасть, Львиный уста. Двухлѣтнее или многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «норичниковыхъ» (*Scrofulariaceae* R. Br.), произрастающее въ южной Европѣ. Стебель выш. 7—14 вершковъ, обыкновенно вѣтвистый. Листья очередные, ланцетные, цѣльнокрайніе. Соцвѣтіе—длинная кисть, состоящая изъ крупныхъ свѣтло-пурпуровыхъ цвѣтовъ. Чашечка глубоко-5-тираздѣльная, железисто-пушистая, съ линейными долями, превышающими вѣнчикъ и коробочку. Вѣнчикъ двугубый; трубочка его при основаніи съ полнымъ бугромъ; верхняя губа 2-хлопастная, нижняя—3-хлопастная, при основаніи сверху вышуклая, закрывающая такимъ образомъ зѣвъ вѣнчика. Тычинокъ 4, двусильныхъ (то есть 2 длиннѣе, 2 короче). Пыльники 2-хлѣздные; завязь верхняя, 2-хлѣздная; столбикъ простой. Плодъ—железисто-пушистая, косо-яйцевидная, 2-хлѣздная коробочка, съ неравными хлѣздами, изъ которыхъ переднее раскрывается 2-мя зубчатыми отверстіями, заднее однимъ. Сѣмена яйцевидныя, сѣтчато-морщинистыя. Львиный зѣвъ принадлежитъ къ числу очень распространенныхъ садовыхъ растений и разводится въ многочисленныхъ сортахъ, съ пурпуровыми желтыми и пестрыми цвѣтами. Цвѣтетъ лѣтомъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Медицинское употребленіе львиного зѣва врачами совсѣмъ оставлено; въ народѣ его употребляютъ для леченія ранъ, нарывовъ и опухолей.

Львиный зѣвъ полевой, см. Ключевикъ (*Antirrhinum Orontium* L.).

Льница лѣсная, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

Льянка, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

Льянка малая (*Linaria minor* Desf.). Малая льянка представляетъ изъ себя однолѣтнее травянистое железисто-пушистое растеніе изъ семейства «норичниковыхъ» (*Scrofulariaceae* R. Br.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ средней и южной Россіи. Стебель выш. 2½—7 вершковъ, вѣтвистый; листья ланцетные, тупые, суженные въ черешокъ, нижніе—супротивные, верхніе—очередные. Цвѣты мелкіе, пазушные, на цвѣтоножкахъ, второе превышающихъ чашечку. Чашечка 5-тираздѣльная, съ продолговато-линейными, тупыми долями; вѣнчикъ двугубый, фиолетовый, съ блѣдно-желтой вышуклиной на нижней губѣ, не заслоняющей вполне зѣвъ вѣнчика; трубочка вѣнчика при основаніи со шпорой; верхняя губа 2-хлопастная, нижняя—

3-хлопастная. Тычиноктъ 4, двусильныхъ (2 длиннѣе 2 короче). Завязь 2-гнѣздная, съ простымъ столбикомъ. Плодь—яйцевидная, железисто-пушистая коробочка, съ 2 почти равными гнѣздами, раскрывающаяся наверху, по сторонамъ перегородки, 6—8 зубцами. Сѣмена продолговатыя съ продольными ребрышками. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на каменистыхъ мѣстахъ и на поляхъ. (Рис. 164.)

Лъннанка обыкновенная, см. Лень дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

Лъннанка плющелистная (*Linaria Cymbalaria* Mill.). Это есть однолѣтняя голая травка выш. 7—14 вершковъ, изъ семейства «норичниковыхъ» (*Scrophulariaceae* R. Br.), распространенная въ средней и южной Европѣ. Стебель нитевидный, лежачій, укореняющійся. Листья черешковые, 5-тилопастные, при основаніи сердцевидные. Мелкіе цвѣты сидятъ по одному на тонкихъ пазушныхъ цвѣтоножкахъ; вѣнчикъ блѣдно-лиловый, съ 2 желтыми пятнами на выпуклинѣ нижней губы. Цвѣтетъ съ мая до августа.

Лъноктъ, см. Лень дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

Лъноктъ, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Лъбношка, см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).

Лъековка, см. Яблоня (*Pyrus Malus* L.).

Лъеной чай, см. Линнея сѣверная (*Linnaea borealis* L.).

Лъеное зелье, см. Бородавникъ обыкновенный (*Lamprana communis* L.).

Лъеноемоковное дерево, см. Смоковница обыкновенная (*Ficus Carla* L.).

Лъетница скворцовая, см. Рунырь лъеной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.).

Лъчуха, см. Люцерна посѣвная (*Medicago sativa* L.).

Лъчуха, см. Люцерна серповидная (*Medicago falcata* L.).

Лъщина, см. Орѣхъ лъеной (*Corylus Avellana* L.).

Любъ, см. Гравилатъ городской (*Geum urbanum* L.).

Любезная травка, см. Лунникъ многолѣтн. (*Lunaria rediviva* L.).

Любжа, см. Ятрышникъ широколистный (*Orchis latifolia* L.).

Любжа, см. Фіалка ночная (*Platanthera bifolia* Rich.).

Люби меня не покинь, см. Ятрышникъ-дремликъ (*Orchis Morio* L.).

Любимъ, см. Липучка репейчатая (*Echinopspermum Lappula* Lehm.).

Любимъ, см. Зоря (*Levisticum officinale* Koch.).

Любимъ корень, см. Букункины слезки (*Orchis maculata* L.).

Любимъ-травка, см. Гравилатъ городской (*Geum urbanum* L.).

Любима, см. Ковыль перистый (*Stipa pennata* L.).

Любимая трава, см. Росинка круглолистная (*Drosera rotundifolia* L.).

Любимникъ, см. Гравилатъ городской (*Geum urbanum* L.).

Любиста

Любистикъ } см. Зоря лекарственная (*Levisticum officinale* Koch.).

Любистокъ }

Любистокъ водяной, см. Перечникъ широколистный (*Lepidium latifolium* L.).

Любистокъ лѣсной, см. Ломоносъ прямой (*Clematis recta* L.).

Любистокъ лѣсной дикій, см. Василистникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).

Любистокъ полевой, см. Герань кроваво-красная (*Geranium sanguineum* L.).

Любистокъ полевой, см. Лютикъ ползучій (*Ranunculus repens* L.).

Любистра, см. Зоря лекарственная (*Levisticum officinale* Koch.).

Любимъ, см. Иванъ-чай (*Erilobium angustifolium* L.).

Любка, см. Снеголовникъ плосколистный (*Eryngium planum* L.).

Любка, см. Ятрышникъ широколистный (*Eryngium latifolium* L.).

Любка, см. Ятрышникъ-дремликъ (*Orchis Morio* L.).

Любка, см. Почная фиалка (*Platanthera bifolia* Rich.).

Любка, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).

Любка, см. Дурнишникъ колючій (*Xanthium spinosum* L.).

Любки, см. Ятрышникъ широколистный (*Orchis latifolia* L.).

Любки, см. Снеголовникъ плосколистный (*Eryngium planum* L.).

Любковая зелень, см. Ятрышникъ широколистный (*Orchis latifolia* L.).

Люблю и ненавижу, см. Василекъ синий, или полевнй (*Centaurea cyanus* L.).

Любовицъ, см. Подмаренникъ мареновидный (*Gallium rubioides* L.).

Любовное растение, см. Лудно дерево (*Cercis siliquastrum* L.).

Любовный корень, см. Почная фиалка (*Platanthera bifolia* Rich.).

Любовъ, см. Гравилатъ городской (*Geum urbanum* L.).

Любовъ двѣичья, см. Сиякъ обыкновенный (*Echium vulgare* L.).

Любыстыкъ, см. Зоря лекарственная (*Levisticum officinale* Koch.).

Люльки } см. Бѣлена черная (*Hyosclamus niger* L.).

Люблина, см. Медовникъ (*Galeopsis Tetralit* L.).

Люнецъ, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

Люньки, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).

Лютикъ, см. Вѣтренница лютиковая (*Anemone ranunculoides* L.).

Лютикъ, см. Сокъ (*Anemone Pulsatilla* L.).

Лютикъ, см. Горчакъ (*Polygonum Persicaria* L.).

Лютикъ, см. Лютикъ ѣдкій (*Ranunculus acer* L.).

Лютикъ боровой, см. Грушанка одноцвѣтн. (*Pirola uniflora* L.).

Лютикъ водяной, см. Лютикъ ядовитый (*Ranunculus sceleratus* L.).

Лютикъ водяной (*Ranunculus aquatilis* L.). Многолѣтнее травянистое водное растение изъ семейства «лютиковыхъ» (*Ranunculaceae* Juss.), распространенное по всей Европѣ и въ Россіи. Плавающий по водѣ стебель выпускаетъ изъ своей нижней части корни, которыми растение прикрепляется къ илистой почвѣ на днѣ прудовъ, рѣкъ и каналовъ. Листья, выступающіе на поверхность воды, раздѣлены на 3—5 яичевидныхъ,

больше или меньше глубокихъ лопастей, погруженные-же листья очень мелко разсѣчены на нитевидныя доли, которыя въ воды спадаютъ и слипаются. Цвѣты бѣлые. Чашелистиковъ 5; лепестковъ 5, съ неприкрытою медовою ямочкой; тычинокъ много, превышающихъ пестикъ. Плодолистиковъ много, плодъ состоитъ изъ сѣмянокъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Произрастаетъ въ рѣчкахъ, канавахъ, озерахъ и прудахъ. Цвѣтъ съ мая до августа. (Рис. 165.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Всѣ растенія, принадлежащія къ семейству «лютиковыхъ» (лютикъ полевой, или куриная слѣпота (*Ranunculus arvensis*), лютикъ клубеносный (*Ranunculus bulbosus*), лютикъ ѣдкій (*Ranunculus ascer*), очень ядовиты и употребляются въ народѣ только, какъ наружное средство. Лютики одинаково ядовиты какъ для людей, такъ и для животныхъ; они вызываютъ воспаленіе желудка и кишокъ и даже омертвленіе ихъ стѣнокъ. Противоядіемъ считается: теплая вода съ масломъ, парное молоко, также чистая вода, вынимаемая въ большомъ количествѣ, а также вода, подкисленная небольшимъ количествомъ уксуса.

Листья лютиковыхъ растеній, приложенныя на кожу, вызываютъ на ней пузыри, подобно шпанскимъ мухамъ, вотъ почему ихъ прикладываютъ, какъ отвлекающее средство, къ суставамъ при страданіи ломотою. Толченныя листья ввидѣ припарки кладутся также на больныя члены, чтобы вызвать красноту на кожѣ и успокоить въ нихъ боль, которая зависитъ отъ усиленнаго притока крови къ больнымъ глубоко лежащимъ тканямъ. Отъ головной боли листья лютиковъ прикладываютъ къ затылку.

Отваромъ травы крестьяне обмываютъ чесотку, а свѣжую толченую траву прикладываютъ къ зобу, къ твердымъ опухолямъ железъ; но долго оставлять на тѣлѣ траву лютиковъ нельзя: они развѣдаютъ кожу и даютъ трудно излечиваемыя раны. Поэтому чаще ихъ употребляютъ ввидѣ мази смѣшавъ свѣжевыжатый сокъ съ коровьимъ масломъ (на 1 часть сока берутъ 2 части масла по вѣсу). За неимѣніемъ шпанскихъ мухъ изъ сока лютиковыхъ можно приготовить нарывное тѣсто, для чего берется обыкновенное кислое тѣсто, къ которому примѣшивается толченая свѣжая трава одного изъ лютиковыхъ растеній.

Лютикъ голубой, см. Борецъ синий (*Aconitum Napellus* L.).

Лютикъ горькій } см. Наперстянка крупноцвѣтная (*Digitalis*
Лютикъ желтый } *grandiflora* Lam.).

Лютикъ жестколистный (*Ranunculus divaricatus* Schr.). Измодѣвъ водяной въ нѣкот. мѣст. Пермск. губ.). Жестколистный лютикъ представляетъ изъ себя многолѣтнее травянистое водяное растеніе изъ семейства «лютиковыхъ» (*Ranunculaceae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и обыкновенное въ Россіи. Всѣ погруженные листья—округлаго очертанія, въ нѣсколько разъ короче соответствующихъ междоузлій и цвѣтоножекъ; сегменты ихъ нѣсколько разъ раздѣляются на два участка и расположены всѣ въ одной плоскости; листья въ воды остаются въ ихъ естественномъ положеніи. Чашелистиковъ и ле-

пестковъ 5; лепестки бѣлые. Тычинокъ много; плодъ состоитъ изъ сѣмянокъ. Цвѣтъ лѣтомъ. Растетъ въ рѣкахъ и рѣчкахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ Пермской губерніи слабый отваръ этого вида лютика употребляется внутрь отъ головной боли, отъ боли въ желудкѣ и также, если человѣкъ чувствуетъ большую слабость въ рукахъ и ногахъ.

Лютикъ золотистый (*Ranunculus Lingua* L.). Фармацевтическое названіе *Herba et Radix Ranunculi Flammæ majoris*. Желтый цвѣтъ (Галичъ). Липманъ. Лихорадочная трава (Влад.). Натяжъ, Натягачъ. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «лютиковыхъ» (*Ranunculaceae* Juss.), распространенное по всей Европѣ и почти во всей Россіи. Стебель прямой, высокій, покрытый вмѣстѣ съ листьями прижатыми волосами. Листья узколанцетные, заостренные, съ рѣдкими зубчиками на краю; чашелистиковъ 5, отвороченныхъ; лепестковъ 5, желтыхъ. Тычинки многочисленныя; плодъ—сухія сѣмянки съ сплюснутымъ и загнутымъ носикомъ. Пускаетъ въ водѣ длинныя побѣги; воздушныя стебли, поднимающіеся отъ подземныхъ побѣговъ онаго, снабжены листьями, имѣющими черешокъ и овальную пластинку. Цвѣтъ лѣтомъ. Растетъ въ водѣ при берегахъ и на болотахъ. Употребляется въ народѣ отъ лихорадки.

Лютикъ клубненосный (*Ranunculus bulbosus* L.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «лютиковыхъ» (*Ranunculaceae* Juss.), распространенное почти по всей Европѣ и преимущественно въ западной и юго-западной Россіи, выш. 5—7 верш. Стебель пушистый, при основаніи утолщенъ въ клубень. Листья перисто-трехраздѣленные, съ трехраздѣльными долями. Цвѣты ярко-желтые, верхушечные, иногда находящіеся въ развилкахъ стебля; чашелистиковъ и лепестковъ 5; чашелистики отогнуты внизъ и прижаты къ цветоножкѣ. Плодъ—гладкія сѣмянки. Растетъ обыкновенно на сухихъ лугахъ и на необработанныхъ мѣстахъ. (Рис. 166.)

Лютикъ полевой, см. Слѣпота куриная (*Ranunculus arvensis* L.).

Лютикъ прыщинецъ, см. Лютикъ ѣдкій (*Ranunculus acer* L.).

Лютикъ прыщинецъ, см. Прыщинецъ (*Ranunculus Flammula* L.).

Лютикъ черный, см. Копытень европ. (*Asarum europaeum* L.).

Лютикъ ѣдкій (*Ranunculus acer* L.). Воротъ снѣгій. Вѣничъ (Гал.), Дрибноцвѣтъ (Хер.), Ковтобрюшникъ (Хар.), Жемчужокъ (Вор.), Зараза (Гродн.), Зиле одтряецъ (Малор.), Зоря луговая (Вор.), Иванова трава (Олон.), Кленовый цвѣтъ (Тамб.), Козелецъ (Вел. Росс.), Козелецъ (Мал. Росс.), Козелки (Вит.), Конечный цвѣтъ (Олон.), Купало (Сл. Церк.) Купальница (Арх., Вятск., Пермск.), Куриная слѣпота (мног. мѣста), Ломатникъ (Малор.), Лютикъ, Лютикъ прыщинецъ (Тул., Яросл.), Маслянка (Полт.), Преградъ (Сл. Церк.), Сильный цвѣтъ (Сл. Церк.), Сильворотъ (Ниж.), Сондаръ (Вор.), Сонбаръ (Вор.), Царь трава иначе Купальница, Чечина (Сл. Церк.). Чистякъ. Лютикъ ѣдкій представляетъ многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «лютиковыхъ» (*Ranunculaceae* Juss.), распространенное почти по всей

Европѣ и въ Россіи. Стебель и черешки листьевъ съ прижатыми волосками; прикорневые и нижніе стеблевые листья въ очертаніи 5-тиугольные, дланевидно-раздѣльные, съ почти ромбическими надрѣзанными и остро-зубчатыми долями; верхніе листья трехраздѣльные, съ линейными долями. Цвѣты желтые. Чашелистиковъ и лепестковъ по 5-ти. Чашелистики почти перепончатые; цвѣтоложе голое. Плодъ—сѣмянки съ малымъ, почти прямымъ носикомъ. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта. Растетъ на лугахъ и въ рощахъ. (Табл. XXVI. фиг. 147.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Лютикъ ѣдкій вмѣстѣ съ лютикомъ ядовитымъ принадлежитъ къ числу наиболѣе сильно дѣйствующихъ лютиковыхъ растений; изъ него въ деревняхъ готовится нарывной пластырь. Название «лютика», произведенное отъ слова «лютый, жестокий», принадлежало сначала лютику ядовитому, затѣмъ по сходному дѣйствию было перенесено на лютикъ ѣдкій, а затѣмъ было принято за родовое названіе и перешло ко всемъ видамъ.

Въ Тверской губерніи свѣжими листьями лютика ѣдкаго растираютъ, ноги отъ ломоты, отчего на кожѣ появляются волдыри, его такъ-же, какъ и лютикъ ядовитый, прикладываютъ къ пульсу отъ лихорадки. Въ Пермской губерніи собирается цвѣтущее растеніе безъ корня, высушивается, и изъ сушеннаго растенія готовится отваръ, который пьютъ отъ грыжи и отъ боли въ поясницѣ. Также въ Пермской губерніи его употребляютъ вмѣсто горчичника и нарывного пластыря.

Лютикъ ядовитый (*Ranunculus sceleratus* L.). Фармацевтическое названіе: *Ranunculus palustris* s. *aquaticus* (Herba). Бишагъ (Малор.). Вѣтреница. Кабникъ вредный, болотистый. Коростовая трава (Курск.). Лихорадочная трава (Курск.). Лютикъ водяной (Пермск.). Нарывная трава, Нарывъ (Курск.). Слѣпокурникъ, Пар зіле, Чорне зіле (Кіев., Вол.). Щиперъ (Мог.). Ядовитая цѣтущая нога, Яскеръ трава. Ядовитый лютикъ есть однолѣтнее травянистое растеніе, распространенное почти во всей Европѣ и весьма обыкновенное въ Россіи, вышиной 7—21 вершк. Листья блестящіе, пальчато-раздѣльные, съ надрѣзанными долями; стебель и черешки покрыты мягкими волосками; ярко-желтые цвѣты на верхушечныхъ цвѣтоножкахъ, находящихся иногда въ развилкахъ стебли. Чашелистиковъ и лепестковъ по 5; цвѣтоложе продолговатое. Чашелистики отвороченные; на лепесткахъ нѣтъ чешуи, прикрывающей медовую ямочку. Плодъ—многочисленные мелкіе немного морщинистыя сѣмянки. Растетъ на сырыхъ лугахъ. Цвѣтетъ съ весны до осени. Въ свѣжемъ видѣ весьма ядовитъ; въ свѣѣ-же поѣдается скотомъ.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Лютикъ ядовитый употребляется въ народѣ, какъ средство отъ лихорадки, для чего свѣжіе цвѣты его часовъ за 8 или 12 до начала приступа привязываютъ на обѣ руки къ тому мѣсту, гдѣ прощупывается пульсъ. Знахари даютъ его внутрь людямъ и животнымъ отъ водобоязни. Въ Кур-

ской губернии его употребляютъ отъ лошадиной коросты, а въ Пермской въ малыхъ дозахъ—отъ чувства давленія подъ лопаткой и отъ разстройства и боли въ желудкѣ.

Лютики, см. Грушанка одноцвѣтная (*Pirola uniflora* L.).

Лютики, см. Чина луговая (*Lathyrus pratensis* L.).

Люцерна, см. Люцерна посѣвная (*Medicago sativa* L.).

Люцерна, см. Люцерна серповидная (*Medicago falcata* L.).

Люцерна, сл. Люцерна хмелевидная (*Medicago lupulina* L.).

Люцерна бургундская, см. Люцерна посѣвная (*Medicago sativa* L.).

Люцерна настоящая, см. Люцерна посѣвная (*Medicago sativa* L.).

Люцерна нѣмецкая, см. Люцерна серповидная (*Medicago falcata* L.).

Люцерна посѣвная (*Medicago sativa* L.). Фармацевтическое названіе *Medica* (*Herba Medicae*) отъ страны Мидіи. Буркунецъ (Екат.), Буркунъ красный (Ставр.), Везиль, Везиль стеной (Урал.), Вязель луговой, Врачебница, Лѣбуха, Лечуха (Даль), Люцерна бургундская, настоящая, Мышій стеновой (Екат.), Чердунецъ (Сарат.), Храпунъ (Сарат.), Джурмутка съ киргиз., Юпка (на Кавказѣ). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.), родомъ изъ западной части умѣренной Азіи, встрѣчающееся въ одичаломъ состояніи въ средней и южной Россіи, выш. 7—18 вершк. Стебель прямостоящій, вѣтвистый, вмѣстѣ съ листьями голый или коротко-пушистый; листья тройчатые; листочки ихъ на верхушкѣ выемчатые, съ короткимъ остріемъ, линейно-клиновидные, въ выемкѣ, кверху зубчатые; на нижнихъ листьяхъ листочки—продолговато-обратно яйцевидные. Сизеватые или фіолетовые цвѣты въ длинныхъ кистяхъ значительно превышающихъ листья. Чашечка 5-ти-надрѣзная; вѣничикъ 5-тилепестный. мотыльковый (верхній) лепестокъ образуетъ флагъ, два боковые—крылья, нижніе 2, сросшіеся между собою—лодочку; лодочка тулая. Тычинокъ 10 двубратственныхъ (сросшихся между собою въ два пучка), 10-я верхняя тычинка—свободная. Завязь одногнѣздная, съ простымъ столбикомъ. Плодъ—пушистый, сѣтчато-жлжковатый, винтообразно закрученный бобъ, образующій 2—3 оборота. Цвѣтетъ лѣтомъ. Встрѣчается изрѣдка на сорныхъ мѣстахъ, при дорогахъ и заборахъ. Воздѣлывается, какъ кормовая трава, любитъ глубокую, не слишкомъ сухую и не слишкомъ влажную почву, требуетъ обильнаго унавоживанія; глинистая почва совершенно для нея не годится. Землю, назначенную для посѣва, готовятъ тремя распахками, изъ которыхъ первая производится въ августѣ, 2-я въ октябрѣ или ноябрѣ, третья передъ посѣвомъ. Послѣ второй распахки земля боронится. Въ концѣ февраля или въ мартѣ вывозится навозъ, передъ 3-й распахкой. Навозъ выбирается наиболѣе перегнившій, рас-

пашки должны производиться съ каждымъ разомъ глубже, для того, чтобы длинныя и веретенообразныя корни люцерны могли углубиться въ землю и, распространяясь, доставлять ей обильную пищу и сохранять во время засухи отъ жаровъ. Посѣвъ производится, смотря по моменту наступленія теплаго времени, вообще тогда, когда уже нельзя предполагать возвращенія морозовъ. Сѣмена люцерны смѣшиваются или съ овсомъ, или съ ячменемъ, иначе земля осталась-бы цѣлый годъ не производительною, такъ какъ въ первое лѣто послѣ посѣва люцерны не дастъ никакого произведенія, подобно эспарсету, тогда какъ жатва овса или ячменя можетъ вознаградить работу, употребленную на землю. Кромѣ того, стебли ячменя и овса доставляютъ защиту отъ лѣтнихъ жаровъ. На десятину требуется около пуда сѣмянъ люцерны. По посѣвѣ ее слегка заборониваютъ и гладко укатываютъ забороненное поле каткомъ. Для посѣва выбирается время нѣсколько влажное: или передъ дождемъ, или послѣ дождя. Никогда не совѣтуютъ производить посѣвъ среди солнечнаго дня и во время вѣтра. Въ первое лѣто люцерна растетъ медленно и не требуетъ никакого ухода. Не надо опасаться появленія дурныхъ сорныхъ травъ, которыя она заглушитъ и истребитъ, какъ только войдетъ въ силу; нѣкоторыя только растенія, каковы лопушникъ, чертополохъ и густыя травы въ бороздахъ и между рядами надобно истреблять, вырывая мотыгой. Овесъ и ячмень, посѣянные съ люцерной, собираются въ обыкновенное время, причемъ ихъ жнутъ или косятъ повыше, чтобы срѣзать по возможности только однѣ головки молодой люцерны. На второе лѣто производится покосъ люцерны, причемъ нужно замѣтить, что только на третій годъ она входить въ полную силу и даетъ весьма обильные три или четыре, а иногда пять или шесть покосовъ. Чѣмъ сѣвернѣе страна, тѣмъ, конечно, дастъ она меньше покосовъ. Самое лучшее время для косовы считается время цвѣтенія люцерны, когда она доставляетъ вкусный и питательный фуражъ. Ранѣе этого срока она водяниста, очень усыхаетъ и при сѣнкѣ чернѣетъ, посѣвъ-же означеннаго времени дѣлается жесткой и невкусной. Посѣвная люцерна по качеству и количеству доставляемаго ею сѣна считается выше клевера; сѣно ея не сообщаетъ никакого запаха ни маслу, ни молоку, и полъ-десятины земли достаточно для прокормленія свѣжею травою ея въ продолженіе всего лѣта трехъ и даже 4-хъ коровъ, на тучной-же землѣ одной десятины люцерны достаточно для прокормленія около 10 головъ рогатаго скота въ продолженіе всего лѣта; нужно замѣтить, однако, что давать ее скоту слѣдуетъ съ умѣренностью и при этомъ не смоченную ни дождемъ, ни росой, иначе, будучи дана въ чрезмерномъ количествѣ, она можетъ оказать вредныя послѣдствія; сухая, она разгорячаетъ животныхъ, свѣжая—разслабляетъ ихъ, производитъ пученіе живота и вызываетъ газы, могущія даже причинить смерть. Въ первые два года не должно выпускать на

пашню, засѣянную люцерной, никакого скота. овцы-же совершенно не переносятъ люцерны. Изъ сухихъ корней люцерны во Франціи дѣлаются зубныя щеточки, которые окрашиваются и опрыскиваются духами. (Табл. XXVII, фиг. 150.)

Люцерна серповидная, или шведская (*Medicago falcata* L.). Буркунъ (Вол., Под., Тавр.), Буркунъ желтый (Ставр.), Буркунецъ (Тавр., Вор.), Бурундюкъ (Екат.), Бурундукъ, Бурунчикъ, Бурунчукъ, Борончукъ (Малор.), Вязиль (Курск.), Воробыный горохъ (Влад.), Полевой горошекъ (Хар.), Глазная травка (Вор.), Желтихъ (на Ирт.), Жеребчикъ (Курск.), Желтый клеверъ (Мог.), Зеновецъ (Гродн.), Куколь-баба (Вор.), Лвчуха, Медунка, Люцерна нѣмецкая, шведская, Шведское сѣно, Пердунецъ (Сам., Сар.); Боровые стручки (Влад.), Счастливая травка (Сарат.), Печевина, Спотыказъ (Хар.), Черевинникъ (Полт.), Черевивая трава (Сарат.), Ямурокъ, Ямурка, Имурка, Юморка, Юморкай, Еморикъ (Вор.). Многолѣтняя трава изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Rapilionaceae* L.), распространенная въ средней и южной Европѣ, въ средней Россіи, въ Сибири и Туркестанѣ, съ приподнимающимся или стелющимся стеблями. Отличается отъ люцерны посѣвной (описание см. выше: люцерна посѣвная, *Medicago sativa* L.) золотисто-желтыми цвѣтами въ сухихъ, короткихъ, почти головчатыхъ кистяхъ и серповидными бобами, образующими не болѣе одного колоска. Цвѣтеть съ мая до октября. Даетъ отличный, питательный кормъ для скота; разводится и растетъ на сухихъ лугахъ и поляхъ. (Рис. 167.)

Люцерна хмелевидная (*Medicago lupulina* L.). Буркунчикъ, Бурунчукъ (Екат.), Полуклеверъ, Тараканокъ. Хмелевая. Это—однолѣтнее, иногда многолѣтнее, травянистое пушистое растение изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Rapilionaceae* L.), распространенное во всей Европѣ и въ большей части Россіи. Стебель развѣтвленный, съ простертыми или приподнимающимися стеблями; листья тройчатые, съ обратно-яйцевидными зубчатыми листочками; прилистники яйцевидные, почти цѣлюкрайніе или при основаніи мелко-зубчатые. Мелкіе ярко-желтые цвѣты расположены продолговатыми головками, величинаго съ горошину. Чашечка 5-тинадрѣзная; вѣнчикъ 5-тилепестный 2 нижнихъ лепестка, сросшіеся между собою, образуютъ туную лодочку. Тычинокъ 10, двубратственныхъ, т. е., сросшихся въ 2 пучка; верхняя тычинка свободна. Плодъ многосѣмянный: мелкіе улиткообразно свернутые бобы—сперва коричневые, потомъ черные. Цвѣтеть съ мая до осени. Растетъ на поляхъ и лугахъ. Разводится, какъ хорошая кормовая трава. (Рис. 168.)

Люцерна шведская. см. Люцерна серповидная (*Medicago falcata* L.).

Лягушечникъ. см. Бѣлокрыльникъ болотный (*Calla palustris* L.).

Лягушечникъ. см. Калужница болотная (*Callitha palustris* L.).

Лягушечникъ. см. Водокрасъ (*Hydrocharis morsus Ranae* L.).

Лягушечникъ. см. Передъ водной (*Polygonum hydropiper* L.).

Лягушечникъ. см. Лютикъ ѣдкій (*Ranunculus acer* L.).

Лягушечникъ болотный, см. Стрѣлолистъ обыкновенный (*Sagittaria sagittifolia* L.).

Лягушечья трава, см. Перецъ водяной (*Polygonum hydropter* L.).

Лягушечья трава, см. Стрѣлолистъ обыкновенный (*Sagittaria sagittifolia* L.).

Лягушникъ, см. Водокрасъ (*Hydrocharis Morsus Ranae* L.).

Лягушникъ, см. Ярутка полевая (*Thlaspi arvense* L.).

Лядвенецъ, см. Лядвенецъ рогатый (*Lotus corniculatus* L.).

Лядей лѣсовой, см. Чина луговая (*Lathyrus pratensis* L.).

Лядуница, см. Смородина красная (*Ribes rubrum* L.).

Лязга } см. Орѣхъ лѣсной (*Corylus Avellana* L.).

Лязговина } см. Орѣхъ лѣсной (*Corylus Avellana* L.).

Лякорыця, см. Солодковый корень (*Glycyrrhiza echinata* L.).

Лялея, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).

Ляпушки, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).

Ластовина, см. Орѣхъ лѣсной (*Corylus Avellana* L.).

Ляховка бѣлая, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).

Лацьке, см. Черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris* L.).

Лящъ } см. Чечевица обыкновенная (*Ervum Lens* L.).

Ляща }

Лящина }

М.

Магагановое бѣлое дерево, см. Анакардъ вестъ-индскій (*Anacardium occidentale* L.).

Магва (*Bassia bueyracea* Roxb.). Илипе. Дерево родомъ изъ Остѣ-Индіи съ благоухающими цвѣтами. Семена при выжиманіи даютъ зеленоватое маслообразное жирное вещество, извѣстное подъ названіемъ «бассіева масла», или «галанъ масла» и употребляющееся въ фабрикаціи мыла и свѣчей.

Магнолія (*Magnolia grandiflora* L.). Лавръ тюльпанный. — Вѣчно-зеленое, достигающее нѣсколькихъ саженъ вышины, дерево, родомъ изъ южной Америки, украшеніе американскихъ лѣсовъ. Въ настоящее время довольно успѣшно разводится въ южной Европѣ, главнымъ образомъ — на Іонійскихъ островахъ. Бѣлые душистые цвѣты достигаютъ въ поперечникѣ 26—32 сантиметровъ; сѣмена крупныя красныя. Древесина употребляется для тонкихъ столярныхъ и токарныхъ издѣлій. Горькая кора нѣкоторыхъ видовъ магноліи, какъ, напр., «обороваго дерева» (*Magnolia glauca* L.), употребляется, какъ противудикорольное средство. Изъ свѣжихъ цвѣтовъ магноліи на Іонійскихъ островахъ готовится душистое масло, которое весьма цѣнится, какъ средство противъ выпаденія волосъ.

Мадлачикъ, см. Сусакъ зонтичный (*Butomus umbellatus* L.).

Маеранъ } см. Душица обыкновенная (*Origanum vul-*

Мажержанка } *gare* L.).

Маиранова трава, см. Душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.).

Маисъ, см. Кукуруза обыкновенная (*Zea Mays* L.).

Маювка, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).

Мајоранъ, см. Душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.).

Гайникъ, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).

Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.). Фармацевтическое название майника: *Unifolium* sin. *Smilacina bifolia* Desf. Бронецъ мягкій (Волог.), Дерябка (Тамб.), Жируха (Волог.), Заячья кровь, Заяча кровь (Мал.), Заячья соль, Баячья соль, Заячій цвѣтъ (Кал.), Заячьи ушки, ушки (Кал., Черн.), Заячьи ягодки, Заяцевы ягоды (Могил.), Зайковы ягодки (Ят.), Заенче зелье (Гродн.), Зимовикъ (Черниг.), Змѣвинъ (Волог.), Змѣвинца (Арх.), Змѣвець (Вят.), Кулина (Гродн.), Кулинка (Черн.), Кутейка (Твер.), Ландынь двулистный, боровой (Моск., Нижегород.), Майникъ (Дв.), Макъ дикій (Ниж.), Мимозель, Мимозелень (Арх.), Мудки (Черн.), Однолистникъ, Перецъ (Гродн.), Перечинца тр., Сольца (Ниж.), Сорока, Сердечная трава (Вят.), Сердечникъ (Гродн.), Рябковые ягоды, Рябчиковы ягоды (Пет.), Соколины ягоды или глазки (Смол.), Червивая (Арх.), Резеда дикая (Тул.), Смородина дикая (Ниж.), Урверъ (Кол.), Лисси (Пет.), Тостокуръ (Ниж.), Волчье лыко. Майникъ двулистный представляетъ изъ себя многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «лилейныхъ» (*Liliaceae* DC.), распространенное по всей Европѣ, въ сѣверной, средней, юго-западной Россіи и въ Сибири, выш. въ нѣсколько вершковъ; корневище ползучее; воздушная часть растенія слегка коротко-пушистая; стебель несетъ два коротко-черешковыхъ, сердцевидныхъ, заостренныхъ листа и верхушечную кисть мелкихъ бѣлыхъ, душистыхъ цвѣтовъ. Околоцвѣтникъ 4-хлестный; листочки его простерты, эллиптической формы; тычинокъ четыре; завязь верхняя, 2-хлѣздная, съ короткимъ, толстымъ столбикомъ, оканчивающимся маленькимъ рыльцемъ. Плодь—красныя ягоды. Цвѣтетъ въ маѣ, въ юнѣ. Растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками. (Рис. 169.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Медицинское употребленіе майника очень ограничено, и онъ извѣстенъ только, какъ народное средство. Въ Архангельской губерніи майникъ употребляютъ только снаружи отъ погтоѣды, въ Архангельской-же и Вологодской губ.—отъ слабости въ ногахъ, въ Петроковской губерніи—отъ ломоты въ глазахъ, въ Гродненской—отъ опухолей и въ Калужской—изъ отвара дѣлаютъ мягчительные клистиры.

Мајоранъ лошадиный, см. Дубровникъ чеснотный (*Teucrium Scordium* L.).

Мајорцы } см. Душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.).
Мајранъ }

Майская трава, см. Грушанка одноцвѣтная (*Pirola uniflora* L.).

Майскій корень, см. Петровъ крестъ (*Lathraea Squamaria* L.).

Макъ, см. Алтей лекарственный (*Althaea officinalis* L.).

Макъ, см. Макъ самосѣйка (*Paraver Rhoeas* L.).

Макъ бѣгунъ } см. Макъ снотворный (*Papaver somniferum* L.).
 Макъ бѣлый }
 Макъ водяной, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).
 Макъ вороній, см. Макъ мексиканскій (*Argemone mexicana* L.).
 Макъ вороній, см. Рогачъ желтый (*Glaucium luteum* Scop.).
 Макъ дикій, см. Алтей лекарственный (*Althaea officinalis* L.).
 Макъ дикій, см. Хатма тюрингенская (*Lavatera thuringica* L.).

Макъ дикій, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).

Макъ дикій, см. Макъ самосѣйка (*Papaver Rhoeas* L.).

Макъ желтый } см. Кувшинка желтая (*Nuphar lu-*

Макъ желтый водяной } *teum* Smith.).

Макъ заячій, см. Горнивецъ весенній (*Adonis vernalis* L.).

Макъ колючій, см. Макъ мексиканскій (*Argemone mexicana* L.).

Макъ колючій вороній, см. Макъ мексиканскій (*Argemone mexicana* L.).

Макъ лѣсной, см. Рогачъ желтый (*Glaucium luteum* Scop.).

Макъ мексиканскій (*Argemone mexicana* L.). Фармацевтическое название: *Cardus Pavus*. Мексиканскій макъ называется бѣлокъ-травя, Бѣльмокъ, Бѣльмокъ цвѣтки, Звѣздочная трава, Звѣздочки, Макъ колючій, Макъ колючій вороній, Макъ вороній, Осотъ слабительный, Соль соколя трава, Щавель кобылій. Растеніе родомъ изъ Востъ-Индіи и Мексики. Разводится въ садахъ. Содержитъ острый желтый сокъ, обладающій наркотическими свойствами.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ настоящее время совсѣмъ оставлено.

Макъ полевой, см. Макъ самосѣйка (*Papaver Rhoeas* L.).

Макъ рогатый, см. Рогачъ желтый (*Glaucium luteum* Scop.).

Макъ садовый, см. Макъ снотворный (*Papaver somniferum* L.).

Макъ самосѣй, см. Макъ снотворный (*Papaver somniferum* L.).

Макъ самосѣйка (*Papaver Rhoeas* L.). Фармацевтическое название: *Rhoeas*, *Papaver erraticum*, s. *rubrum*, s. *silvestre* (Flores.). Видлокъ (южн. Росс.), Жеръ, Макъ, Мачокъ (Малор.), Макъ дикій, Макъ полевой, Мачина (Пск.), Насонъ (Полт.), Пѣтушки или Курочки. Макъ самосѣйка представляетъ изъ себя однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «маковыхъ» (*Papaveraceae* DC.), распространенное по всей Европѣ, въ средней и южной Россіи, выш. 7—14 вершк. Стебель и листья усажены жесткими оттопыренными волосками. Листья глубоко-перисто-раздѣльные, съ продолговатыми крупно-пильчатыми долями. Ярко-красныя цвѣты одиночныя на длинныхъ цвѣтоножкахъ. Чашечка 2-хлстная, опадающая; лепестковъ 4; тычинки многочисленныя, на шиловидныхъ нитяхъ. Рыльце головчатое, сидячее, лучистое. Плодъ—обратно-яйцевидная гладкая коробочка, раскрывающаяся отверстіями близъ лучистаго рыльца. Цвѣтетъ съ апрѣля по июль. Растетъ на поляхъ и между посѣвами. (Табл. XXVI, фиг. 149.)

Макъ снотворный (*Papaver somniferum* L.). Фармацевтическое название *Papaver album*. Макъ, Макъ бѣлый, садовый, Макъ бѣгунъ, Макъ самосѣй, Салатасонная, Слата. Макъ снотворный есть однолѣтнее травянистое сѣвато-зеленое растеніе, выш. 14—21 вершка, изъ семейства «маковыхъ» (*Papaveraceae* DC.), родомъ изъ южной Европы. Стебель и стеблеобъемлющіе спирально-расположенные листья—голые. Листья продолговатые, двояко-зубчатые. Цвѣты крупные, съ 2-хлестной отпадающей чашечкой и 4х-лепестнымъ бѣлымъ или блѣдно-фіолетовымъ вѣнчикомъ съ темнымъ пятномъ при основаніи лепестковъ. Тычинки многочисленныя, съ нитями, наверху расширенными; рыльце головчатое, сидячее, дуцистое; плодъ—крупная шаровидная многосѣмянная коробочка. Цвѣтетъ съ іюня до августа. Воздѣлывается въ огородахъ ради сѣмянъ, изъ которыхъ выжимаютъ масло, а многочисленные сорта съ маховыми цвѣтами часто разводятся въ садахъ. Изъ надрѣзовъ сдѣланныхъ на незрѣлыхъ плодахъ, вытекаетъ бѣлый млечный сокъ, который на воздухѣ сгущается, бурбѣтъ и, засыхая, даетъ опіумъ; въ настоящее время опіумъ, главнымъ образомъ, добывается въ Индіи и въ Египтѣ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ высушеннаго сока, вытекающаго изъ незрѣлыхъ коробочекъ мака (*Papaver somniferum*), который носитъ названіе опія, или опіума, извѣстно съ глубокой древности и до настоящаго времени очень обширно. Опій дѣйствуетъ успокоивающимъ образомъ на нервную систему, онъ уменьшаетъ боли и вызываетъ сонъ. Изъ опія добываются два другія, также употребляемые, снотворныя и болеутоляющія вещества—это морфій и коденнъ. Коденнъ слабѣе по своему дѣйствию, потому дается иногда и дѣтямъ, опій-же и въ особенности морфій принадлежатъ къ сильнымъ ядамъ.

Дѣйствіе морфія, опія и коденна на животныхъ и человѣка тщательно изслѣдовано.

При втираніи опія въ кожу появляется мѣстное пониженіе чувствительности, что указываетъ на то, что опій всасывается черезъ неповрежденную кожу; еще сильнѣе онъ всасывается, если почему-либо кожа лишена своего наружнаго покрова—кожицы. Въ полости рта опій производитъ горькій вкусъ и усиленное отдѣленіе слюны, которое прекращается, какъ только опій всасывается и начинаетъ дѣйствовать черезъ кровь, тогда слизистая оболочка рта становится сухою. Въ желудкѣ опій останавливаетъ процессы броженія и уменьшаетъ чувство голода, при болѣзняхъ желудка онъ уменьшаетъ боль въ желудкѣ и успокоиваетъ тошноту. Кишечный каналъ отъ пріемовъ опія также становится менѣ чувствительнымъ, испражненія происходятъ рѣже, и даже дѣлается запоръ. Большіе пріемы опія очень расслабляютъ стѣнки кишокъ, вызывая какъ-бы паралитическое ихъ состояніе, вслѣдствіе чего появляется поносъ. Большіе пріемы опія приносятъ большую пользу людямъ, страдающимъ запоромъ вслѣдствіе отравленія свинцомъ, при такъ называемой свинцовой коликѣ, при которой больные жалуются на

животъ не избытокъ запоры и боли въ животъ, причемъ животъ у яда въначалѣ и весь кишечный каналъ находится въ состояніи судорожнаго сжатія. Подъ вліяніемъ оня дѣятельность сердца сначала повышается, пульсъ становится чаще, затѣмъ замедляется; отъ большихъ примовъ оня лицо краснѣетъ, зрачки суживаются, глаза становятся красными, появляется головокруженіе и вообще признаки прилива крови къ головѣ. Дыханіе тоже сначала ускоряется, затѣмъ отъ большихъ примовъ замедляется. Вліяніе оня и его препаратовъ всего сильнѣе на нервную систему. Послѣ приема оня въначалѣ замѣчается небольшое возвышеніе мозговой дѣятельности: живость воображенія, быстрое теченіе мыслей и бодрость, соединенная съ чувствомъ довольства и покоя; вслѣдъ затѣмъ является склонность ко сну, который часто сопровождается сновидѣніями. При сильной степени дѣйствія является глубокая спячка: человекъ лежитъ неподвижно съ полуоткрытыми глазами, опущенной нижней челюстью и суженными зрачками.

Различаютъ два вида отравленія онемъ и его препаратами, морфіемъ въ особенності. — острую форму и хроническую.

Чаще бываетъ острая форма. Явленія отравленія начинаются черезъ $\frac{1}{4}$ или $\frac{1}{2}$ часа послѣ введенія яда. Больной замѣчаетъ: тяжесть головы, головокруженіе, повышенную чувствительность органовъ чувствъ. Малѣйшій шумъ заставляетъ его вздрагивать, свѣтъ дѣлается неприятнымъ для глазъ. Отдѣленіе мочи задерживается, на кожѣ появляется сыпь. По временамъ больной впадаетъ въ спячку, причемъ дыханіе становится весьма медленнымъ. Зрачки суживаются, конечности холодѣютъ, пульсъ становится малымъ, едва замѣтнымъ, и въ этомъ такъ называемомъ коматозномъ состояніи больной умираетъ. У дѣтей и у очень нервныхъ людей появляются судороги. Смерть наступаетъ черезъ 6—18 часовъ. Если же удастся вывести часть яда изъ организма, больной спокойно засыпаетъ и просыпается только съ головною болью; иногда остается нѣкоторое время зудъ въ кожѣ, затрудненное мочеиспусканіе и запоръ.

До прибытія врача слѣдуетъ постараться самимъ помочь больному. Для этого нужно поставить ему горчишникъ на область желудка, растирать кожу щетками и обливать голову холодною водою. Для того, чтобы удалить часть находящагося въ желудкѣ и кишкахъ яда, даютъ размѣнанный въ водѣ животный уголь. Въ Англіи не позволяютъ больному засыпать, для чего его водятъ въ теченіе многихъ часовъ, давая маленькій отдыхъ и вливая ему въ ротъ крѣпкій чай или черный кофе, но кожѣ дѣлаютъ пошлепыванія мокрыми полотенцами. Для пробужденія больного отъ сна ему дѣлаютъ холодныя выпрыскиванія въ носъ. Спиртныхъ напитковъ и кислотъ не даютъ. Если наступило коматозное состояніе, дѣлаютъ искусственное дыханіе и очень сильныя раздраженія кожи горчишниками и растираніями щетками.

Хроническое отравленіе чаще встрѣчается на Востокѣ; въ Европѣ не рѣдки хроническія отравленія морфіемъ, именно подкожными впрыскиваніями морфія. Человекъ, злоупотребляющаго онемъ

или морфий, узнать не трудно. Тѣло худое, лицо желтое, худое, шальные стеклянные глаза, шаткая походка и согнутая спина; аппетитъ плохъ, испражненія задержаны, доходитъ до одного раза въ недѣлю. Дѣятельность нервной системы ослаблена, полный упадокъ нравственныхъ силъ, жалобы на частыя головныя боли, невралгіи. Рѣдко такіе несчастные люди доживаютъ до 40 лѣтъ. Ихъ бодрость духа восстанавливается только въ моментъ дѣйствія яда; тогда они бодрѣе, веселѣе, энергичны, но, лишь только весь ядъ выдѣлится изъ тѣла, они впадаютъ въ свое апатичное состояніе, изъ котораго ницуть выхода новыми приѣмами опія или всприскиваніемъ морфія. Привычка ихъ къ лекарству дѣлается настолько велика, что они переносятъ такіе приѣмы, которые-бы сразу могли убить здороваго человѣка. Вредъ отъ хроническаго отравленія этими ядами громаденъ. Еще тѣмъ онъ мучителенъ, что отъ опія, а въ особенности отъ морфія, очень трудно отвыкнуть. Такихъ больныхъ приходится лечить очень долго, замѣнять имъ подкожныя всприскиванія морфія какимъ-либо другимъ лекарствомъ; за послѣднее время предпочтено вирыскиваніе кокаиномъ, который самъ по себѣ ядовитъ. Пробовали замѣнить всприскиваніе морфія всприскиваніемъ воды, но безуспѣшно. Привычка къ этому средству иногда бываетъ ужасна. Больные только и живутъ что мыслью о всприскиваніи; въ день они себѣ дѣлаютъ нѣсколько всприскиваній до того, что все ихъ тѣло представляется исколотымъ, и на тѣлѣ появляются нарывы на мѣстѣ уколовъ; эти нарывы долго не заживаютъ, послѣ нихъ дѣлаются рубцы на кожѣ, кожа стягивается, стягиваетъ за собою и суставы, которые теряютъ свою подвижность, общее питаніе организма нарушается, люди очень быстро старѣютъ и умираютъ въ молодыхъ годахъ отъ чахотки легкихъ или какого-либо другого заболѣванія, находящагося въ связи съ общимъ упадкомъ силъ.

Но, какъ вредно злоупотребленіе опіемъ и его препаратами, такъ-же полезны они, если ихъ примѣнять осторожно въ небольшихъ приѣмахъ и всегда подъ наблюденіемъ врача. Всѣ усыпляющія наркотическія средства принадлежатъ къ сильнымъ ядамъ, дѣйствующимъ на нервную систему. Въ особенности сильно эти яды дѣйствуютъ на старыхъ людей и на дѣтей. У нихъ самые малые приѣмы могутъ вызвать спячку и судороги и даже смертельный исходъ, потому-то эти средства, драгоцѣнные въ рукахъ врачей, не должны быть употребляемы несвѣдущими людьми.

Опій добывается изъ мака, произрастающаго въ жаркихъ странахъ: въ Египтѣ, Персіи и Индіи. Сѣмена маковыхъ головокъ, цвѣты и листья нашего мака обладаютъ тѣми-же болеутоляющими свойствами, но только дѣйствуютъ гораздо слабѣе, поэтому могутъ быть употребляемы и въ домашнемъ обиходѣ и имѣютъ обширное примѣненіе въ народной медицинѣ.

Крестьяне выжимаютъ сокъ изъ маковыхъ незрѣлыхъ головокъ, который по своему составу близко подходитъ къ добываемому фабричнымъ путемъ опію, и натираютъ имъ воспаленныя отъ ужаленія наѣкомыхъ части тѣла. Чайную ложку этого сока

смѣшиваютъ съ чайной отварной воды для глазной примочки. Примочка эта дѣйствуетъ очень хорошо, она успокаиваетъ боли въ глазахъ, чувство боли и зуда въ вѣкахъ. Свѣжія маковки, толченныя вмѣстѣ съ листьями, употребляются для припарокъ при ломотѣ. Цвѣты мака, политые горячей водою или молокомъ или варенные съ медомъ или сахаромъ, употребляются отъ безсонницы, простуды, сухого кашля, колики въ животѣ и отъ поноса; молочный отваръ цвѣтовъ или наливка принимается черезъ 2 часа по столовой ложкѣ, сиропъ—по чайной ложкѣ. Маковое сѣмя не имѣетъ снотворнаго дѣйствія, оно служитъ для выдѣлки масла. Маковое масло по своему вкусу гораздо пріятнѣе льняного и коноплянаго и потому употребляется въ пищу вмѣсто другихъ сортовъ постнаго масла; также оно служитъ для приготовления нѣжныхъ мазей. Художники употребляютъ это масло для разведенія красокъ; его берутъ также для выдѣлки хорошихъ сортовъ мыла. Маковое масло крестьянки даютъ внутрь отъ глистовъ и отъ кори, если она мало высыпаетъ. Отъ кори даютъ чистое масло столовыми ложками, отъ глистовъ маковое масло смѣшиваютъ поровну съ луковымъ и съ клюквеннымъ сокомъ, подслащаютъ смѣсь медомъ и даютъ по столовой ложкѣ нѣсколько разъ. Остающіяся выжимки послѣ выдѣлки масла идутъ на кормъ домашнимъ птицамъ.

Изъ маковаго сѣмени, которое по своему вкусу и составу напоминаетъ немного миндальное, готовятъ эмульсію, или маковое молоко, которое служитъ также для успокоенія боли при мочеиспусканіи, для уменьшенія приступовъ кашля и боли въ животѣ. Приготавливается маковое молоко такъ-же, какъ и миндальное: на фунтъ воды берется 2 столовыхъ ложки сѣмени; за нѣмнѣишемъ сѣмени эмульсію дѣлаютъ изъ маковаго масла, смѣшивая его съ гуммиарабикомъ: на 1 фунтъ воды берется отъ 2-хъ до 4-хъ столовыхъ ложекъ масла. Отваръ изъ маковыхъ головокъ употребляется для мягчительныхъ клистировъ при боляхъ въ животѣ; для отвара изъ маковыхъ головокъ ихъ берется 1 столовая ложка, заливается 1 фунтомъ воды и кипятится, пока не останется стаканъ. Крестьянки часто злоупотребляютъ маковымъ головкамъ, отваръ ихъ въ молоко онѣ даютъ дѣтямъ отъ безпокойства. Такое насильственное усыпленіе вредно отзывается на дѣтяхъ: они становятся блѣдными, вялыми, страдаютъ запорами, плохо развиваются физически и умственно, даже могутъ остаться слабоумными на всю жизнь.

Въ гомеопатіи опій употребляется такъ-же часто, какъ и въ аллопатіи. Въ особенности его даютъ при нервныхъ страданіяхъ, головокруженіяхъ, воспаленіи мозга, апоплексіи, судорогахъ и приступахъ остраго помѣшательства, при боляхъ въ груди, въ животѣ, при разстройствахъ отравленія кишечника, отъ женскихъ болѣзней и, кромѣ того, отъ перемежающейся лихорадки. Даютъ 1—2 капли 1, 2, 3, 6 разведенія 1—2 раза въ день, и учащаютъ приемы, смотря по обстоятельствамъ.

Въ ветеринарной медицинѣ опій дается вѣсь животнымъ, главнымъ образомъ, отъ перваго разстройства, такого отъ поносовъ, въ особенности овцамъ и козамъ. Снаружи отваромъ

опийныхъ головокъ обмываютъ раны, зудящія и болящія мѣста. Лошадямъ даютъ отъ 1 скрупула до 1 драхмы (1,25—5,5 грм.) опія въ видѣ жидкой опийной настойки, овцамъ—отъ 15 до 30 гранъ (1.0—2.0 грм.), свиньямъ отъ 4 до 8 гр. (0.4—0.8 грм.), собакамъ—отъ 1 до 8 гранъ (0.05—0.5 грм.) отъ 3 до 4 разъ въ день. При поносахъ послѣ слабительнаго животнымъ дѣлаютъ опійные клистиры, на которые кладется отъ 8 до 15 гранъ (0.5—1.0 грм.) опія. Въ мазную мазь кладутъ сухой экстрактъ опія: на 1 унцъ (30 грм.) вазелина полагается 20 гранъ (1.8 грм.) экстракта опія.

Гомеопаты ветеринары даютъ опій при общенствѣ лошадей, при коликахъ въ животѣ, сопровождающихся запоромъ, при запорахъ и судорогахъ у новорожденныхъ, кобыламъ при молочной лихорадкѣ и тяжелыхъ родахъ и лошадямъ отъ переутомленія послѣ продолжительнаго и тяжелаго бѣга; даютъ отъ 3 до 6-го разведенія.

Макъ собачій. см. Бѣлена черная (*Hyosciamus niger* L.).

Макарша

Макаршино коренье } см. Горлецъ, раковыя шейки (*Polygonum bistorta* L.).

Макаршникъ

Маклика. см. Мокрица (*Stellaria media* Smith.).

Маковейникъ, см. Алтей лекарственный (*Althaea officinalis* L.).

Маковки водяныя, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).

Маковникъ, см. Подмаренникъ желтый (*Gallium verum* L.).

Маковникъ, см. Колокольчикъ жестковолосистый (*Campanula cervicaria* L.).

Макуша

Макушка } см. Клеверъ полевой (*Trifolium arvense* L.).

Макушка

Макушникъ } см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Малква желтая, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq.).

Малина, см. Малина обыкновенная (*Rubus idaeus* L.).

Малина галочья, см. Черёда трехраздѣльная (*Bidens tripartita* L.).

Малина глухая

Малина голубая } см. Ежевика (*Rubus caesius* L.).

Малина дикая, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).

Малина дикая, см. Медунца (*Spiraea ulmaria* L.).

Малина земляная, см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).

Малина калмыцкая, см. Хвойникъ обыкновенный (*Ephedra vulgaris* Rich.).

Малина каменная, см. Ростявика (*Rubus saxatilis* L.).

Малина крапивная, см. Новелка клеверная (*Cuscuta Tourm.*).

Малина красная, см. Малина обыкновенная (*Rubus idaeus* L.).

Малина обыкновенная (*Rubus idaeus* L.). Малина. Малина красная, Малинникъ, Малинина, Малинянка, Малинянъ, Медвѣжьи ягоды (Приазов. край). Обыкновенная малина представляетъ кустарникъ изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), болѣе или менѣе усаженный шипами, распространен-

ный по всей Европѣ и въ большей части Россіи, съ двумя-тремя плодородными стеблями (образующіеся ежегодно листоносные побѣги приносятъ плоды только на второй годъ, послѣ чего они отмираютъ). Листья непарно-перистые, снизу бѣловаточные; нижніе—о 5—7-ми листочкахъ, верхніе—тройчатые. Бѣлые цвѣты собраны кистями на концахъ короткихъ вѣтвей; чашечка 5-тираздѣльная, съ ланцетными, заостренными, при плодахъ отвороченными долями; вѣничикъ 5-тилепестный; лепестки обратно-яйцевидные, вверху острые, короче чашелистиковъ. Тычинокъ много, прикрѣпленныхъ вмѣстѣ съ лепестками къ краю цвѣтоложа. Пестикъ состоитъ изъ многихъ плодоложниковъ. Плодъ—сложная костянка краснаго цвѣта или у нѣкоторыхъ вѣдываемыхъ сортовъ—желтаго. По созрѣваніи плоды легко отдѣляются отъ конического цвѣтоложа. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками. Ягоды употребляются въ пищу; на зиму изъ нихъ варятъ варенье, сиропы и наливки. (Табл. XXVIII, фиг. 153 и 154.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Малина издавна извѣстна, какъ потогонное средство. Цвѣты малины сушатъ на зиму, и отваръ ихъ даютъ ввѣдь чая лихорадочнымъ больнымъ отъ легкой простуды. Малиновый чай—очень пріятный кислотоватый напитокъ. Приготовляемый изъ свѣжихъ ягодъ сиропъ идетъ въ большомъ количествѣ для исправленія вкуса многихъ микстуръ. Также въ аптекахъ имѣется малиновая вода, она очень пріятна на вкусъ и служитъ для лихорадочныхъ больныхъ хорошимъ освежающимъ питьемъ. Изъ ягодъ малины въ общежитіи приготовляютъ квасъ и укусъ, которые не только пріятны на вкусъ, но также и полезны для цынготныхъ и лихорадочныхъ больныхъ. Цвѣты малины отвариваютъ въ водѣ и отваромъ ихъ обмываютъ лицо отъ угреватости и отъ воспаленія глазъ. Отваромъ листьевъ обыкновенной малины полощутъ горло отъ боли при глотаніи. Отваръ листьевъ малиника и ежевики въ потаніе окрашиваетъ волосы въ черный цвѣтъ. Малина полевая, см. Жминда лозная (*Blitum virgatum* L.). Малина степная, см. Хвойникъ обыкновенный (*Ephedra vulgaris* Rich.).

Малина сѣверная, см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).

Маливина } см. Малина обыкновенная (*Rubus idaeus* L.).

Малининка } см. Малина обыкновенная (*Rubus idaeus* L.).

Малинникъ желтый, см. Морюшка (*Rubus chamaemorus* L.).

Малинникъ мокрый, см. Медунца (*Spiraea ulmaria* L.).

Малинига, см. Малина обыкновенная (*Rubus idaeus* L.).

Малиновый цвѣтъ, см. Резеда (*Reseda odorata* L.).

Малиновая травка, см. Млечникъ морской (*Glaux maritima* L.).

Маловенецъ, см. Ярутка полевая (*Thlaspi arvense* L.).

Малокитникъ, см. Лоза (*Salix viminalis* L.).

Мальва, см. Просвирникъ (*Malva* L.).

Мама, см. Мать и мачиха (*Fussilago Farfara* L.).

Мамура (*Rubus arcticus* L.). Жаровиха (Арх.), Княженника (Перм.),

Тыняженникъ (Яросл. Вят.), Княженничникъ (Сл. Церк.). Княженница, Тыняжница (Сиб.), Княжница красная, Княжика, Княжанка (Нов.), Княжница (Арх., Волог.), Куманика (Олон.), Куманичникъ (Арх.), Малина сѣверная, Малина земляная (Арх.) и даже просто Земляника (Олон.), Мамуровка, Морошка красная (Костр.), Лань-морошка (Новг.), Поленика (Вол. Яр., Тв., Вят.), Полянника, Поляница, Палетига, Полуденица (Вол.), Хохляница (Вол.), Хохлянка, Хохлуша. Мамура представляетъ изъ себя извѣстное на Руси травянистое многолѣтнее растеніе изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), распространенное на сѣверѣ Россіи и въ Сибири. Вѣтвистое ползучее корневище выпускаетъ тонкіе прямостоящіе стебли, несущіе тройчатые, рѣже пятерные, листья и одиночный (рѣже 2) верхушечный розовый цвѣтокъ. Чашечка пятираздѣльная; вѣтчикъ пятилепестный. Тычинки многочисленныя, прикрѣпленныя къ краямъ вышуклаго цвѣтоложа. Пестикъ состоитъ изъ многихъ плодolistиковъ. Плоды напоминаютъ по виду ягоды малины, темно-пурпуровые, ароматные, вкусные, употребляются въ пищу сырые и вареные въ сахарѣ. Произрастаетъ на влажныхъ, тѣнистыхъ мѣстахъ, на опушкѣ лѣсовъ и между кустарниками. Листья употребляютъ, какъ чай.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Плоды мамуры составляютъ хорошее противоспазматическое средство.

Мамуровка, см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).

Мандаринъ, одинъ изъ видовъ апельсина (*Citrus Aurantium* Risso), описаніе см. выше: апельсинъ (*Citrus Aurantium* Risso), отличается отъ послѣдняго болѣе мелкими и душистыми плодами.

Мандрагора (*Atropa Mandragora* L.). Мандрагора трава, т. е., лѣсная ягода, Зелѣ сонное, Покрынъ трава, Покрынъ полевой, Покрынъ, Адамова голова, Мертвая голова (Даль). Растеніе, произрастающее въ южной Европѣ, главнымъ образомъ — въ Греціи, родственный съ белладонной, но по дѣйствию еще болѣе ядовитое. (См. белладонна, *Atropa Belladonna* L.)

Мандрагора, см. Снеголовникъ равнинный (*Eryngium campestre* L.).

Манжетка, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* Mill.).

Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.). Аксютинна трава (Олон.), Барангикъ (Ярослав.), Богова слезка (Костр.), Гарникъ (Вѣлорусс.), Горлянка (Олон.), Грудная трава, Грудница (Ниж. и Кал.), Запольникъ (Даль), Звѣздочная трава (Костр.), Кольчужникъ (Вят.), Копытникъ (Волог.), Ланка гусиная (во мн. мѣст.), Лапушникъ малый (Кален.), Ланьшукъ, Машки (Вятск.), Мошки (Даль), Межнерстница, Тринерстница (Могил.), Недужная (Ниж.), Поползуха (Енис.), Приворотъ (Стар. рук.), Приворотень (Под., Ципр.), Родимая (Вят.), Росичка (Вѣл. Рос.), Росникъ обыкновенный (Собол.), Росница (Сл. Церков.), Росянка (Волог., Двиг.), Сердечная (Олон.), Сорокоприточная, Конито львиное (Даль), Лапа львова или львиная (Кондр.), Лапа медвѣжья (Даль), Манжетка (Двиг.), Борка (Олон.), Бухарка лѣсная,

Гающее зелье (Гродн.), Заячья кануста (Петр.), Листуха (Новг.), Подорышникъ (Могил.), Рута (Могил.), Суховая (Олон.), Ударникъ (Черн.), Лѣсной хрѣнъ, Шапошникъ (Волог.), Свиные языки (Костр.), Лапышка, Лопай, Лопухъ (Олон.). Манжетка представляетъ многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «розовѣтныхъ» Rosaceae (Hook et Benth.), распространенное во всей Европѣ и во всей Россіи. вып. 7—14 вершковъ, пушисто-мохнатое, рѣже голое; главный стебель укороченный, съ прикорневыми длинно-черешковыми, крупными, ночковидными листьями, съ 7—9 почти полукруглыми пильчатыми лопастями; изъ угловъ листьевъ выходятъ лежаціе или приподнимающіеся цвѣтущіе стебли, съ болѣе мелкими листьями, изъ которыхъ верхніе—почти сидячіе. Прилистники сросшіеся, образующе колокольчатое, по краю зубчатое или надрѣзанное, влагалище. Мелкіе зеленые обоеполовые цвѣты собраны щитковидною метелкою. Цвѣтоложъ колокольчатое, у зѣва суженное, при плодахъ твердѣющее. Чашечка 4-храздѣльная, съ 4-хлистнымъ подчашиемъ изъ меньшихъ листочковъ. Лепестковъ нѣтъ. Тычинокъ 4, прикрѣпленныхъ къ утолщенному, кольцообразному краю цвѣтоложа. Пестикъ состоитъ изъ одного плодolistика, содержащаго одно, приподнимающееся изъ основанія завязи, яичко и несущаго боковой питевидный столбикъ съ головчатымъ рыльцемъ. Плодъ—сѣмянка, съ перепончатымъ околоплодникомъ, заключенная въ цвѣтоложѣ. Цвѣтетъ съ мая до сентября. Хорошее кормовое растеніе, увеличивающее отдѣленіе и качество молока. Растетъ на лугахъ, холмахъ и въ лѣсахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Врачами въ настоящее время растеніе это совсѣмъ не употребляется. Прежде манжетку обыкновенной приписывали чудесныя силы и употребляли въ алхиміи. Въ Швейцаріи и теперь женщины моютъ себѣ лица листьями, покрытыми росой, для уничтоженія прыщей и возвращенія увядшей красоты. Въ Олонецкой губерніи отваръ растенія употребляется отъ боли сердца, въ Архангельской—отъ сыпи у дѣтей, въ Воронежской—отъ худосочія.

Манюкъ (*Jatropha Manihot* L.). Растеніе, произрастающее въ тропической Америкѣ; шниковатые, крупныя (высомъ до 30 ф.) корни его даютъ муку (манюкъ, кассава), представляющее весьма питательное вещество.

Манна, см. Манникъ обыкновенный (*Glyceria fluitans* R. Br.).

Манна луговая, см. Овсяница высокая (*Festuca elatior* L.).

Манна овечья, см. Овсяница овечья (*Festuca ovina* L.).

Манная трава, см. Манникъ обыкновенный (*Glyceria fluitans* R. Br.).

Манная трава, см. Бухарникъ мягкій (*Holcus mollis* L.).

Манная трава, см. Овсяница высокая (*Festuca elatior* L.).

Манникъ, см. Манникъ обыкновенный (*Glyceria fluitans* R. Br.).

Манникъ, см. Овсяница овечья (*Festuca ovina* L.).

Манникъ, см. Бухарникъ мягкій (*Holcus mollis* L.).

Манникъ высокій (*Glyceria spectabilis* M. et K.). Лещинякъ, Луговой овесъ, Плюшникъ, Плюха луговая. Манникъ высокій есть многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Корневище ползучее; стебель трубчатый, высокій отъ (30—104 вершковъ), толщиною въ палецъ. Листья плоскіе, съ цилиндрическими влагалищами. Метелка прямостоящая, съ вѣтвями, раскинутыми во всѣ стороны. Колоски о 5—9 цвѣткахъ, снабженныхъ каждый 2-мя пленками: наружной и внутренней; изъ нихъ первая—тупая, съ 7-ю выдающимися жилками. Плодъ—зерновка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на болотахъ, по берегамъ рѣкъ и прудовъ.

Манникъ обыкновенный (*Glyceria fluitans* R. Br.). Фармацевтическое названіе обыкновеннаго манника: Манна, Gramen Mannae. Занозка пловучая, Манная трава, Манна. Пюнька. Шваденъ или утиная трава. Обыкновенный манникъ представляетъ изъ себя многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и обыкновенное въ Россіи. Корневище манника—ползучее; листья широко-линейные, часто лежатъ на поверхности воды. Молодые листья сложены вдоль средней жилки, влагалища листьевъ сжаты съ боковъ. Вѣтви длинной однобочной метелки до и послѣ цвѣтенія прижаты къ главной оси, но во время цвѣтенія отходятъ отъ нея. Колоски цилиндрическіе и длинные, содержащіе 7—11 цвѣтковъ и обыкновенно прижатые къ вѣтвямъ. Колосковые чешуи, или створки, короче цвѣточныхъ пленокъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ въ стоячихъ и медленно текущихъ водахъ, на болотахъ и сырыхъ лугахъ. Плоды даютъ крупу, употребляемую въ пищу видѣ каши и извѣстную въ зап., падмю краѣ подъ названіемъ «манной крупы» (не нужно смѣшивать ее съ пищечною манною крупой, которая гораздо мельче и желтѣе). (Рис. 171.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Манна принадлежитъ къ числу обволакивающихъ и легкихъ слабительныхъ средствъ. Она содержитъ въ себѣ сахаристое вещество—манный сахаръ, или манникъ, и какое-то особое вещество, обладающее слабительнымъ дѣйствіемъ. Врачи иногда назначаютъ манный сиропъ при болязняхъ печени, катаррѣ кишекъ, сопровождающемся запоромъ, также при катаррѣ дыхательныхъ и мочевыхъ путей. Дѣтямъ манный сиропъ даютъ чаще, чѣмъ взрослымъ. Манный сиропъ входитъ въ составъ вѣнской слабительной настойки.

Манный кустарникъ (*Albagi mangorum* Tourn.). Кустарникъ, растущій въ Персіи, Сиріи, Аравіи и Египтѣ и отдѣляющій въ жаркое время года сокъ, похожій на медъ, тверднущій на воздухѣ, принимающій при этомъ красный или коричневый цвѣтъ и въ этомъ видѣ извѣстный подъ именемъ персидской манны, альбаговой манны, дикаго меда Іоанна Крестителя, а въ аптекахъ—*Manna persica*, s. *Albagina*. Эта манна не имѣетъ никакого запаха, вкуса сладкаго и на Ливанѣ употребляется въ пищу. Нѣкоторые принимаютъ ее за библейскую манну.

Мантна, см. Чернокорень обыкновенный (*Cynoglossum officinale* L.).

Манъ-цвѣтъ, см. Медунца (*Spiraea ulmaria* L.).

Маосорникъ, см. Горницвѣтъ весенній (*Adonis vernalis* L.).

Маранай, см. Подмаренникъ мягкій (*Galium Mollugo* L.).

Марашка, см. Поповникъ запахучій (*Matricaria inodora* L.).

Маргаритка, см. Маргаритка многолѣтняя (*Bellis perennis* L.).

Маргаритка многолѣтняя (*Bellis perennis* L.). Бархатный цвѣтъ, Бельцы, Бѣльцы, Маргаритка, Марточка, Скороспѣлые цвѣты, Стократъ-трава, Стократка (Бѣлор.), Стократки, Стократки, Стократъ (Малор.). Стоцвѣтъ. Многолѣтняя маргаритка есть многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное почти во всей Европѣ и въ западной Россіи, выш. 1—7 вершковъ. Ползучее корневище образуетъ дерновинки. Прикорневые обратно-йцевидные, по краямъ слегка городчатые, листья собраны розеткой. Безлиственный цвѣточный стебель несетъ на верхушкѣ одиночную корзинку, съ полушаровидной оберткой изъ 2-хъ рядовъ травянистыхъ листочковъ; цвѣтоложе голое, коническое. Женскіе язычковые краевые цвѣты—бѣлые или розовые, узкіе. Трубочатые цвѣты срединные, обоюлобые, золотисто-желтые. Тычинокъ 5; завязь нижняя, одногнѣздная, односѣмянная, съ нитевиднымъ столбикомъ. Плодъ—сплюснутый продолговато-обратно-йцевидный сѣмянка безъ хохолка. Цвѣтетъ весною и лѣтомъ. Растетъ на лугахъ и въ рощахъ. Разводится въ садахъ съ махровыми цвѣтами, у которыхъ трубчатые цвѣты превращены въ язычковые. (Табл. XXVII, фиг. 152.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Маргаритка употребляется въ пародѣ отъ чахотки, отъ сухотки спинного мозга, отъ запоровъ и затрудненій при мочеиспусканіи. Толченую траву прикладываютъ для очищенія грязныхъ ранъ. Отваромъ травы обмываютъ и примачиваютъ опухшія твердыя железы на шеѣ.

Весною траву ѣдятъ вмѣсто салата. Для приготовленія отвара берутъ горсть свѣжей вымытой травы съ цвѣтами, заливаютъ, стаканомъ кипятка или сыворотки, выжимаютъ, процеживаютъ и пьютъ по 2—4 столовыхъ ложки полученнаго сока по нѣсколько разъ въ день. Маленькихъ дѣтей отъ такого отвара слабятъ. Такой-же отваръ крестьяне пьютъ по утрамъ натошакъ отъ чувства слабости и разбитости послѣ тяжелой работы.

Марейникъ, см. Подмаренникъ (*Galium* L.).

Маремуха } см. Мухоморъ (*Agaricus muscarius* L.).
Маремухъ }

Марена, см. Подмаренникъ мягкій (*Galium mollugo* L.).

Марена, см. Дѣеникъ (*Pyrethrum Parthenium* Smith.).

Марена, см. Марена красильная (*Rubia tinctorum* L.).

Марена благовонная, см. Яминникъ душистый (*Asperula odorata* L.).

Марена желтая, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).

Марена красильная (*Rubia tinctorum* L.). Алizarинъ. Зеленица, Брускъ (Сл. Церк.), Крапъ, Корень красильный, Марена

красильная, настоящая, Марпиа (Малор.), Марзана. Марена есть многолѣтняя трава изъ семейства «мареновыхъ» (Rubiaceae Juss.), распространенная въ южной Европѣ, у насъ встрѣчающаяся на югѣ Россіи, особенно въ Закавказьѣ, съ разогнутыми вѣтвями, выпш. $4\frac{1}{2}$ — $22\frac{1}{2}$ вершковъ. Стебель, края и нижняя поверхность листьевъ вдоль средней жилки покрыты загнутыми назадъ колючими щетинками, которыми растение цѣпится за посторонніе предметы. Листья ланцетовидные, мутовчатые, блестящіе, по 4—6 въ мутовкѣ (въ кольцѣ), изъ которыхъ только 2 супротивныхъ, несущихъ въ пазухахъ почки или побѣги, считаются настоящими листьями, тогда какъ остальные разсматриваются, какъ прилистники. Зеленовато-желтые мелкіе цвѣты расположены пазушными полусюитками: чашечка незамѣтная; вѣнчикъ колесовидный 5-тираздѣльный, доли его съ небольшимъ остроконечіемъ; тычинокъ 5, очередныхъ съ долями вѣнчика, съ линейно-продолговатыми пыльниками; завязь нижняя, двухгнѣздная, съ одиночными приподнимающимися въ гнѣздахъ яичками; столбикъ двухраздѣльный, съ головчатымъ рыльцемъ; плодъ—сочныя черныя ягоды. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Разводится въ Туркестанѣ и Закавказьѣ для добыванія изъ корней и корневищъ красной краски, извѣстной подъ названіемъ «крапа». Разводится какъ черезъ разсаживаніе корней, такъ и отъ сѣмянъ. Корни красильной марены для употребленія выкапываются осенью, очищаются отъ наружной коры, подвергаются высушиванію, послѣ чего ихъ толкутъ или мелютъ и закупаживаютъ въ бочки. (Таб. XXIII, фиг. 126.)

Трава марены, скошенная въ сентябрѣ, доставляетъ хорошій фуражъ для скота и хотя сообщать молоку коровъ красноватый цвѣтъ, но нисколько не влияетъ ни на составъ его, ни на вкусъ. Высушенные листья и стебли употребляются для полировки металловъ и придаютъ особенный блескъ оловянной посудѣ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ настоящее время марена врачами не прописывается, но прежде ее давали, какъ мочегонное средство.

Въ народѣ марена употребляется отъ англійской болѣзни, отъ болѣзни костей, также отъ запоровъ, желтухи, отъ худосочія, блѣдной, немочи и ревматическихъ болей въ поясницѣ и въ суставахъ. Для отвара берется 1 унція марены (30 грм.), заливается 1 фунтомъ воды и кипятится до тѣхъ поръ, пока не останется 16 столовыхъ ложекъ; отваръ процеживаютъ, кладутъ въ него сахару или меду для вкуса; дѣтямъ даютъ по столовой ложкѣ 2—3 раза въ день; если ребенокъ кормится грудью, то отваръ даютъ кормилицѣ въ двойномъ или тройномъ количествѣ по нѣсколько разъ въ день. Отъ англійской болѣзни рекомендуется слѣдующее домашнее лекарство: осенью собираютъ корни марены, высушиваютъ ихъ, толкутъ и смѣшиваютъ съ одинаковымъ количествомъ травы вахты (см. стр. 212) по 1 драхмѣ (4.0 грм.), мелко рубятъ, заливаютъ

полубутылкою воды и варять, пока не укипитъ половина жидкости; къ процѣженному отвару прибавляютъ $\frac{1}{2}$ драмы соды (2.0 грм.), подслащаютъ медомъ и даютъ кормилицѣ по 2 столовыхъ ложки каждыя 2 часа. Если ребенокъ отнять отъ груди, то даютъ ему этотъ-же отваръ, только въ меньшемъ количествѣ по чайной ложкѣ два—три раза въ день, въ теченіе довольно продолжительнаго времени.

Марена медовая, см. Подмаренникъ желтый (*Gallium verum* L.).
Марена настоящая, см. Марена красильная (*Rubia tinctorum* L.).

Марена пахучая, см. Яминникъ душистый (*Asperula odorata* L.).

Марена русская, см. Подмаренникъ съверный (*Gallium boreale* L.).

Мареникъ, см. Медунца (*Spiraea ulmaria* L.).

Маренка пахучая, см. Яминникъ душистый (*Asperula odorata* L.).

Мареникъ, см. Подмаренникъ мареновидный (*Gallium rubroides* L.).

Мареникъ, см. Подмаренникъ (*Gallium* L.).

Марей, см. Синеголовникъ равнинный (*Eryngium campestre* L.).

Марзана, см. Марена красильная (*Rubia tinctorum* L.).

Марзанка, см. Яминникъ душистый (*Asperula odorata* L.).

Марина, см. Марена красильная (*Rubia tinctorum* L.).

Марина, см. Дѣвникъ (*Pyrethrum Parthenium* Smith.).

Марина, см. Воробейникъ полевой (*Lithospermum arvense* L.).

Маринюшка, см. Шлемникъ обыкновенный (*Scutellaria galericulata* L.).

Маріанъ, см. Валериана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Марія, см. Купырь лесной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.).

Марія, см. Синеголовникъ плосколистный (*Eringium planum* L.).

Марія, см. Аютины глазки (*Viola tricolor* L.).

Марія желтая, см. Василистникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).

Марковей, см. Сиякъ обыкновенный (*Echium vulgare* L.).

Маргилова трава, см. Синюха обыкновенная (*Polemonium coeruleum* L.).

Марточка, см. Маргаритка многорѣзная (*Bellis perennis* L.).

Маруна, см. Подмаренникъ мягкій (*Gallium Mollugo* L.).

Маруна, см. Дѣвникъ (*Pyrethrum Parthenium* Smith.).

Маруна полевая, см. Поповникъ обыкновенный (*Crysanthemum Leucanthemum* L.).

Марынка, см. Душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.).

Маръ, см. Марь обыкновенная (*Chenopodium album* Moqu.).

Маръ, см. Кудрявецъ (*Chenopodium Botrys* L.).

Маръ, см. Марь вѣнчая (*Chenopodium vulvaria* L.).

Марь благовонная (*Chenopodium ambrosioides* L.). Фармацевтическое названіе: *Chenopodium ambrosiacum* s. *Botrys mexicana*, *Thea mexicana* (Herba), *Atriplex odorata*, *americana*, *ambrosiaca*. Лебеда мексиканская, Кудрявецъ. Благовонная марь есть однолѣтнее травянистое растеніе, изъ семейства «маревыхъ»

(Chenopodiaceae Vent.), родомъ изъ Мекенки. Листья спиральные ланцетовидные, зубчатые.OBOEПоловые мелкіе зеленые и душистые цвѣты въ густыхъ пучкахъ, собранныхъ метельчатымъ соцвѣтіемъ. Околоцвѣтникъ 5-тираздѣльный, при плодахъ травянистый, сочный; тычинокъ 5; плодъ округлый, сверху сжатый. Культивируется у насъ въ садахъ и встрѣчается иногда въ дикомъ состояніи.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Цвѣты растенія въ сушеномъ видѣ имѣютъ желтый цвѣтъ и обладаютъ приятнымъ, слегка напоминающимъ камфору, вкусомъ; дѣйствующее начало растенія заключается въ эфирномъ маслѣ его употребили, какъ средство, подобно валеріанѣ успокоивающее нервную систему, при судорогахъ, и параличахъ, а также при боли въ груди.

Въ настоящее время врачами средство это не прописывается, но въ домашнемъ быту его иногда употребляютъ. Для отвара берутъ горсть травы съ цвѣтами, заливаютъ стаканомъ кипятка и пьютъ съ молокомъ и сахаромъ или медомъ вмѣсто чая. Благовонная марь идетъ въ различные бальзамы. Сушеную траву держатъ въ шкафахъ и сундукахъ для сбереженія вещей отъ моли.

Марь бѣлая, см. Марь обыкновенная (*Chenopodium album* L.).

Марь вонючая (*Chenopodium vulvaria* L.). Фармацевтическое названіе: *Herba Vulvariae*, s. *Atriplicis foetidae*, s. *olidae*. Вонючая, навозная марь, Марь. Очень вонючая однолѣтняя трава изъ семейства «маревыхъ» (*Chenopodiaceae* Vent.), распространенная въ средней и южной Европѣ, въ средней и южной Россіи и въ Туркестанѣ, покрытая сѣрымъ пушистымъ налетомъ. Стебель лежачій или приподнимающійся, вѣтвистый, дл. 3—7 вершковъ. Листья яйцевидно-ромбическіе, цѣльнокрайніе; черешокъ одинаковой длины съ пластинкой листа. Цвѣты мелкіе зеленые, въ клубочкахъ, собранныхъ пазушными и верхушечными колосьями. Околоцвѣтникъ 5-тираздѣльный; тычинокъ 5; завязь свободная, одногнѣздная, съ однимъ яичкомъ и столбикомъ, оканчивающимся 2—3 нитевидными рыльцами. Плодъ заключенъ въ околоцвѣтникъ. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на сорныхъ мѣстахъ. (Рис. 172.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Марь вонючая имѣетъ очень непріятный запахъ и такой-же солоноватый противный вкусъ, зависящій отъ содержащагося въ растеніи амміака. При высушиваніи часть запаха и вкуса пропадаетъ.

Растеніе обладаетъ свойствомъ успокоивать нервную систему и можетъ замѣнять валеріану и вонючую камедь. Врачами предписывается крайне рѣдко. Въ народной медицинѣ дается отъ приступовъ истеріи и, какъ средство, усиливающее сокращенія стѣнокъ матки. Свѣжую траву толкутъ, прибавляютъ къ ней сахара и принимаютъ чайными ложками по 2—3 раза въ день. Крестьянскія повитухи даютъ отваръ, приготовленный, какъ чай, женщинамъ во время родовъ для скорѣйшаго выхода дѣтскаго мѣста и также при недостаточномъ послѣродовомъ очищеніи.

Въ Англіи готовятъ изъ вонючей марь противосудо-

рожный сиропъ. выжимають сокъ изъ свѣжей травы и варятъ его съ сахаромъ до густоты меда. Малолѣтнимъ такой сиропъ даютъ чайными ложками, взрослые принимаютъ его столовыми ложками.

Въ гомеопатіи изъ свѣжаго растенія готовятъ спиртную настойку, которую очень хвалятъ отъ головной боли, болей въ животѣ и болей при менструаціи.

Марь городская (*Chenopodium urbeum* L.). Водонянкъ глухой. Однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «маревыхъ» (*Chenopodiaceae* Vent.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель выш. 7—14 вершковъ, простой или немного вѣтвистый, прямостоящій, зеленый, иногда съ красноватымъ отбѣскомъ. Листья безъ мучнистаго налета, длинно-черешковые, блестящіе, широко-треугольные, по краямъ съ крупными неравными зубцами, верхніе уже и болѣе заостренные. Многочисленные мелкіе зеленые клубочки цвѣтковъ расположены пазушными прямостоящими колосьями. Околоцвѣтникъ 5-тираздѣльный, при плодахъ травянистый, незамкнутый; тычилокъ 5; завязь свободная, одногнѣздная съ 2-храздѣльнымъ столбикомъ. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на сорныхъ мѣстахъ и около жилья. (Рис. 173.)

Марь квиноа (*Chenopodium quinoa* Willd.). Шпинатъ перуанскій, Квиноа, Лебеда перуанская. Марь квиноа по своему вышнему виду очень напоминаетъ нашу марь обыкновенную (описаніе см. ниже «марь обыкновенная» (*Chenopodium album* L.)), съ тою разницею, что цвѣты и сѣмена—желтовато-бѣлые и первые собраны въ укороченные колосья. Растеніе достигаетъ болѣе 1½ аршинъ и разводится, главнымъ образомъ, въ Перу и Чили, въ Южной Америкѣ на высотахъ, гдѣ уже не могутъ произрастать ячмень и пшеница; сѣмена ея доставляютъ питательную пищу—ихъ развариваютъ въ водѣ и молокѣ или обрабатываютъ въ муку, изъ которой пекутъ хлѣбы. Листья употребляютъ, какъ овощъ, вмѣсто салата или шпината. Въ Мексикѣ, Перу и другихъ странахъ Южной Америки квиноа цѣнится вообще по своей питательности наравнѣ съ пшеницей, мансомъ и картофелемъ.

Марь красная (*Chenopodium rubrum* L.). Фармацевтическое названіе: *Atriplex silvestris*. Красная марь представляетъ изъ себя однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «маревыхъ» (*Chenopodiaceae* Vent.), распространенное въ Европѣ и довольно обыкновенное въ Россіи, Сибири и Туркестанѣ. Стебель прямой, вѣтвистый или лежачій, съ простертыми вѣтвями; листья голые, треугольно-ромбическіе, при основаніи клиновидные, острые, выемчато-зубчатые; зубцы острые, нижніе изъ нихъ крупнѣе; верхніе листья ланцетные, почти цѣлюкрайніе; пучки цвѣтковъ, густые, собранные прерванными простыми или сложными вверхстоящими колосьями въ углахъ листьевъ и на верхушкахъ, образующими обыкновенно узко-метельчатое облиственное соцвѣтіе; верхушечные цвѣтки въ пучкахъ имѣютъ 5-тираздѣльный околоцвѣтникъ и прициснутый сверху пестикъ;

боковые-же цвѣтки съ 3-храздѣльнымъ околоцвѣтникомъ, съ 1—2 тычинками, или съ однимъ сжатымъ съ боковъ пестикомъ. Плоды округло-яйцевидные, сжатые съ боковъ, съ мелкими блестящими, по большей части вертикальными, сѣменами. Цвѣтетъ лѣтомъ и осенью. Растетъ на сорныхъ мѣстахъ и по берегамъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Марь красная извѣстна, только какъ народное средство. Весною ее варятъ въ кушанья. Толченую траву прикладываютъ къ ранамъ, ушибамъ и занозамъ.

Марь кудрявая. см. Кудрявецъ (*Chenopodium Bogrus* L.).

Марь многосѣмянная (*Chenopodium polyspermum* L.). Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «маревыхъ» (*Chenopodiaceae* Vent.), распространенное во всей Европѣ и во всей Россіи. Походить на марь воющую, описаніе см. выше: марь воющая (*Chenopodium vulgaria* L.), но безъ мучнистаго налета и безъ противнаго запаха. Стебель узловатый, немного утолщенный. Листья черешковые, цѣльнокрайніе, яйцевидные или овальные, верхніе—ланцетные. Цвѣты мелкіе зеленые въ клубочкахъ, собранныхъ пазушными и верхушечными колосьями. Доли околоцвѣтника при плодахъ отвороченныя. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на сорныхъ мѣстахъ, около дорогъ и на огородахъ. (Рис. 174.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Отваръ растенія употребляется въ народѣ отъ вередовъ и отъ головной боли.

Марь ненастоящая (*Chenopodium hybridum* L.). Бешинникъ (Малор.), Вининникъ (Екат.), Бешинникъ, Гусиникъ (Могил.), Лебеда свинная (Даль). Марь ненастоящая представляетъ изъ себя однолѣтнее съ мучнистымъ налетомъ травянистое растение изъ семейства «маревыхъ» (*Chenopodiaceae* Vent.), распространенное почти во всей Европѣ и Россіи. Стебель прямой, гранистый, простой или наверху вѣтвистый; листья крупныя, голыя, треугольно-яйцевидныя, при основаніи округло-сердцевидныя, длинно-заостренныя и по сторонамъ съ 2—4 крупными заостренными зубцами. Мелкіе зеленые цвѣты скучены пучками, собранными метельчатыми соцвѣтiami на концахъ стебля и его вѣвей; околоцвѣтникъ 5-тираздѣльный, при плодахъ не вполне замкнутый. Тычинокъ 5; рылецъ 2; плодъ чечевицеобразный, прикрѣпленный въ серединѣ широкой нижней поверхности, съ крупными матовыми, отъ довольно крупныхъ ямочекъ, горизонтальными сѣменами. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на сорныхъ мѣстахъ, при изгородахъ.

Марь обыкновенная (*Chenopodium album* L.), Лобода дика (Малор.), Лебеда дикая (Собол., Астр.), Лобода собака, Лебеда полевая (Иск.), Марь бѣлая, Паровница (Волог.), Сныть борова. Бѣловато-мучнистая или блѣдно-зеленая трава выш. 7—9 вершк., изъ семейства «маревыхъ» (*Chenopodiaceae* Vent.), распространенная въ Европѣ и въ Россіи. Листья черешковые, нижніе овально-ромбическіе, по краямъ съ неравными зубцами, верхніе—продолговато-ланцетные, цѣльнокрайніе. Клубочки, состоящіе изъ многочисленныхъ мелкихъ цвѣтовъ, со-

браны пазушными и верхушечными колосьями. Околоцвѣтникъ 5-тираздѣльный, при плодахъ замкнутый. Тычинокъ 5; рылецъ 2. Плодъ чечевицеобразный, съ гладкими блестящими горизонтальными сѣменами. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на поляхъ и на сорныхъ мѣстахъ. При неурожаѣ марь обыкновенная употребляется въ примѣсъ къ хлѣбу. Ее варятъ также въ супъ съ мясомъ или рыбою. (Рис. 175.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Въ народѣ ей приписываются свойства уменьшать зудъ въ кожѣ и вылечивать чесотку; также ее пьютъ отъ поносовъ и истерикъ.

Марь стѣнная (*Chenopodium murale* L.). Однолѣтнее травянистое растение, немного мучнистое, изъ семейства «маревыхъ» (*Chenopodiaceae* Vent.), распространенное въ средней Европѣ, въ Литвѣ, Привислянскомъ краѣ и на Кавказѣ. Стебель вып. 7—21 вершковъ, слабо-вѣтвистый, узловатый. Листья яйцевидно-ромбическіе, мясистые, сверху темно-зеленые, блестящіе, снизу блѣдно-зеленые, съ крупными зубцами. Соцвѣтїя пазушныя мелкія, отстающія. Околоцвѣтникъ при плодахъ вновь замкнутый; тычинокъ 5; рылецъ 2. Плодъ чечевицеобразный, съ гладкими матовыми мелко-бугорчатыми горизонтальными сѣменами. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на сорныхъ мѣстахъ и около дорогъ. (Рис. 176.)

Марь цѣльнолистная (*Chenopodium Bonus* Henricus L.). Фармацевтическое названіе мари цѣльнолистной: *Lararium unctuosum*. Названія тѣ-же, какъ и при мари обыкновенной (см. выше), и, кромѣ того: Гатионецъ (Малор.), Моралки, Моральки (Даль). Многолѣтнее травянистое, вып. 7—14 вершк., растение изъ семейства «маревыхъ» (*Chenopodiaceae* Vent.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ средней и южной Россіи. Воздушные стебли выходятъ изъ угловъ низовыхъ листьевъ подземнаго корневища; стебли прямые, бороздчатые; листья треугольно-концевидные, цѣльнокрайніе, иногда слегка зубчатые, темно-зеленые, немного мучнистыя. Многочисленные мелкіе зеленые цвѣты въ колосьяхъ, собранныхъ узкою верхушечною безлистною метелкою. Верхушечныя цвѣтки съ 5-тираздѣльнымъ околоцвѣтникомъ и 5-ю тычинками. Боковые—съ 3—4-храздѣльнымъ околоцвѣтникомъ и 2—3 тычинками или съ однимъ только пестикомъ. Плодъ округло-яйцевидный, скатый съ боковъ, немного выдающійся изъ околоцвѣтника. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта. Растетъ при дорогахъ и на сорныхъ мѣстахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ народѣ марь цѣльнолистная извѣстна, какъ слабительное средство. Она употребляется внутрь и снаружи. Снаружи ее прикладываютъ ввидѣ примочки при подагрѣ, отъ отековъ на ногахъ, отваромъ травы обмываютъ глаза, толченую траву смѣшиваютъ съ коровьимъ масломъ и ею смазываютъ тѣло отъ чесотки, кожу на головѣ отъ сыпи и перхоти, также эту мазь кладутъ на геморроидальныя шишки.

Изъ одной, двухъ горстей травы варятъ отваръ, процеживаютъ и ставятъ изъ него клистиры при запорахъ, сопровож-

дающихъ выпаденіемъ геморроидальныхъ шишекъ. Свѣже-выжатый сокъ растенія по своему слабительному дѣйствию имѣеть много общаго съ манной. На пріемъ берутъ $\frac{1}{2}$ стакана сока. Отваръ травы пьютъ отъ глистовъ.

Горные жители употребляютъ свѣжую траву въ пищу вмѣстѣ шпината. Стебли его также идутъ въ пищу: ихъ отвариваютъ, приправляютъ масломъ и ѣдятъ, какъ спаржу.

Марьяна, см. Дѣвникъ (*Pyrethrum Parthenium* Smth.).

Марьянъ, см. Малоранъ (*Origanum Majorana* L.).

Марьяна лѣсовая, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Марьянникъ гребенчатый (*Melampyrum cristatum* L.). Желтушникъ (Вят.), Пѣтушій гребешокъ, Пѣтушки (Малороссія). Однолѣтнее травянистое, выш. $3\frac{1}{2}$ —7 верш., растеніе изъ семейства «поричниковыхъ» (*Scrophulariaceae* R. Br.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель прямой, вѣтвистый, съ супротивными линейно-ланцетными листьями. Соцвѣтіе—густой 4-хгранный колосъ. Прицвѣтники ссрадевидно-округлые, гребенчато-зубчатые, вдоль сложенные. Чашечка трубчато-колокольчатая, 4-зубчатая, вдвое короче вѣнчика; мохнатая; вѣнчикъ съ цилиндрическою трубкою, двугубый, блѣдно-желтый или красноватый, съ желтою нижнею губою; верхняя губа шлемовидная, нижняя—при основаніи съ 2 выпуклинами, коротко-трехлопастная. Тычинокъ 4, съ остро-конечными при основаніи гнѣздами пыльниковъ. Завязь верхняя, 2-хгнѣздная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—яйцевидная косая гнѣздоразрывная коробочка. Гнѣзда 1—2-хсѣмянныя, съ довольно крупными гладкими продолговатыми сѣменами. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ на лугахъ, поляхъ, между кустарниками и въ рощахъ. (Рис. 177.)

Марьянникъ луговой (*Melampyrum pratense* L.). Фармацевтическое названіе: *Melampyrum luteum*. Названія тѣ-же, какъ и у Ивана да Марьи (*Melampyrum nemorosum* L.), описаніе см. выше, и, кромѣ того: Кушарка (Олон.), Петровская трава (Иск.), Сорочьи стручки (Нижег.), Чистецъ (Хар.), Васильки полевые (Курск.), Люкрецъ (Вор.), Жеруха (Гродн.). Марьянникъ луговой представляетъ изъ себя однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «поричниковыхъ» (*Scrophulariaceae* R. Br.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель прямой, съ линейно-ланцетными, коротко-черешковыми листьями. Прицвѣтники зеленые, верхніе снабженны при основаніи линейными зубцами. Цвѣточный колосъ однобочный, съ горизонтально-отстоящими цвѣтами. Чашечка трубчато-колокольчатая, 4-зубчатая, голая, съ шиловидными вверхогнутыми зубцами, не доходящими до середины трубочки вѣнчика. Вѣнчикъ блѣдно-желтый или бѣловатый, булабовидный, съ суженнымъ звѣномъ, двугубый. Тычинокъ 4, съ остроконечными при основаніи гнѣздами пыльниковъ. Завязь верхняя, 2-хгнѣздная. Плодъ—яйцевидная косая гнѣздоразрывная коробочка съ сравнительно крупными, про-

долговатыми, гладкими сѣменами. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ на лугахъ, между кустарниками и въ лѣсахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ марьянника лугового извѣстно только въ народѣ. Марьянникъ луговой употребляется отъ золотухи у дѣтей и вводитъ припарокъ для размятченія твердыхъ опухолей.

Марьянникъ лѣсной (*Melampyrum silvaticum* L.). Гнѣздуха (Тверск.), Кобылья трава (Петербургск.), Могильникъ (Могилев.). Однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «поричниковыхъ» (*Scrophulariaceae* R. Br.), распространенное въ сѣверной и средней Европѣ, въ сѣверной и средней Россіи, выпш. 4—5 верш. Весьма походитъ на предыдущій видъ (см. выше марьянникъ луговой — *Melampyrum pratense* L.), но легко отличается отъ него ярко-желтыми, болѣе мелкими, прямостоящими цвѣтами въ однобочномъ колосѣ; прицвѣтники болѣею частью цѣлюкрайніе, зеленые. Зубцы чашечки одинаковой длины съ трубкой вѣнчика. Цвѣтеть постоянно лѣтомъ. Растетъ обыкновенно въ лѣсахъ.

Марьянникъ полевой (*Melampyrum arvense* L.). Позвонокъ (Вор.), Звонецъ (Курск.), Братки (Подол.). Иванъ да Марья (Ставр.). Желтоголовникъ (Вор.). Золототысячникъ (Харьковск.). Мать и мачиха. Полевая трава, Худуша (Курск.). (Та бл. XXVIII, фиг. 155.) Однолѣтнее травянистое коротко-шероховато-пушистое растеніе изъ семейства «поричниковыхъ» (*Scrophulariaceae* R. Br.), распространенное въ средней и южной Европѣ и въ средней и южной Россіи. Стебель прямой, вѣтвистый, съ вверх-обращенными вѣтвями; листья ланцетные, при основаніи зубчатые. Прицвѣтники пурпуровые, длиннѣе цвѣтовъ, плоскіе, по краямъ съ шиловидными зубцами. Цвѣты собраны длиннымъ цилиндрическимъ колосомъ. Чашечка пушистая, 5-тизубчатая, съ длинными шиловидными зубцами, одинаковой длины съ трубкой вѣнчика. Вѣнчикъ желтый или пурпуровый, съ желтымъ зѣвомъ, двугубый. Тычинокъ 4, съ остроконечными при основаніи гнѣздами пыльниковъ. Завязь верхняя, 2-хгнѣздная. Плодъ — яйцевидная косая гнѣздоразрывная коробочка съ довольно крупными, продолговатыми, гладкими сѣменами. Полевой марьянникъ цвѣтеть лѣтомъ; растетъ на поляхъ, въ степяхъ и между кустарниками.

Маслена, см. Березовый грибъ (*Boletus scaber* Bull.).

Масленка, см. Кудри царскія (*Lilium Martagon* L.).

Масленка, см. Купальница европейская (*Trollius europaeus* L.).

Масленки, см. Козелецъ преземистый (*Scorzonera humilis* L.).

Масленокъ, см. Кудри царскія (*Lilium Martagon* L.).

Маслина, см. Лохъ (*Elaeagnus hortensis* M. A. B.).

Маслина, см. Оливковое дерево (*Olea europaea* L.).

Маслина дикая, см. Лохъ (*Elaeagnus hortensis* M. A. B.).

Масличина } см. Оливковое дерево (*Olea europaea* L.).

Масличіе }

Масличный горохъ (*Soja hispida* Moench.). Однолѣтнее растеніе

родомъ изъ Японіи; разводится часто въ восточной Азіи; съ-мена его, похожая на бобы, очень пріятны на вкусъ, идутъ на приготовленіе особой пикантной подливки или соуса, извѣстнаго подъ названіемъ «сои», которая особенно распространена въ Индіи, какъ приправа почти ко всѣмъ кушаньямъ.

Масличное дерево, см. Лохъ (*Elaeagnus hortensis* M. A. B.).
Масличное дерево, см. Оливковое дерево (*Olea europaea* L.).
Масло, см. Кудри царскія (*Lilium Martagon* L.).
Масло воронье, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).
Масло зеленое, см. Пазникъ крапчатый (*Achyrophorus maculatus* Scop.).

Масло козине, см. Солъ (*Anemone Pulsatilla* L.).
Маслянка, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).
Маслянка, см. Лютикъ ѣдкій (*Ranunculus acer* L.).
Маслянка желтая, см. Подмаренникъ желтый (*Gallium verum* L.).
Маслянки, см. Крестъ-петровъ (*Lathraea Squamaria* L.).
Масляночка, см. Кудри царскія (*Lilium Martagon* L.).

Мастиковое дерево (*Pistacia Lentiscus* L.). Мастишное дерево. Дерево родомъ съ острововъ Средиземнаго моря, преимуще-ственно Хіоса, въ Греціи нерѣдко образуетъ цѣлыя вѣчно-зеленѣющія рощи. Выдѣляетъ родъ смолы, извѣстной подъ названіемъ «мастики»; послѣдняя или отвердѣваетъ на деревѣ, образуя желтоватыя прозрачныя капли—слезинки, или отвердѣваетъ, уже стекая на землю и образуя уже непрозрачныя, наполовину смѣшанныя съ землею и пескомъ, капли. Первая считается высшимъ сортомъ мастики. Она входитъ въ составъ нѣкоторыхъ зубныхъ порошковъ, пластирей, маселъ, преимуще-ственно употребляемыхъ противъ ревматизма. На Востокѣ ее жуютъ грузинки и армянки. Болѣе низкій сортъ мастики входитъ въ составъ курительныхъ порошковъ. Листья употреб-ляются для дубленія, а древесина доставляетъ подѣлочный матеріалъ.

Мастишное дерево, см. Мастиковое дерево (*Pistacia Lentiscus* L.).
Материна, см. Буквица лекарственная (*Betonica vulgaris* L.).
Материнка, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea mille-folium* L.).

Материнка, см. Синякъ обыкновенный (*Echium vulgare* L.).
Материнка, см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca* L.).
Материнка, см. Соколій перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).
Материнка, см. Мята лѣсная (*Mentha silvestris* L.).
Материнка, см. Мята полевая (*Mentha arvensis* L.).
Материнка, см. Душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.).
Материнка меньшая, см. Душевикъ остролистный (*Calamintha Acinos* Benth.).

Материшная трава, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).
Матерка } см. Конопля полевая, или обыкновенная (*Cannabis*
Матери } *sativa* L.).
Матерникъ, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).
Матерняя трава, см. Дѣвникъ (*Pyrethrum Parthenium* Smith.).

Матика винная, см. Переступъ обыкновенный (*Tamus communis* L.).

Матица, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).

Матица бѣлая, см. Переступень бѣлый (*Bryonia alba* L.).

Матка, см. Конопля полевая, или обыкновенная (*Cannabis sativa* L.).

Матка, см. Мелисса лекарственная (*Melissa officinalis* L.).

Матки, см. Конопля полевая (*Cannabis sativa* L.).

Маткина душка, см. Фиалка душистая (*Viola odorata* L.).

Матлежокъ, см. Ежа сборная (*Dactylis glomerata* L.).

Матлика, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Матница, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).

Маточная трава, см. Ромашка обыкновенная (*Matricaria Chamomilla* L.).

Маточная трава, см. Дѣвникъ (*Pyrethrum Parthenium* L.).

Маточникъ, см. Живучка мохнатая (*Ajuga reptans* L.).

Маточникъ, см. Чернокудренникъ черный (*Ballota nigra* L.).

Маточникъ см. Чертополохъ разнолиственный (*Cirsium heterophyllum* All.).

Маточникъ (*Dracosephalum moldavica* L.). Фармацевтическое название: *Moldavica*, s. *Melissa turcica*, s. *Cedronella* (Herba), *Drac. canariense*, *Melissa canariensis*. Бѣшана (Нижег.), Иссопъ лѣсной, Матошникъ (Малор.), Мелисса турецкая (въ травян. лавк.), Медовикъ, Ногтикъ (Волын.), Пчельникъ-трава, Цитронникъ. Однолѣтнее травянистое извѣстное медоносное растение изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное въ средней Европѣ и средней. западной и юго-западной Россіи, въ Сибири до Байкала. Стебель обыкновенно вѣтвистый, нѣсколько пушистый; листья черешковые, продолговато-ланцетные; нижніе при основаніи тупые, надрѣзано-городчатые, верхніе—крупно-пильчатые съ цѣльной тупою верхушкою; верхушечные листья ланцетные, остро-пильчато-надрѣзанные, съ зубцами, кончающимися тонкою щетинкою; фіолетовые или бѣловатые цвѣты, расположенные обыкновенно мутовчато (т. е. кольцами), по 6 въ мутовкѣ, образуютъ длинную, негустую кисть. Чашечка трубчато-колокольчатая, 5-тизубчатая, съ болѣе крупнымъ верхнимъ зубцомъ, съ 15 жилками, двугубая; верхняя губа 3-хлопастная, съ яйцевидными остроконечными зубцами, нижняя—двураздѣльная, съ ланцетными заостренными зубцами. Вѣничекъ—вдвое превышающій чашечку, съ тонкою при основаніи трубчатою, расширяющейся къверху, и съ двугубымъ отгибомъ; верхняя губа—вогнутая и выемчатая, нижняя—3-лопастная, съ болѣе крупною среднею лопастью. Тычинокъ 4, двусильныхъ (т. е., 2 среднія длиннѣе 2-хъ боковыхъ), находящихся подъ верхнею губою вѣничка. Глѣзда пыльниковъ расходящіяся. Завязь окружена при основаніи подпестичнымъ дискомъ, 4-хлопастная, 4-хгнѣздная, съ однимъ яичкомъ въ каждомъ гнѣздѣ; столбикъ выходитъ изъ середины завязи между ея лопастями, съ двудопастнымъ рыльцемъ. Плодъ рас-

падаетъ на 4 односѣмянныхъ, гладкихъ, трехгранныхъ орѣшка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Встрѣчается иногда на сорныхъ мѣстахъ. Разводится въ огородахъ.

Маточникъ, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Маточникъ, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).

Маточникъ, см. Ленъ длиннй (*Linaria vulgaris* Mill.).

Маточникъ, см. Ромашка обыкновенная (*Matricaria Chamomilla* L.).

Маточникъ, см. Мелисса лекарственная (*Melissa officinalis* L.).

Маточникъ, см. Котовикъ кошачій (*Nepeta Cataria* L.).

Маточникъ, см. Бѣлозоръ болотный (*Parnassia palustris* L.).

Маточникъ, см. Синюха обыкновенная (*Polemonium coeruleum* L.).

Маточникъ, см. Дѣвникъ (*Pyrethrum Parthenium* Smith.).

Маточникъ, см. Чистецъ прямой (*Stachys recta* L.).

Маточникъ, см. Пижма обыкновенная (*Tanacetum vulgare* L.).

Маточникъ, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).

Маточникъ дикій, см. Зюзникъ европейскій (*Lycopus europaeus* L.).

Маточникъ полевой, см. Дубровникъ обыкновенный (*Teucrium Chamaedrys* L.).

Маточница, см. Ромашка обыкновенная (*Matricaria Chamomilla* L.).

Матошникъ, см. Маточникъ (*Dracoscephalum moldavica* L.).

Матошникъ, см. Норичникъ водяной (*Scrophularia aquatica* L.).

Матышникъ, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).

Матрежка } см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea mille-*
Матренка } *folium* L.).

Матренка, см. Поповникъ непахучій (*Matricaria inodora* L.).

Матренка, см. Василистникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).

Матренка, см. Коровякъ бѣлоцвѣтный (*Verbascum Lychnitis* L.).

Матрешка, см. Подмаренникъ мягкій (*Galium Mollugo* L.).

Матрешка, см. Деревей (*Ptarmica cartilaginea* Dc.).

Матрешка, см. Чихотная трава (*Ptarmica vulgaris* Dc.).

Матріонка, см. Василистникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).

Матура, см. Подмаренникъ сѣверный (*Galium boreale* L.).

Матушникъ, см. Шалфей луговой (*Salvia pratensis* L.).

Матца, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).

Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.). Фармацевтическое названіе: *Farfara* s. *Tussilago*, s. *Ungula caballina*, s. *Bechium*, s. *Pez Asini*, s. *Filius ante patrem* (*Herba et Flores*). Бѣлокопытникъ, Бѣлокопытень, Двоелестникъ, Двучичникъ (Дом. леч.), Камчужная трава (Пермск.), Книзь простая, Колорѣчная трава, Кошито лошадиное тр., Лепешникъ, Лапушникъ лѣсной (Ниж.), Лапуха студеная (Вят.), Лапухъ водяной, Лапушничекъ полевой, Лапушникъ мелкій (Арх.), Мама (Кал. губ.), Матерникъ, Маточникъ (Влад., Орл.), Матышникъ (Мог.), Мать трава, Матца, Цвѣтъ мать и мачихинъ, Мачиха (Стар. Рус., Перм., Новг., Пск., Каз.), Мачишникъ (Малор.), Мачихино лицо, Односторонникъ, Опу-

Холные листья (Арх.), Подбѣль. Подбѣль менший, Підбілъ (Малор.), Подбілъ (Малор.), Подбой (Бесс.), Ранникъ (Умань), Царь-зелье (Черн.). Мать и мачиха представляет изъ себя многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «сложно-цвѣтныхъ» (Compositae Adans.), распространенное почти во всей Европѣ и весьма обыкновенное въ Россіи. Цвѣточныи стебель, выш. всего 2½—3½ вершк., несетъ на верхушкѣ одиночную корзинку ярко-желтыхъ цвѣтовъ и покрытъ бѣлыми шерстистыми волосами и многочисленными буроватыми чешуйчатыми листьями. Послѣ цвѣтенія появляется розетка зеленыхъ прикорневыхъ листьевъ, сердцевидныхъ, по краямъ выемчатыхъ и неравномерно-зубчатыхъ, сверху голыхъ, снизу бѣло-войлочныхъ. Цвѣтоложе корзинки голое. Краевые цвѣты женскіе, язычковые, расположенные нѣсколькими рядами; средние—обоеполовые, трубчатые, наверху колокольчатые, безплодные. Тычинокъ 5; нити ихъ свободны, пыльники-же сдвинуты въ трубочку, черезъ которую проходитъ столбикъ; послѣдній въ трубчатыхъ цвѣткахъ наверху утолщенъ, почти цѣльный, въ язычковыхъ—двулопастный, съ линейными лопастями. Завязь нижняя, одногнѣздная, односѣмянная. Плодъ—цилиндрическая сѣмянка съ хохолкомъ. Цвѣтетъ рано весною. Растетъ на глинистой и песчаной почвѣ на поляхъ и въ оврагахъ. (Табл. XXVIII, фиг. 157.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Мать и мачиха употребляется очень часто въ народной медицинѣ при болѣзни дыхательныхъ органовъ, при коносахъ и золотухѣ. Свѣжіе листья прикладываютъ снаружи на воспаленные участки, сокомъ ихъ поятъ отъ золотухи, также сокъ растения употребляется для весенняго леченія соками растений. Листья входятъ въ составъ приготовляемаго въ аптекахъ грудного чая. Въ Вологодской губерніи траву прикладываютъ для ускоренія образованія нарыва, въ Пермской губерніи листья, истолченные въ кашпцу, прикладываютъ къ несозрѣвшимъ нарывамъ и вередамъ. Внутри отваръ травы принимаютъ отъ удушья, кашля, водяной болѣзни и золотухи. Горсть травы съ цвѣтами заливаютъ большимъ стаканомъ кипятка, пьютъ, какъ чай; корня на такое-же количество берутъ 1 унцъ (30 грм.). Выжатаго свѣжаго сока даютъ по 4—6 столовыхъ ложекъ съ сахаромъ или медомъ. Продолжительное употребленіе сока очень хвалятъ, какъ средство, помогающее отъ чахотки легкихъ. Приготовляемый въ аптекахъ грудной чай употребляется въ тѣхъ-же болѣзняхъ. Горсть травы завариваютъ горячею водою, кипятятъ, процеживаютъ и пьютъ по чайной чашкѣ раза два въ день.

Мать и мачиха, см. Марьянникъ полевой (*Melampyrum arvense* L.).

Мать трава, см. Пасленъ сладко-горькій (*Solanum dulcamara* L.).

Мать трава, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).

Маунъ, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Махалка, см. Тростникъ обыкновенный (*Arundo Phragmites* L.).

Махалки, см. Камышъ озерной (*Scirpus lacustris* L.).

Махорка, см. Плакунъ трава (*Lythrum Salicaria* L.).

Махорка (*Nicotiana rustica* L.). Бакунь, Тютюнъ, Табакъ, Табакъ турецкій, Корбачъ (Гродн.), Табакъ венгерскій, Папушникъ, Рубанка, Высиръ (у раскольниковъ названіе табака взято изъ слѣдующихъ словъ: корень горести, высиръ, прозябай. Послан. св. апост. Павла къ евреямъ XII, 15.), (Табл. XXVIII, ф. пг. 156.) Однолѣтнее железисто-пушистое растеніе изъ семейства «пасленовыхъ» (*Solanaceae* Juss.), родомъ изъ Америки или изъ южной Азіи. Стебель выпш. 11—22 вершк., слабо вѣтвистый. Листья черешковые, яйцевидные, немного клейкіе, сверху блестящіе. Цвѣты собраны на концѣ стебля сжатой метелкой. Чашечка колокольчатая, 5-тилопастная, остающаяся; вѣнчикъ ворончатый, съ 5-тилопастнымъ желтовато-зеленымъ отгибомъ и широкою бѣловатой трубочкой. Тычинки 5, прикрѣпленныхъ къ трубочкѣ вѣнчика; завязь верхняя, двугнѣздная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—коробочка, заключенная въ чашечку, двугнѣздная, раскрывающаяся 2-мя раздѣльными створками, отклеивающимися отъ перегородки: сѣмена мелкія, почти шаровидныя, бугорчатая. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Разводится на югѣ Россіи въ большомъ количествѣ.

Махунка } см. Вишня жидовская (*Physalis Alkekengi* L.).
Махункова ягода }

Мадеранка } см. Душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.).
Мадердумка }

Мадердушка, см. Мадоранъ (*Origanum Majorana* L.).

Мецердушка } см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).
Мецержанка }

Мадержанка, см. Душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.).

Мадержанка, см. Мадоранъ (*Origanum Majorana* L.).

Мачекъ дикій, см. Купальница европейская (*Trollius europaeus* L.).

Мачимачиха, см. Анютины глазки (*Viola tricolor* L.).

Мачина, см. Макъ самосѣйка (*Papaver Rhoeas* L.).

Мачиха, см. Чертополохъ ланцетолистный (*Cirsium lanceolatum* L.).

Мачиха, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).

Мачихино лицо } см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).
Мачишникъ }

Мачокъ, см. Рогачъ желтый (*Glaucium luteum* Scop.).

Мачокъ, см. Макъ самосѣйка (*Papaver Rhoeas* L.).

Машки, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).

Мглотникъ, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

Медвѣдка, см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.).

Медвѣдокъ, см. Ежевика (*Rubus fruticosus* L.).

Медвѣдь, см. Кукушкинъ ленъ (*Polytrichum commune* L.).

Медвѣжаникъ, см. Морюшка (*Rubus Chamaemorus* L.).

Медвѣжаникъ, см. Бѣлый грибъ (*Boletus edulis* Bull.).

Медвѣжникъ, см. Бересклетъ бородавчатый (*Evonymus verrucosus* L.).

Медвѣжникъ болотный, см. Чертополохъ огородный (*Cirsium oleraceum* L.).

Медвѣжникъ мелкій, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).

Медвѣжница, см. Толокнянка обыкновенная (*Arctostaphylos officinalis* Moench.).

Медвѣжій корень, см. Горичникъ лекарственный (*Peucedanum officinale* L.).

Медвѣжій цвѣтъ, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).

Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.). Фармацевтическое название *Verbascum* (Fol. et Flor.). Акулинка (Ворон. губ.), Кулина (Сарат.), Атаманъ-трава (Алт., Верб., Перм., Крыл.), Бастыльникъ (Сарат., очевидно—измѣн. Бастыльникъ), Верблюжий ушки (Астр.), Волчьи ушки (Нижег.), Вербишникъ, Вербишникъ бѣлый, Дивана (южн. и юго-зап.), Диванна, Диванка, Дивена (Кал., Пермск., Тамб.), Дивенна (Малор.), Дсванна (Мог.), Дѣванка (Кондр.), Дѣвина (Мал.), Дзиванна бѣлая (Могил.), Дебверъ-шелковникъ (Моск.), Дрябчакъ (Малор.), Егорьево копьѣ (вост. ч. Томск. губ.), Желновка (Костр.), Звѣробой, Стенной звѣробой, Знадба (Пек., вѣр. искаж. Снадобе), Коровьякъ (Малор.), Коровникъ, Косматая трава (Могил.), Лимонникъ (Конор.), Лисакъ (Могил.), Лучинникъ (Укр.), Материшняя трава (Кунг. и Красноуф.), Медвѣжникъ мелкій (Нижег.), Медвѣжья лапа, Медвѣжье ухо или Медвѣжьи ушки (въ больш. ч. Россіи), Ведмежье ухо (Малор.), Оленьѣ ухо (Твер.), Медвѣжій цвѣтъ (Сар.), Петровъ крестъ (Полт.), Плето (Уф.), Плетъ суконная (Перм. г. Верхотур. у.), Плитнякъ, т. е., Плетнякъ (южн. ч. Томск. губ.), Свѣчи (Малор.), Свѣча царекал, Сукно, Суконце (Вятск., Перм.), Суконникъ (Перм.), Царскій скипетръ. Медвѣжье ухо есть двулѣтнее травянистое желтовато-шерстисто-войлочное растение изъ семейства «норичниковыхъ» (*Scrophulariaceae* R. Br.), распространенное почти во всей Европѣ, въ сѣверной, средней Россіи, въ Малороссіи, въ Крыму и на Кавказѣ. Стебель примостоящій, выпш. 7—28½ вершк. Листья очердные, продолговатые, заостренные, городчатые, нисбѣгающіе. Желтые цвѣты расположены длиннымъ (выш. до 7 вершк.), густымъ верхушечнымъ колосомъ. Чашечка 5-тилопастная, вѣничикъ колесовидный, съ короткою трубкою, съ углубленнымъ 5-тилопастнымъ отгибомъ. Тычинокъ 5, неодинаковыхъ: переднія изъ нихъ длиннѣе, три верхнія съ бѣловато-войлочными тычиночными нитями. Пыльники почковидные, одногнѣздные, раскрывающіеся поперекъ; завязь верхняя, одногнѣздная; столбикъ простой, съ головчатымъ рыльцемъ. Плодъ—коробочка, раскрывающаяся 2-мя створками по перегородкѣ; сѣмена многочисленныя мелкія, овальныя. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на сухихъ песчаныхъ мѣстахъ. Ради красивыхъ цвѣтовъ разводится иногда въ садахъ, гдѣ достигаетъ значительной высоты. Въ нѣкоторыхъ странахъ длинные стебли растенія покрываются смолою, вслѣдствіе чего изъ нихъ готовятъ родъ факеловъ, а пушистые листья употребляютъ, какъ труть.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Растеніе употребляется также въ области медицины. Для врачебнаго употребленія собираютъ изрѣдка листья, но чаще цвѣты. Первые обрываются въ маѣ и юнѣ до цвѣта. Такъ какъ цвѣты очень нѣжны и сочны, то ихъ послѣ сбора тотчасъ-же слѣдуетъ сушить на желѣзныхъ листахъ въ вольномъ духу печи или въ сушильнѣ и хранить потомъ въ закупоренныхъ тщательно стянкахъ, иначе они почернѣютъ, потеряютъ запахъ и силу. Свѣжіе листья имѣютъ вкусъ слизистый, горьковатый, нѣсколько вяжущій, а свѣжіе цвѣты — сладковато-слизистый. Если изъ цвѣтковъ готовится отваръ или настойка, слѣдуетъ процеживать ихъ сквозь мелкое сито, такъ какъ волоски, покрывающіе нити тычинокъ, попавши въ горло, могутъ произвести раздраженіе и вызвать кашель.

Медицинское употребленіе медвѣжьяго уха существуетъ только въ народѣ. Прежде оно употреблялось врачами, какъ мягчительное, обволакивающее средство, при катарральныхъ поносахъ, а снаружи ввидѣ припарокъ и полосканья. Въ народной медицинѣ чай изъ листьевъ медвѣжьяго уха употребляется отъ одышки и кашля въ Московской губерніи, въ Пермской губерніи употребляется отъ разстройства матки послѣ родовъ и отъ худобы: порошокъ листьевъ засыпаютъ порѣзы и раны, въ Владимірской губ. изъ сѣмянъ дѣлаютъ мазь. Лошадямъ отъ опоя даютъ отваръ растенія, а также когда онѣ слабѣютъ на ноги; коровамъ даютъ этотъ отваръ, когда онѣ перестаютъ давать молоко; на Кавказѣ траву смѣшиваютъ съ пережженною солью и даютъ овцамъ отъ кашля и простуды.

Медвѣжьи ягоды, см. Толочнянка обыкновенная (*Arctostaphylos officinalis* Moench.).

Медвѣжьи ягоды, см. Пасленъ сладко-горькій (*Solanum dulcamara* L.).

Медвѣжья трава, см. Вшивица хохлатая (*Pedicularis comosa* L.).

Медвѣжья трава, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).

Медвяница, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).

Медвянка, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).

Меденица, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).

Меденишникъ, см. Сивякъ обыкновенный (*Echium vulgare* L.).

Мединица, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).

Медъ, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Медникъ розовый, см. Пикульникъ длинноцвѣтный (*Galeopsis Ladanum* L.).

Медноланъ, см. Валериана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Медовая трава, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).

Медовая трава, см. Бухарникъ мягкій (*Holcus mollis* L.).

Медовая трава, см. Чина луговая (*Lathyrus pratensis* L.).

Медовая трава, см. Вшивица хохлатая (*Pedicularis comosa* L.).

Медовая трава, см. Занникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa* L.).
 Медовая трава, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).
 Медовикъ, см. Маточникъ (*Dracoscephalum moldavica* L.).
 Медовикъ, см. Занникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa* L.).
 Медовикъ, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).
 Медовикъ, см. Земляные орѣшки (*Spiraea filipendula* L.).
 Медовикъ, см. Клеверъ луговой (*Trifolium arvense* L.).
 Медовикъ, см. Клеверъ бѣлый, или ползучій (*Trifolium repens* L.).

Медовикъ красный, см. Клеверъ средний (*Trifolium medium* L.).

Медовики, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

Медовики бѣлые, см. Вѣлгоголовка (*Trifolium montanum* L.).

Медовичокъ, см. Легочица лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).

Медовка, см. Melissa лекарственная (*Melissa officinalis* L.).

Медовка, см. Занникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa* L.).

Медовка, см. Шалфей луговой (*Salvia pratensis* L.).

Медовникъ или Пикунникъ колючій (*Galeopsis Tetrahit* L.).

Фармацевтическое названіе: *Cannabis silvestris*, отсюда Конопельникъ, Дикая конопля, Посконъ (Олон.). Медовникъ, кромѣ того, называется Бобылекъ (взято съ польск.), Сучье вымя, Головка пѣтушья, Куринныя головки, Жабрей полевой (Вел. Росс.), Жабрей лисовій, Жабрикъ (Малор.), Зябрь мелкоцвѣтнй, Зябрь (Смол.), Колюшникъ молодой (Тв.), Крапива красноцвѣтная, Курятникъ конопляный, Пискуха (Пет.), Пискуля (Новг.), Полвникъ (Вол., Под.), Силичная (Олон.), Стринуша (Новг.), Сирпешникъ (Полт.), Толстуха (Даль), Цвѣтъ голубинный (Влад.), Щепельникъ (Олон.), Люмлина (Ниж.), Лекотка (Тург.), Морса (Сар.). Медовникъ есть однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и обыкновенное почти во всей Россіи. Стебель выш. 7—14 вершк. вѣтвистый, жестко-волосый, подъ узлами утолщенный. Листья продолговато-яйцевидные, заостренные, крупно-зубчатые, шершавые. Многочисленные цвѣты сидятъ густыми мутовками въ углахъ верхнихъ листьевъ. Чашечка трубчато-колокольчатая, съ 10 ю жилками и 5-ю тонко-колючими зубцами. Венчикъ съ расширенною у основанія трубчатою, двугубой, бѣловатой или лиловой; верхняя губа вознута ввидѣ шлема, спереди зубчатая, нижняя—3-лопастная, съ обратно-сердцевидною среднею лопастью, при основаніи желтая, съ пурпуровыми пятнами. Тычинокъ 4, двусильныхъ, т. е. 2 боковыя длиннѣе остальныхъ; гвѣзда пыльниковъ расходящаяся, раскрывающаяся каждое на 2 створки, изъ которыхъ меньшая рѣсничатая. Завязь окружена при основаніи подпестичнымъ дискомъ, 4-лопастная и 4-гвѣздная, вслѣдствіе развитія ложной перегородки, съ однимъ яичкомъ въ каждомъ гвѣздѣ; изъ середины завязи выходитъ столбикъ, оканчивающійся двулопастнымъ рыльцемъ. Плодъ распадается на 4 обратно-яйцевидныхъ, сжатыхъ, сверху округлыхъ орѣшка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ большей частью

на опушкѣ лѣсовъ и рошъ, на поляхъ, около дорогъ, тропи-
и на сорныхъ мѣстахъ. (Рис. 178.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Медовникъ издавна славится въ народной медицинѣ, какъ средство, улучшающее питаніе слизи-
стой оболочки бронхъ и желудочно-кишечнаго канала. Траву за-
вариваютъ, какъ чай, и пьютъ чашками: листья медовника
употребляются въ пищу вмѣсто канусты. Снаружи стебель и листья
прикладываются къ ранамъ.

Медовникъ, см. Запникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa* L.).

Медовникъ, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).

Медовникъ, см. Медуница (*Spiraea ulmaria* L.).

Медовникъ, см. Бѣлоголовка (*Trifolium montanum* L.).

Медовникъ, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Медовникъ бѣлый, см. Клеверъ бѣлый (*Trifolium repens* L.).

Медовый башмачекъ, см. Мелисса лекарственная (*Melissa officinalis* L.).

Медовый цвѣтъ, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Медокъ, см. Клеверъ бѣлый (*Trifolium repens* L.).

Медоука, см. Запникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa* L.).

Медунецъ, см. Черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris* L.).

Медуника, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

Медуника, см. Легощница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).

Медуника, см. Земляные орѣшки (*Spiraea filipendula* L.).

Медуника, см. Медуница (*Spiraea ulmaria* L.).

Медуница (*Spiraea ulmaria* L.). Фармацевтическое названіе:
Ulmaria, s. *Regina pratorum*, s. *Barba caprina* (*Radix et Flores*). Ба-
гула, Багульникъ (Олонокъ, Вологодск.), Богула, Батеръ, Боро-
нень (Курск., Мизг.), Бѣлоголовка (Арх.), Бѣлоголовинникъ (Алт.),
Бузина болотная (Полтав.), Бузина дикая, Бузовый цвѣтъ,
Бѣлоголовецъ, Бѣловая (Олон.), Бурьянъ (Ниж.), Выльникъ
(Костр., Нижегород.), Бракобыль (Олон.), Брыболотникъ (Волын.),
Вѣтровникъ (Гродн.), Вѣяло или Вязова тр., Вязовая трава,
Горна (Новг., Арх., Олон.), Донникъ (Сиб., Волог., Вятск.,
Костр.), Донникъ бѣлый (Моск.), Жердовникъ (Вятск.), Журо-
донникъ, Журанъ, Живокооть, Застаца (Олон.), Жимолость
козья, Ивановъ цвѣтъ, Ламетри, Калика (Малор.), Капа рѣчная
(Костр.), Цабычи конопельки, Кійло, Костица (Олон.) Лабазникъ,
Лабазна, Лобась, Лобасникъ, Листоватая трава (Арх.), Дикій
листь (Вор.), Дикая малина (Кал.), Малиновка дикая (Моск.),
Мокрый маличникъ, Манъ-цвѣтъ (Олон.), Мареникъ (Каз.), Ме-
дуница (Малор.), Медуника, Медунка (Сарат.), Медуничникъ,
Медовникъ (Костр., Новг.), Огуречникъ, Огуречникъ благовоп-
ный, Ирошникъ (Малор.), Огірешникъ (Малор.), Огорошникъ
(Малор.), Парило (Гродн., Мит., Киев.), Паркидло (Гродн.), Пла-
кутъ-трава (Вор., Тар.), Раповникъ, Храповникъ, Рямжа (Арх.),
Скрыпій, Слюченикъ (Екат.), Собачья трава (Олон.), Сороко-
приточная (Олон.), Таволга болотная, Таволга плимная, Таво-
ложникъ, Топкареа, Царница луговъ, Чертогрызъ. Многолѣтнее

травянистое растение из семейства «розовцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель прямостоящій, выш. 14—35½ вершк. Листья прерывисто-перистые, о 5—9 пальчатыхъ листочкахъ, изъ которыхъ конечный крупнѣе остальныхъ, 3—5-тилопастный. Многочисленные мелкіе бѣлые душистые цвѣты собраны щитковидною метелкой; цвѣтоложе вогнутое; чашечка простая, 5-тираздѣльная, лепестковъ 5. Тычинокъ 20—40, прикрѣпленныхъ вдоль жилокъ чашечки; пестики при основаніи утопченныя, послѣ цвѣтенія отпадающія; пестикъ состоитъ изъ 10 спирально-скрученныхъ почти голыхъ плодolistиковъ; рыльце головчатое. Плодъ состоитъ изъ голыхъ сѣмянокъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на влажныхъ лугахъ и между кустарниками. Цвѣты медуницы обладаютъ приятнымъ, напоминающимъ горькій миндаль, запахомъ; корни и листья имѣютъ горько-вяжущій, а цвѣты сладковато-вяжущій вкусъ. Цвѣты и листья, высушенные и настоенные въ водѣ, доставляютъ родъ чая, на вкусъ довольно приятнаго; для запаха и вкуса ихъ нерѣдко прибавляютъ также къ различнымъ винамъ. Измолотые цвѣты съ сѣменемъ медуницы кладутся для запаха въ нюхательный табакъ. Изъ листьевъ вываривается желтозеленая краска, которую, съ примѣсью желѣзнаго купороса, можно обратить въ черную и которая вообще довольно хорошо садится на разныя ткани. Корни нерѣдко употребляются для дубленія кожъ.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Прежде медуница употреблялась въ медицинѣ отъ поноса, кровотеченій, бѣлей и истерическихъ судорогъ, теперь врачами растение это совершенно оставлено. Въ народѣ до сихъ поръ медуница часто употребляется. Отваръ ея принимаютъ отъ боли горла, груди, отъ ломоты, отъ укушенія змѣй и бѣшеныхъ животныхъ и отъ поноса. Сухимъ цвѣтомъ присыпаютъ обваренныя мѣста. Для остановки кровотеченія растение жгутъ и пепломъ присыпаютъ кровоточащія мѣста. Въ Олонецкой губерніи растение употребляютъ отъ зубной боли. Сухой цвѣтъ прибавляютъ въ чай или просто нюютъ, какъ чай. Отваромъ моютъ голову, чтобы росли волосы. Подъ именемъ дикой рябины, или раповника, медуница рекомендуется, какъ средство противъ водобоязни. Для этого собираютъ только что распустившіеся цвѣты, сушатъ ихъ на солнцѣ, растираютъ въ порошокъ и сохраняютъ въ хорошо закупоренныхъ банкахъ. Порошокъ этотъ даютъ людямъ, страдающимъ водобоязнью, отъ 2-хъ до 3-хъ разъ въ день, посыпая его на хлѣбъ.

Въ Швеціи размятую траву прикладываютъ лошадямъ при воспаленіи копытъ, и натираютъ ею улы внутри, чтобы пчелы лучше собирались.

Медуница, см. Селезеночникъ очереднолистный (*Chrysosplenium alternifolium* L.).

Медуница, см. Зябра (*Galeopsis versicolor* L.).

Медуница, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).

Медуница, см. Донникъ бѣлый (*Melilotus alba* Desl.).

- Медуница, см. Вшивица болотная (*Pedicularis palustris* L.).
- Медуница, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).
- Медуница, см. Земляные орѣшки (*Spiraea filipendula* L.).
- Медуница, см. Клеверъ бѣлый, ползучій (*Trifolium repens* L.).
- Медуница лѣсная, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).
- Медуница полевая, см. Румянка лекарственная (*Anchusa officinalis* L.).
- Медуничникъ, см. Зябра (*Galeopsis versicolor* L.).
- Медуничникъ, см. Чина весенняя (*Orobus vernus* L.).
- Медуничникъ, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).
- Медуничникъ, см. Медунка (*Spiraea ulmaria* L.).
- Медуничникъ, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).
- Медуничникъ полевой, см. Запникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa* L.).
- Медунка, см. Синякъ обыкновенный (*Echium vulgare* L.).
- Медунка, см. Синякъ красный (*Echium rubrum* L.).
- Медунка, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).
- Медунка, см. Люцерна серповидная (*Medicago falcata* L.).
- Медунка, см. Иванъ да Марья (*Melampyrum nemorosum* L.).
- Медунка, см. Кадило пахучее (*Melittis melissophyllum* L.).
- Медунка, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq.).
- Медунка, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).
- Медунка, см. Медунка (*Spiraea ulmaria* L.).
- Медунка собачья, см. Чернокорень обыкновенный (*Cynoglossum officinale* L.).
- Медунки, см. Шалфей луговой (*Salvia pratensis* L.).
- Медунчики, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).
- Медуныи, см. Чернокорень обыкновенный (*Cynoglossum officinale* L.).
- Медучки, см. Шпажникъ обыкновенный (*Gladiolus communis* L.).
- Медяникъ } см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).
- Медяникъ } см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).
- Медяникъ, см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq.).
- Медяникъ, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).
- Медяникъ зелье } см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq.).
- Медяникъ зилле } см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq.).
- Медянички } см. Первоцвѣтъ лекарственный (*Primula officinalis* Jacq.).
- Медянки, см. Иванъ да Марья (*Melampyrum nemorosum* L.).
- Междуперсица, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).
- Межевая трава, см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.).
- Межевникъ, см. Синякъ обыкновенный (*Echium vulgare* L.).

Межеумокъ, см. Черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris* L.).

Межовикъ, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).

Межперстница, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).

Межперстница, см. Голубки обыкновенные (*Aquilegia vulgaris* L.).

Мелисса, см. Шандра (*Elsholtzia cristata* Willd.).

Мелисса, см. Мелисса лекарственная (*Melissa officinalis* L.).

Мелисса аптекарская } см. Мелисса лекарственная (*Melissa officinalis* L.).

Мелисса индѣйская } см. Мелисса лекарственная (*Melissa officinalis* L.).

Мелисса лекарственная (*Melissa officinalis* L.). Фармацевтическое названіе: *Melissa citrata* s. *hortensis*, s. *Citronella* s. *Citronella* (*Herba*). Мелисса лекарствен. имѣть слѣдующія названія: Кадило (Вол.), Матка, Маточникъ, Мятка, Мята лимонная, Медовка, Медовый баннмачекъ, Мелисса, Мелисса аптекарская, Мелисса индѣйская, Мелисса маточная, Цитронъ-мелисса (въ торговл.), Пчельникъ-трава, Пчелиная трава, Палочная трава, Пчельный листъ, Роевникъ, Цитронная трава. Мелисса—многолѣтнее травянистое коротко-пушистое растение изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное въ Южной Европѣ, встречающееся въ Крыму на Кавказѣ. Стебель прямой, вѣтвистый, выш. 14—22" вершковъ; листья черешковые, яйцевидные, городчато-пильчатые; бѣлые душистые цвѣты сидятъ по 3—5 въ углахъ яйцевидныхъ прицвѣтниковъ и всѣ обращены въ одну сторону. Чашечка колокольчатая, съ 13 жилками, двугубая; верхняя губа ея широкая съ тремя маленькими зубцами, нижняя губа—2-храздѣльная, зубцы ея треугольно-ланцетные. Вѣнчикъ вдвое превышаетъ чашечку, согнутъ нѣсколько вверхъ и съ двугубымъ отгибомъ; верхняя губа выемчатая, нижняя—3-хлопастная, съ болѣе широкою среднею лопастью. Тычинокъ 4, двусильныхъ, т. е., паружныхъ изъ нихъ длиннѣе; гнѣзда пыльниковъ расходящіеся. Завязь верхняя, 4-хлопастная, 4-гнѣздная, съ однимъ столбикомъ, оканчивающимся 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ распадается на 4 овальныхъ гладкихъ орѣшка. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Произростаетъ въ гористыхъ странахъ. Разводится въ садахъ, какъ благовонное медоносное и лекарственное растение. Все растение до цвѣта издаетъ пріятный лимонный запахъ, который во время цвѣта и послѣ него становится тяжелымъ. Вкусъ его ароматическій, горьковатый. Растеніемъ перфдо натирають внутренность ульевъ для осажденія роевъ. Для врачебнаго употребленія собирають траву до цвѣта, такъ какъ въ это время она обыкновенно душистѣе и сильнѣе. (Табл. XXIX, фиг. 158.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Листья мелиссы собираются въ началѣ цвѣтенія; они содержатъ въ себѣ бѣдно-желтое эфирное масло; пріятнаго запаха. У древнихъ грековъ, римлянъ и у вра-

чей среднихъ вѣковъ мелисса была въ большомъ почетѣ, какъ средство, возбуждающее веселость и поднимающее дѣятельность нервной системы. Въ наше время извѣстный клиницистъ Труссо также рекомендуетъ это средство при невралгій и судорогахъ, Холодный чай мелиссы, приготовленный изъ свѣжихъ цвѣтовъ, имѣетъ освѣжающее дѣйствіе, горячій дѣйствуетъ потогонно. По своему дѣйствію на желудокъ, мелисса имѣетъ много общаго съ мятой: она устраняетъ колики въ животѣ, зависшія отъ скопленія газовъ.

Врачи крайне рѣдко въ настоящее время назначаютъ мелиссу; въ народѣ же она имѣетъ большое примѣненіе. Чай изъ мелиссы въ народѣ пьютъ отъ болей въ животѣ, отъ сердцебіенія, отъ истерическихъ припадковъ, головокруженія, обмороковъ, блѣдной немочи, болей послѣ родовъ, задержки мѣсячныхъ очищеній, при подагрѣ и ломотѣ. Отъ задержки мѣсячныхъ очищеній крестьянки ставятъ ноги въ ведро съ теплымъ отваромъ мелиссной травы и пьютъ отваръ по 3—4 стакана въ день.

Въ аптекахъ продается мелиссное масло и мелисный спиртъ. Мелиссное масло дается отъ одной до 3-хъ капель на кусочекъ сахара съ гофманскими каплями или бѣлымъ виномъ два-три раза въ день отъ истерическихъ обмороковъ и общей нервной слабости. Мелисенымъ спиртомъ натираютъ параличныя конечности и болящія отъ ревматизма суставы. Спиртъ этотъ запахомъ своимъ отгоняетъ комаровъ, также онъ употребляется отъ моли. Внутрь спиртъ этотъ иногда (крайне рѣдко) дается по чайной ложкѣ съ простою водою отъ обморочнаго состоянія.

Мелисса паточная, см. Мелисса лекарственная (*Melissa officinalis* L.).

Мелисса спиртовая, см. Душевикъ остролистный (*Calamintha Aclinos Benth.*).

Мелисса турецкая, см. Маточникъ (*Dracoscephalum moldavica* L.).

Мелкіе цвѣты, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea millefolium* L.).

Мелкій цвѣтокъ, см. Звѣздчатка злачная (*Stellaria graminea* L.).

Мелколепестникъ, см. Мелколепестникъ ѣдкій (*Erigeron acris* L.).

Мелколепестникъ ѣдкій (*Erigeron acris* L.). Фармацевтическое названіе: мелколепестника ѣдкаго *Conyzamajoris coerulea*. Богатника (Тверск., Новг.), Богатка (Пет., Иск.), Божанки (Пет.), Бѣлоголовъ (Пет.), Блошникъ, Блошница, Глоточная трава (Орл.), Губушникъ (Екат.), Ивановы гродники (Черниг.), Даля (Гродн.), Загадка (Могил., Черн., Малор.), Звѣздохорочникъ, Злынка (Малор.), Землеухъ (Вор.), Катокъ (Вор.), Костоломъ (Костр.), Купала (Могил.), Купалка (Минск.), Летучка (Ниж.), Листъ семибратскій (Екат.), Мелколепестникъ, Неувяда (Даль), Опуховая (Вятск.), Приметь, Пуховникъ (Вор.), Пушки (Смол.), Синиолой (Могил.), Трава острая, Лисы ушки (Олон.), Чихотная, Червивая (Уфим.). Мелколепестникъ ѣдкій представляетъ изъ себя двулѣтнее или многолѣтнее шершаво-пушистое растеніе

изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное почти по всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель слабо-вѣтвистый, выш. 3½—14 вершк.; листья линейно-ланцетные, цѣльнокрайніе, прикорневые—черешковые. Корзинки мелкія, въ щиткообразной или удлиненной метелкѣ, съ колокольчатой или полушаровидной оберткой, съ плоскимъ цвѣто-ложемъ, съ краевыми язычковыми—женскими, блѣдно-лиловыми цвѣтами, расположенными въ нѣсколько рядовъ; внутренніе цвѣты трубчато-нитевидные, обоюдоловые. Тычинокъ 5, нити ихъ свободны, пыльники-же спаяны въ трубочку, черезъ которую проходитъ столбикъ, оканчивающійся 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Завязь нижняя, одногнѣздная. Плодь—сплюснутая пушистая сѣмянка съ хохолкомъ. Цвѣтетъ съ мая до августа. Растетъ на песчаныхъ и безплодныхъ мѣстахъ, на поляхъ, лугахъ и около дорогъ. Это растеніе играло прежде большую роль въ колдовствѣ и знахарствѣ.

Мельничникъ, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Мерва, см. Туювое дерево (*Morus alba* L.).

Мересклетина, см. Бересклетъ европейскій (*Evonymus europaeus* L.).

Меркуея, см. Желтуха (*Senecio Jacobea* L.).

Мертвая голова, см. Мандрагора (*Atrapa Mandragora* L.).

Мертвое зеле, см. Комачьи ланки (*Antennaria dioica* Gärtn.).

Метелишникъ, см. Клоповникъ (*Lepidium ruderae* L.).

Метелики, см. Торица полевая (*Spergula arvensis* L.).

Метелица, см. Метлица полевая (*Agrostis Spica Venti* L.).

Метелка, см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.).

Метелка, см. Клоповникъ (*Lepidium ruderae* L.).

Метелка царская, см. Гулявникъ лекарственный (*Sisymbrium officinale* L.).

Метелочка, см. Метлица полевая (*Agrostis Spica Venti* L.).

Метелочки, см. Клоповникъ (*Lepidium ruderae* L.).

Метельникъ, см. Колосокъ пахучій (*Anthoxanthum odoratum* L.).

Метла, см. Метлица полевая (*Agrostis Spica Venti* L.).

Метла, см. Вѣшникъ наземный (*Calamagrostis epigeios* Roth.).

Метла, см. Овсяница высокая (*Festuca elatior* L.).

Метла, см. Боръ развѣсистый (*Milium effusum* L.).

Метла, см. Мятликъ луговой (*Poa pratensis* L.).

Метла, или мышій тернъ (*Ruscus aculeatus* L.). Игла, Иглина.

Иглина простая, Иглина воложская, итальянская. Царскій вѣшникъ, Камышиникъ трава, Острокровъ большой, Мышья вежа. Вѣчно-зеленѣющій кустарникъ изъ семейства «лилейныхъ» (*Liliaceae* Juss.), произрастающій въ южной Европѣ и весьма похожій на миртовый кустъ, почему и называется иногда дикимъ миртомъ; вѣтви по вѣшнему виду совершенно напоминаютъ листья, оканчиваются шишомъ и отличаются отъ листьевъ тѣмъ, что выношаютъ изъ себя цвѣты, которые выходятъ на серединѣ этихъ кажущихся листьевъ. Культивируется у насъ только въ садахъ. Корень растенія прежде употреблялся въ

медицины, какъ мочегонное и растворяющее средство, теперь онъ оставленъ совсѣмъ.

Метла лѣсная, см. Вѣйникъ наземный (*Calamagrostis epigelos* Roth.).

Метлика, см. Вѣйникъ наземный (*Calamagrostis epigelos* Roth.).

Метлика, см. Просо колосистое, или гребенчатое (*Panicum Crus Galli* L.).

Метлика, см. Мятликъ обыкновенный (*Poa trivialis* L.).

Метлика } см. Тростникъ обыкновенный (*Arundo Phragmi-*

Метлина } *tes* L.).

Метлица, см. Метлица полевая (*Agrostis Spica Venti* L.).

Метлица, см. Тростникъ обыкновенный (*Arundo Phragmites* L.).

Метлица полевая (*Agrostis Spica Venti* L.). Вѣховласникъ (Пет.), Костра (Пек.), Метла, Метлина и всѣ производныя (въ б. ч. Россіи), Просянка, Печуй - вѣтеръ, Пухъ (Пек.), Пухъ - трава. Одноцвѣтное травянистое растение изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенное въ большей части Европы и почти во всей Россіи выш. 7—22½ вершк. Листья плоскіе, линейные, съ удлиненнымъ язычкомъ. Метелка много-вѣтвистая, во время цвѣтенія раскидистая, съ тонкими нитевидными вѣтвями и очень мелкими зелеными или красновато-бурыми одноцвѣтными колосками. Наружная створка (одна пхъ нижнихъ частей колоска) короче и уже внутренней; наружная пленка (каждый цвѣтокъ въ колоскѣ снабженъ 2-мя пленками, или цвѣточными чешуями—наружной и внутренней) несетъ близь верхушки очень длинную, въ 3—4 раза длиннѣе колоска, остъ. Тычинокъ 3; завязь одногнѣздная, односемянная, съ 2 столбиками; плодъ—зерновка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Обременительная сорная трава, произрастающая на песчаныхъ мѣстахъ, въ посявахъ и на поляхъ. (Рис. 179.)

Метличка, см. Костеръ ржаной (*Bromus secalinus* L.).

Метлюг(к)ъ, см. Метлица полевая (*Agrostis Spica Venti* L.).

Метлюгъ, см. Трясушка средняя (*Briza media* L.).

Метлюгъ, см. Костеръ ржаной (*Bromus secalinus* L.).

Метлюкъ черный, см. Подмаренникъ мягкій (*Galium Mollugo* L.).

Метлякъ, см. Метлица полевая (*Agrostis Spica Venti* L.).

Метлякъ }

Метлячки } см. Лютины глазки (*Viola tricolor* L.).

Метлячокъ }

Мечъ-трава, см. Кирпачень обыкновенный (*Aristolochia Clematitis* L.).

Мечъ, см. Шпажникъ обыкновенный (*Gladiolus communis* L.).

Мечевникъ, см. Тростникъ обыкновенный (*Arundo Phragmites* L.).

Мечникъ-трава, см. Шпажникъ обыкновенный (*Gladiolus communis* L.).

Мизиночникъ, см. Ежа сборная (*Dactylis glomerata* L.).

Микифорцы, см. Ленъ дикий (*Linaria vulgaris* Mill.).

Миколайки } см. Синеголовникъ плосколистный (*Eryngium pla-*
Миколайци } *num* L.).

Миколайці, см. Гнѣздовка обыкновенная (*Neottia nidus avis* Rich.).

Миколайчики, см. Синеголовникъ плосколистный (*Eryngium planum* L.).

Милолоть, см. Донникъ бѣлый (*Mellilotus albus* L.).

Милость Божія, см. Авранъ лекарствен. (*Gratiola officinalis* L.).

Милюзель, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).

Милюзелень, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).

Мина, см. Бѣлоголовка (*Trifolium montanum* L.).

Минголовъ, см. Желтуха (*Senecio Jacobea* L.).

Миндаль, см. Миндаль обыкновенный (*Amygdalus communis* L.).

Миндаль обыкновенный (*Amygdalus communis* L.). Амигдаль, Миндаль, Миндальное дерево. Миндальные орѣхи, Мыгдаль Малор., Орѣхъ. Миндаль обыкновенный представляетъ изъ себя дерево выш. 3—5 сажень, изъ семейства «миндальныхъ» (*Amygdalaceae*), родомъ изъ средней Азии, но давно уже воздѣлываемое во всей южной Европѣ, въ Россіи на восточномъ берегу Чернаго моря, въ Закавказьѣ, гдѣ растетъ также въ полудикомъ состояніи, на южномъ берегу Крима и на югѣ Бессарабіи. Листья ланцетовидные, очередные, цильчатые, черешковые, съ отпадающими прилистниками. Цвѣты бѣлые или розовые, почти сидячіе, появляющіеся до распусканія листьевъ. Чашечка колокольчатая, снаружи красно-бурая, 5-листная; вѣнчикъ 5-тилепестный; многочисленныя тычинки прикрѣплены къ краямъ вогнутого цвѣтоложа. Завязь свободная (не сросшаяся съ цвѣтоложемъ), одногнѣздная. Плодъ—яйцевидная сжатая войлочнo-волосистая, съ суховатою, почти кожистою мякотью, сѣмянка съ 1—2 сѣменами; поверхность косточки усѣяна ямками. Цвѣтетъ рано весною. Различаютъ двѣ разновидности: горькій и сладкій миндаль. Сѣмена употребляются въ хозяйствѣ, въ медицинѣ, въ кондитерскомъ дѣлѣ и въ парфюмерномъ производствѣ. Сѣмена горькаго миндаля содержатъ вещество, дающее синильную кислоту, которая считается въ концентрированномъ состояніи однимъ изъ сильнѣйшихъ ядовъ. (Табл. XXIX, фиг. 161 и 162.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Сладкіе миндаль безъ запаха, пріятнаго, мягкаго сладковато-маслянистаго вкуса, содержатъ жирное миндальное масло, растительное молоко и сахаръ; они употребляются въ медицинѣ, какъ очень хорошее обволакивающее средство, или ввидѣ молока, приготовляемаго изъ зеренъ, или ввидѣ чистаго миндальнаго масла. При приготовленіи масла отъ зеренъ остаются миндальные отруби, которые въ отварѣ служатъ хорошимъ обмываніемъ для кожи. Горькіе миндали при раздавливаніи даютъ особый запахъ, имѣютъ очень горькій ягучій вкусъ и, кромѣ миндальнаго масла, другое эфирное масло, содержащее въ себѣ синильную кислоту и называемое амигдалиномъ. Амигдалинъ—очень ядовитое вещество, точно такъ-же, какъ и содержащее его горькіе миндали. Существуетъ въ медицинско-й литературѣ много указаній на случаи отравленія людей и живот-

ныхъ, которые съѣдали горькіе миндали или выжатое изъ нихъ масло. При отравленіи синильной кислотой или горькими миндалями, водой горькихъ миндалей, масломъ горькихъ миндалей, персиковыми и вишневыми наливками (косточки персиковъ и вишенъ тоже содержатъ синильную кислоту) больной теряетъ сознаніе, у него дѣлается синюха, судороги, изъ рта появляется сильный миндальный запахъ, зрачки расширяются, сердце быстро слабѣетъ, такъ что пульсъ становится не ощутимымъ, конечности холодѣютъ, и смерть наступаетъ при явленіяхъ общаго паралича. До прибытія врача больному дается рвотное — ипекакуана, больного сажаютъ въ теплую ванну и въ ней обливаютъ ему позвоночникъ холодною водою и дѣлаютъ искусственное дыханіе. Сладкій миндаль не ядовитъ и употребляется въ пищу, также служитъ для приготовленія лекарственныхъ веществъ. Изъ сѣмянъ миндаля готовится миндальное молоко, или такъ называемый оршадъ, который хорошо дѣйствуетъ, какъ болеутоляющее средство, при боляхъ въ животѣ и поносѣ и при болѣзненныхъ позывахъ къ мочеиспусканію. Его также даютъ кормилицамъ для увеличенія у нихъ отдѣленія молока. Для приготовленія миндальнаго молока изъ сѣмянъ, ихъ толкутъ въ ступкѣ, разводятъ водою и выжимаютъ черезъ чистое полотняное полотенце; миндальная эмульсія изъ масла готовится такъ же, какъ касторовая, съ гуммиарабикомъ; она не такъ легко портится, какъ эмульсія изъ сѣмянъ, но менѣе пріятна на вкусъ. Чистое миндальное масло дается дѣтямъ внутрь вмѣсто кастороваго; дѣтямъ даютъ по чайной ложкѣ, взрослые принимаютъ его столовыми ложками. За послѣднее время миндальное масло прописывается врачами людямъ, страдающимъ камнями въ печени. Принимаютъ по десертной ложкѣ 2—3 раза въ день чистое миндальное масло или же пополамъ съ водою.

Самый легкій препаратъ изъ горькихъ миндалей — это находящаяся въ продажѣ вода горькихъ миндалей. Принятая внутрь взрослыми въ количествѣ 10—15 капель, она успокаиваетъ боли въ желудкѣ и также уменьшаетъ приступы кашля, дѣтямъ вода горькихъ миндалей также дается. Ее прибавляютъ въ миндальную эмульсію или даютъ съ содой, а также съ отваромъ ипекакуаны: на 2 унці (60 грм.) въ микстуру прибавляется отъ 3-хъ до 20-ти капель, смотря по возрасту; дѣтямъ до года въ сутки даютъ не болѣе одной—двухъ капель, т. е., на пріемъ не болѣе $\frac{1}{4}$ капли. Миндальное масло служитъ, кромѣ того, для приготовленія различныхъ мазей.

Миндаль степной, см. Бобовникъ (*Amygdalus nana* L.).

Миндальное дерево } см. Миндаль обыкновенный (*Amygdalus*

Миндальные орѣхи } *communis* L.).

Мирра, см. Посконникъ конопляный (*Eupatorium cannabinum* L.).

Миръ, см. Подмаренникъ желтый (*Gallium verum* L.).

Миронникъ, см. Дубровка (*Veronica chamaedrys* L.).

Мирсина }

Мирсиныя вѣтви } см. Миртъ (*Myrtus communis* L.).

Мирта болотная, см. Верескъ болот. (*Cassandra calyculata* G. et D.)

Мирта болотная, см. Восковникъ (*Myrica Gale L.*).

Миртъ (*Myrtus communis L.*). Вѣтви мирснныя, Вѣтви миртовыя, Мирсина. Вѣчно-зеленѣющій, выш. отъ 1½ арш., кустарникъ изъ семейства «миртовыхъ» (*Myrtaceae*), съ яйцевидно-ланцетными кожистыми листьями и опадающими прилистниками, съ красивыми обильными душистыми цвѣтами. Произрастаетъ на югѣ Европы, преимущественно около Средиземнаго моря. Культивируется у насъ какъ комнатное и садовое растеніе. Миртовыя ягоды употреблялись древними и какъ лекарство, и какъ приправа къ кушаньямъ, а на цвѣтахъ настаивалась вода, которой приписывалось свойство возвращать утраченную красоту. Въ древности растеніе это, символъ красоты и молодости, считалось священнымъ и было посвящено богинѣ Афродитѣ, или Венерѣ; вѣтки миртовые, какъ символъ мира, также возлагались древними на героевъ.

Миртовыя вѣтви, см. Миртъ (*Myrtus communis L.*).

Миспель нѣмецкій, см. Мушмула обыкновенная (*Mespilus germanica L.*).

Митва, см. Хохлатка плотная (*Corydalis solida Smith.*).

Митлина, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense L.*).

Митліця, см. Костеръ ржаной (*Bromus secalinus L.*).

Митліця, см. Овсяница высокая (*Festuca elatior L.*).

Михунка } см. Вишня жидовская (*Physalis Alke-*
Михунковы ягоды } *kengi L.*)

Мичка, см. Вѣлоусъ обыкновенный (*Nardus stricta L.*).

Мишей }
Мишейя } см. Щетинникъ зеленый (*Setaria viridis Beauv.*)
Мишій }

Мишочки, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris Moench.*).

Младенческая трава, см. Ленъ дикий (*Linaria vulgaris Mill.*).

Младенческая трава, см. Запникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa L.*).

Младенческая трава, см. Фіалка опушенная (*Viola hirta L.*).

Младенчица, см. Тайникъ овальный (*Listera ovata R. Br.*).

Младенчица гнѣздичная, см. Гнѣздовка обыкновенная (*Neotia nidus avis Rich.*).

Млекосѣдъ, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum L.*).

Млечай, см. Кульбаба осенняя (*Leontodon autumnalis L.*).

Млечникъ, см. Млечникъ морской (*Glaux maritima L.*).

Млечникъ, см. Обильника обыкновенная (*Hippophaë rhamnoides L.*).

Млечникъ, см. Истодъ обыкновенный (*Polygala vulgaris L.*).

Млечникъ морской (*Glaux maritima L.*). Фармацевтически названіе: *Glaux*. Млечникъ, Молочная трава, Морская молочная трава, Молочникъ, Млечное зелье. Млечникъ морской ест маленькая многолѣтняя, выш. всего 1—3 вершк., вѣтвиста голубоватая травка изъ семейства «первоцвѣтныхъ» (*Primulaceae Vent.*), распространенная почти во всей Европѣ и в Россіи. Листья супротивные, сидячіе, эллиптические, съ раз

сѣянными бурыми точечками. Мелкіе цвѣты сидятъ по одному въ углахъ листьевъ: чашечка розоватая, колокольчатая, 5-тило-
пастная, съ яйцевидными тупыми лопастями. Вѣличка нѣтъ.
Тычинки прикрѣплены къ основанію чашечки, чередуются съ
ея лопастями и одинаковой съ ними длины. Завязь верхняя,
одногнѣздная, съ осевымъ сѣмяноскоемъ и однимъ столбикомъ
съ головчатымъ рыльцемъ. Плодъ — яйцевидно-шаровидная
5-тистворчатая коробочка. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. Растетъ на
обыкновенно солончаковыхъ мѣстахъ и по морскимъ берегамъ.
(Рис. 180.)

Млечный корень, см. Истодъ обыкновенный (*Polygala vulgaris* L.).

Млечное дерево, см. Млечникъ морской (*Glaux maritima* L.).

Млечикотина, см. Мятликъ луговой (*Poa pratensis* L.).

Млочная, см. Василистникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).

Многоглазое зелье } см. Рута горная (*Asplenium Ruta mu-*
Многоголовникъ } *garia* L.).

Многокоренникъ, см. Ряска маленькая (*Lemna minor* Schl.).

Многомлечникъ } см. Истодъ обыкновенный (*Polygala vulga-*
Многомлечница } *ris* L.).

Многоножка, см. Многоножка обыкновенная (*Polypodium vul-*
gare L.).

Многоножка, см. Многоножка тройчатая (*Polypodium dryo-*
pteris L.).

Многоножка, см. Кочедыжникъ коричневый (*Asplenium Tricho-*
manes L.).

Многоножка обыкновенная (*Polypodium vulgare* L.). Фарма-
цевтическое названіе многоножки: *Polypodium, s. Follicula dulcis*.
Ангельская сладость, Боромецъ дикій, Зерликъ, Звѣробой
каменный (Алт.), Папоротникъ, Папоротникъ каменный, Тапо-
ротъ (Вел. и Мал. Росс.), Папоротникъ сладкій (Приаз. кр.),
Папоротникъ солодковый, Сладкій корень (Перм.), Славикъ,
Соловка малая трава. Многоножка обыкновенная представляетъ
изъ себя многолѣтнее травянистое папоротниковое растеніе изъ
семейства «полиподіевыхъ» (*Polypodiaceae* R. Br.), распростра-
ненное въ горныхъ странахъ сѣвернаго полушарія, на утесахъ
Крыма, Кавказа и Урала. Корневище ползучее, тѣсно по-
крытое ланцетными бурыми пленками и несущее 2 ряда
 листьевъ; черенки ихъ обыкновенно короче листовой пла-
стинки, почти кожистой, глубоко-перисто-раздѣльной, сохра-
няющейся на зиму. Кучья спорангіевъ (т. е., мѣшечки, содер-
жащіе споры), расположены въ два ряда вдоль главнаго нерва
долей листа. Растетъ на тѣнистыхъ каменистыхъ мѣстахъ. Споры
образуются осенью.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ многоножки обыкновенной
крайне ограничено и извѣстно только въ народѣ. Корень отвари-
ваютъ въ водѣ (на фунтъ воды берется 1 унцъ (30 грм.) корня) и
пьютъ отъ болѣзней печени, отъ англійской болѣзни, отъ цынги,
ломоты въ суставахъ, отъ кашля, удущья и другихъ грудныхъ

болѣзней: толченый корень также принимаютъ въ порошокъ: на пріемъ одну драхму (4,0 грм.). Толченую траву прикладываютъ на раны. Въ Малороссіи отваръ пьютъ отъ глистовъ.

Многоножка тройчатая (*Polypodium dryopteris* L.). Грыжная трава (Арх., Мерк., Костр.), Грудница (Смол.), Жаломъ, Журавлиникъ (Олон.), Исплекъ (Перм.), Истекъ (Олон.), Каменная трава, Каменный папороть, Папоротникъ дубовый, Костыкъ-трава (Олон.), Сухоломъ (Смол.), Язвенная трава (Волог.). Этотъ видъ есть многочислѣе травянистое папоротниковое растение изъ семейства «полиподіевыхъ» (*Polypodiaceae* R. Br.), распространенное въ Европѣ, въ сѣверной Азіи, сѣверной Америкѣ, во всей сѣверной и средней Россіи. Корневище ползучее, съ 2 рядами листьевъ. Листья дважды-перисто-разсѣченные, съ перисто-раздѣльными долями. Первичные сегменты крупныя, такъ что листья кажутся тройчатыми. Кучки спорангіевъ (т. е. особые мѣшечки со спорами) расположены въ 2 ряда вдоль главнаго нерва долей листа. Растетъ въ тѣнистыхъ листовыхъ и хвойныхъ лѣсахъ. (Рис. 182.)

МЕДИЦИНСКАЯ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Многоножка тройчатая известна, какъ народное средство. Въ Олонецкой губерніи ею обмываются и пьютъ отъ чесотки. Въ Пермской губерніи многоножку тройчатую даютъ лошадямъ въ хлѣбъ и поятъ, когда онѣ свертываютъ плечо, о чемъ говорятъ: «испелчилось», откуда и названіе растенія «исплекъ».

Многopлодная трава, см. Аржанецъ степной (*Phleum Boeheimeri* Wib.).

Многоцвѣтъ, см. Вязель разноцвѣтный (*Coronilla varia* L.).

Мята кошачья, см. Котовникъ кошачій (*Nepeta Cataria* L.).

Мята плавная, см. Мята полевая (*Mentha arvensis* L.).

Могильная трава, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris* Moench.).

Могильная трава, см. Рута дикая (*Peganum Harmala* L.).

Могильная трава, см. Яромолость (*Zygophyllum Fabago* L.).

Могильникъ, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gärtn.).

Могильникъ, см. Марьянникъ лѣсной (*Melampyrum silvaticum* L.).

Могильникъ } см. Барвинокъ малый (*Vinca minor* L.).

Могильница }

Могучникъ, см. Гусиная лапка (*Potentilla anserina* L.).

Могучникъ пятилиственный, см. Лапчатка ползучая (*Potentilla reptans* L.).

Могущикъ большой, см. Травицать водяной (*Geum rivale* L.).

Могущникъ, см. Гусиная лапка (*Potentilla anserina* L.).

Модень, см. Селезеночникъ очереднолистный (*Chrysosplenium alternifolium* L.).

Модренецъ, см. Васильки полаты (*Delphinium consolida* L.).

Модрина, см. Лиственница европейская (*Larix europaea* Dc.).

Можжевель } см. Можжевельникъ обыкновенный (*Juniperus communis* L.).

Можжевельникъ }

Можжевельникъ }

Можжевельникъ донской, см. Можжевельникъ казацкій (*Juniperus sabina* L.).

Можжевельникъ испанскій, см. Можжевельникъ красный (*Juniperus Oxycedrus* L.).

Можжевельникъ казацкій (*Juniperus sabina* L.). Фармацевтическое названіе: *Sabina*. Арча. Арча, Ахра, Артышъ, Верескъ, Верескъ лѣсной (Приарг. кр.), Кровогонъ, Можжуха казацкая, Можжевельникъ донской или Донникъ (Екат.). Мѣсячникъ, Сесеновое дерево, Сабина. Можжевельникъ казацкій представляетъ изъ себя вѣчно-зеленый кустарникъ, выш. 1½ арш.—3 сажень, изъ семейства «хвойныхъ» (*Coniferae* Juss.) и подсемейства «кипарисовыхъ» (*Cupressineae* Rich.), распространенный въ средней и южной Европѣ, въ южной Россіи, на Кавказѣ и Алтаѣ, съ неприятнымъ одуряющимъ запахомъ. Листья большей частью чешуйчатые, рѣже иглообразные, расположены перекрестно-парно или кольцами, по 3 въ каждомъ кольцѣ. Цвѣты двудомные, мужскіе — продолговатые, состоящіе изъ 2—3 членныхъ колець, образованныхъ тычинками, несущими чешуеобразный щитокъ съ 3—6 шаровидными пыльцевыми мѣшечками. Женскія соцвѣтія одиночныя; очень мелкія, на короткихъ, загнутыхъ назадъ, вѣточкахъ, состоятъ изъ нѣсколькихъ чешуекъ при осызваніи, затѣмъ изъ трехъ болѣе крупныхъ и мясистыхъ, сросшихся между собою, чешуй, между которыми находятся 3 прямостоячія яичка. Послѣ цвѣтенія изъ сросшихся между собою чешуй образуются ложныя ягоды, почти шаровидныя, висячія, черныя, съ сизымъ налетомъ. Цвѣтетъ весною. Растетъ на сухихъ каменистыхъ мѣстахъ и въ горахъ. Разводится съ садахъ и паркахъ сѣменами, отводками и черенками. Для употребленія собираютъ обыкновенно самыя верхніе кончики вѣтвей въ апрѣлѣ и, высушивши ихъ, хранятъ въ плотно закупоренныхъ сосудахъ. (Рис. 183.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. казацкаго можжевельника или сабины, извѣстно давно. Винный настой его издавна былъ извѣстенъ, какъ средство, способное вызвать кровавую мочу; порошокъ этого растенія употреблялся врачами, какъ наружное средство при безболѣзненныхъ язвахъ и мокнущихъ бородавкахъ. Въ настоящее время сабина вслѣдствіе ея вреднаго вліянія на мочевые пути и на матку врачами почти никогда не употребляется. Въ народѣ сабина употребляется тоже какъ средство, вызывающее мѣсячныя очищенія, также отъ глисть, отъ ломоты въ суставахъ, отъ пережарившейся лихорадки, въ особенности, если она сопровождается запорами. Но ввиду ядовитости этого средства лучше совсѣмъ не употреблять его.

Въ ветеринарной медицинѣ сабина дается лошадямъ, которыя хорошо переносятъ это средство, тогда какъ рогатый скотъ, овцы и собаки совсѣмъ не переносятъ его. У лошадей сабина улучшаетъ аппетитъ и пищевареніе, дѣйствуетъ мочегонно; въ острыхъ заболѣваніяхъ употребленіе сабины противопоказано: лошадямъ на пріемъ дается отъ ¼ унца до 1½ унца

(15,0—45,0 грм.), смѣшанной съ солью или мукою; также сабину даютъ и ввидѣ настоевъ и отваровъ. Снаружи отваръ растенія употребляется, какъ раздражающее средство, для обмыванія сильно разрастающагося дикаго мяса на застарѣлыхъ язвахъ, также для обмыванія кожи при хроническихъ болѣзняхъ кожи.

Можжевельникъ красный (*Juniperus Oxcedrus* L.). Верескъ кедровый, Кедръ красный, Можжевельникъ испанскій, Карандашное дерево. Кустарникъ съ красными ягодами, произрастающій въ южной Европѣ, изъ семейства «хвойныхъ» и подсемейства «кипарисовыхъ» (*Cupressineae* Rich.). Плоды, древесина и смола употребляются въ медицинѣ. Изъ древесины дѣлаютъ также оболочки карандашей.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Плоды, древесина и смола можжевельника красного прежде употреблялись въ медицинѣ, теперь совсѣмъ оставлены.

Можжевельникъ обыкновенный (*Juniperus communis* L.). Кедръ барбадосскій, Кедръ гималайскій, Вересъ (Вол., Олон., Арх., Сиб.), Вересникъ, Верескъ, Верестъ, Вересовое дерево, Вересина (въ разн. губ.), Можжевельникъ (въ больш. ч. Росс.) и изм. Можжевельникъ (Малор.), Можewelъ, Брыжежелъникъ (Твер.), Бруждевелъникъ, Бружежелъникъ (Твер.), Бруджелъникъ (Псков.), Брозжежелъникъ, Брозжеловникъ, Бржежелъникъ (Гв.), Выржежелъникъ (Гв.), Тетеривинный кустъ, Тетеривиновыя ягоды, Яловецъ (Малор.) и изм. Ядловецъ (Гродн.), Юдловецъ, Ядловичъ (Вил.), Зановецъ (Гродн.) и вѣр. Еленецъ (Смол.). Вѣчно-зеленый очень вѣтвистый кустарникъ, выш. 13½—22½ вершк., или дерево выш. до 1½ саж., изъ семейства «хвойныхъ» (*Coniferae* Juss.) и подсемейства «кипарисовыхъ» (*Cupressineae* Rich.), распространенное почти по всей Европѣ, въ средней, юго-западной Россіи, на Кавказѣ, въ Туркестанѣ и въ Сибири, съ шиловидными, жесткими, острыми хвоями, расположенными кольчато по 3 хвои въ каждомъ кольцѣ. Цвѣтки двудомные. Мужскіе цвѣты продолговатые, пазушные. Женскія соцвѣтїи мелкія, почти шаровидныя, пазушныя; они состоятъ изъ стержня, на которомъ внизу сидятъ безплодныя чешуи, а на верхушкѣ—три яйцевидныя плодовые чешуи, несущія сбоку, при основаніи, по одному личку. Во время созрѣванія плодовые чешуи становятся мясистыми и, сросшася между собою, образуютъ ложную ягоду чернаго цвѣта, съ сильнымъ налетомъ. Цвѣтетъ весною. Сѣмена созрѣваютъ на второй годъ осенью. Растетъ въ лѣсахъ. Легко разводится отъ ягодъ на всякой землѣ, особенно по пустырямъ. Всѣ части можжевельника, смола, полученная отъ него, особенно ягоды, издають при сжиганіи смолистый довольно пріятный запахъ. Вкусъ всѣхъ частей горьковатый, бальзамическій, ягоды сладковато-пріяныя. Ягоды и древесина доставляютъ желтое летучее остро: масло, водяной и смолистый экстракты. Изъ глубокихъ надрѣзовъ древесины въ теплыхъ странахъ вытекаетъ сокъ, извѣстный въ продажѣ сандаракъ,

или сухая прозрачная горькая блѣдно-желтая смола, растворяющаяся въ винномъ спиртѣ и въ нѣкоторыхъ маслахъ. Въ сѣверныхъ странахъ Европы нерѣдко между корой и древесиной можжевельника появляется смолистое вещество, извѣстное подъ именемъ «нѣмецкаго» сандарака, употребляемаго для куренія. Сандаракъ-же, растворенный въ винномъ спиртѣ, даетъ превосходный бѣлый блестящій лакъ, употребляемый въ различныхъ отрасляхъ искусства. Изъ канцелярскихъ порошковъ сандарака употребляютъ для затиранія подскобленныхъ мѣстъ бумаги, чтобы на нихъ не распускались чернила. Плотная древесина пригодна для токарныхъ и столярныхъ издѣлій: изъ коры дѣлаютъ веревки; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ изъ вѣтокъ можжевельника готовятъ отваръ для паренія и мытья винныхъ бочекъ. Дымъ, получаемый при сжиганіи вѣтвей можжевельника, доставляетъ хорошее, здоровое куреніе для комнатъ и очищаетъ воздухъ, а дымъ отъ болѣе толстыхъ стволовъ употребляется для копченія мяса. Ягоды въ сѣверныхъ странахъ иногда употребляютъ въ видѣ приправы для кушаньевъ; растолченные, разведенные водой, онѣ доставляютъ при броженіи водку «бобровичку» или «можжевельку», употребляемую нерѣдко простымъ народомъ: эта-же водка съ прибавленіемъ къ ней сахара или меда во время ея броженія доставляетъ при перегонкѣ крѣпкую водку, называемую «джинъ». Кромѣ того, ягоды, древесина и смола употребляются въ медицинѣ. (Рис. 181.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. О можжевельниковыхъ ягодахъ упоминается еще въ первой книгѣ царствъ XIX. Илія, скрываясь отъ Іезавели въ пустынь Беръ-Шеба, питался можжевельниковыми ягодами. Древніе врачи употребляли можжевельниковыя ягоды при женскихъ болѣзняхъ, въ настоящее время врачами употребляется отваръ изъ можжевельниковыхъ ягодъ отъ водяной болѣзни. Можжевельниковыя ягоды содержатъ въ себѣ эфирное масло, смолу, воскъ, камедь, сахаръ и красящее вещество.

Дѣйствующее вещество есть можжевельниковое масло. Малые приемы можжевельниковыхъ ягодъ вызываютъ усиленное отдѣленіе мочи, тогда какъ большіе приемы вызываютъ появленіе крови въ мочѣ. Врачи назначаютъ отваръ можжевельниковыхъ ягодъ больнымъ, страдающимъ водянкою, и отъ хроническаго заболѣванія почекъ; кромѣ того, дѣйствуя мочегонно, отваръ можжевельника способствуетъ обмыванію мочевого пузыря отъ слизи, потому дается при хроническихъ катаррахъ мочевого пузыря и моченепускальнаго канала.

Въ аптекахъ продаются: 1) Можжевельниковое масло, на приемъ его даютъ 2—4 капли (крайне рѣдко). 2) Можжевельниковый спиртъ, на приемъ отъ 20—60 капель (тоже крайне рѣдко). 3) Экстрактъ можжевельниковыхъ ягодъ, принимаемый чайными ложками. Для отвара берутъ фунтъ кипящей воды и $\frac{1}{2}$ унца (15,0 грм.) ягодъ, смѣсь кипятятъ, продѣживаютъ и пьютъ чайными чашками. или-же толченныя ягоды настаиваютъ на винѣ: на 12 унцъ (360 грм.) вина

беруть 1—1½ унца (30,0—45,0 грм.) ягоды, настаиваютъ 2 дня, выжимаютъ ягоды, процеживаютъ и пьютъ по рюмкѣ (2 унціи=60 грм.) нѣсколько разъ въ день.

Въ народной медицинѣ можжевельныя ягоды въ большемъ употребленіи. Въ Вологодской губерніи собираютъ зрѣлыя ягоды, парятъ ихъ съ 2½ золотника селитры (2½ драхм.=10 грм.) и со скипидаромъ. Въ Вятской и Тверской губ. ягоды въ большемъ употребленіи отъ лихорадокъ, водянокъ и женскихъ болѣзней.

Снаружи толченныя можжевельныя ягоды, смѣшанныя со свинымъ саломъ, употребляютъ отъ хроническихъ сыпей, главнымъ образомъ—отъ чесотки и лишаявъ. Отваромъ можжевельника обмываютъ тѣло отъ всевозможныхъ хроническихъ сыпей, какъ-то: отъ прыщи, венерическихъ сыпей, отъ обильнаго истеченія слизи. Мазь изъ ягодъ готовится въ народѣ слѣд. образомъ: смѣшиваютъ фунтъ толченыхъ ягодъ и равное количество коноплянаго или коровьяго масла, или-же свиного сала и варятъ въ новомъ горшкѣ, слѣдя за тѣмъ, чтобы составъ не выпыхнулъ, потомъ прожимаютъ мазь сквозь холстину. Весь кустарникъ употребляютъ для окуриванія помѣщеній отъ комаровъ.

Въ ветеринарной медицинѣ можжевельныя ягоды также употребляются очень часто. Ихъ даютъ въ тѣхъ-же заболѣваніяхъ, какъ и людямъ, кромѣ того, назначаютъ еще отъ кашля и для возобновленія силъ. Большимъ домашнимъ животнымъ дается отъ 1—2 унцъ (30,0—60,0 грм.) овцамъ и свиньямъ—1 драхмы до—½ унца (8,0—15,0 грм.), собакамъ—15 гранъ до 1 драхмы (1,0—4,0 грм.) заразъ или въ чистомъ видѣ, или чаще съ другими веществами въ видѣ пшлоти и кашекъ или-же въ отварѣ; иногда толченныя ягоды прибавляются къ корму или питью.

Снаружи ягоды употребляютъ для окуриванія скота, для чего ягоды посыпаютъ на раскаленный уголья. Можжевельное масло употребляется вмѣсто скипидарнаго. Можжевельное дерево находится въ продажѣ въ маленькихъ кусочкахъ; по своимъ свойствамъ оно одинаково съ ягодами и употребляется въ тѣхъ-же случаяхъ.

Можжуха, см. Можжевельникъ обыкнов. (*Juniperus communis* L.).

Можжуха, см. Винная жидовская (*Physalis Alkekengi* L.).

Мужжуха болотная, см. Плаунъ-баранецъ (*Lycoperidium annotinum* L.).

Можжуха казацкая, см. Можжевельникъ казацкій (*Juniperus sabina* L.).

Можжевельникъ, см. Можжевельникъ обыкновенный (*Juniperus communis* L.).

Можжепъ, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).
Мозольное дерево (*Bryophyllum calycinum* Salisb.). Живое, или живучее дерево, Вайда (Кал. г.), Медынь. Жидовское племя (Вѣлор.). Полукустарникъ съ мясистыми листьями, родомъ изъ южной Азіи. Листья высоко цѣнятся въ Китаѣ, какъ охлаждающее, успокаивающее и исцѣляющее раны наружное средство. Листья также прикладываютъ къ мозолямъ.

Моклаки, см. Морюшка (*Rubus Chamaemorus* L.).

Мокрецъ, см. Аюранъ лекарственный (*Gratiola officinalis* L.).

Мокрецъ, см. Марьянникъ луговой (*Melampyrum pratense* L.).

Мокрецъ } см. Мокрица (*Stellaria media* Smith.).

Мокрецъ, см. Острица лежачая (*Asperugo procumbens* L.).

Мокрецъ, см. Подмаренникъ цѣлкій (*Galium Aparine* L.).

Мокрица (*Stellaria media* Smith.). Фармацевтическое назв. *Alsene*, s. *Morsus gallina* (Herba). Грудница (Ниж.), Курослѣзь (Прыж.), Маклика (Калуж.), Мокрець, Мокрець, Мокрица меньшая, Мокрица (Малор.), Мокруха (Бѣлор.). Мокруша (Арх.), Италья мята, Итичья мята, Итичий салатъ, Топтунъ, Куриный моръ, Куричьи черевы, Куричья гравя, Мышье ушко. Мокрица есть однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «гвоздичныхъ» (*Caryophyllaceae* Juss.), распространенное почти по всей Европѣ и весьма обыкновенное въ Россіи. Стебель дл. 2—7 вершк., лежачій или приподнимающійся, вѣтвистый, цилиндрическій, на всемъ протяженіи голый, за исключеніемъ одной волосистой продольной полоски на каждомъ междоузліи. Листья яйцевидные, заостренные; нижніе—черешковые, верхніе—сидячіе. Цвѣты бѣлые, конечные, пазушные. Чашечка 5-губчатая; лепестковъ 5, двураздѣльныхъ, одной длины съ чашелистиками. Тычинокъ 3—5. Завязь имѣетъ 3 столбика. Плодь—коробочка, раскрывающаяся 6-ю створками. Цвѣтетъ съ весны до осени. Обыкновенная сорная трава, произрастающая около домовъ, дорогъ и на огородахъ. Любимый кормъ комнатныхъ итичъ. (Рис. 184.)

Мокрица, см. Желтушникъ левкойный (*Erysimum cheiranthoides* L.).

Мокрица, см. Подмаренникъ болотный (*Galium palustre* L.).

Мокрица, см. Ряска маленькая (*Lemna minor* Schl.).

Мокрица меньшая, см. Мокрица (*Stellaria media* Smith.).

Мокрица-топтунъ, см. Гречиха-спорышъ, или Гречиха итичья (*Polygonum aviculare* L.).

Мокрица цвѣтная, см. Подмаренникъ цѣлкій (*Galium Aparine* L.).

Мокрица, см. Мокрица (*Stellaria media* Smith.).

Мокруха, см. Сердечникъ горькій (*Cardamine amara* L.).

Мокруха, см. Кукушкины слезки (*Orchis maculata* L.).

Мокруха } см. Мокрица (*Stellaria media* Smith.).

Мокруша, см. Лютикъ водяной (*Ranunculus aquatilis* L.).

Мокруша, см. Рдестъ (*Potamogeton* L.).

Мокрытникъ, см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).

Молша, см. Вшивица болотная (*Pedicularis palustris* L.).

Молка, см. Гусинная ланка (*Potentilla anserina* L.).

Молка, см. Ланчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).

Молодень, см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).

Молодецъ, см. Коровякъ черный (*Verbascum nigrum* L.).

Молодика, см. Полевой левокъ (*Turritis glabra* L.).

Молодило, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).

Молодило большое, или **кровельное**, см. Молодиль кровельный (*Sempervivum tectorum* L.).

Молодило сайгачье, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).

Молодилъ, см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).

Молодилъ, см. Молодиль кровельный (*Sempervivum tectorum* L.).

Молодилъ кровельный (*Sempervivum tectorum* L.). Фармацевтическое назв: *Sempervivum*, s. *Sedum majus*, recens. Артишоки дикіе, Всегда-живъ, Доли (Малор.), Живучка кровельная, Молодило большое, или кровельное, Молодилъ, Поденъжникъ, Расходникъ большой, Рѣпа степная, Скочки (Малор.), Чеснокъ дикій. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «толстянковыхъ» (*Crassulaceae* DC.), распространенное въ средней и южной Европѣ, встрѣчающееся въ Россіи только въ западныхъ губерніяхъ. Листья очередные, толстые, мясистые, рѣсничатые, на верхушкѣ заостренные; на прямостоящихъ цвѣтоносныхъ стебляхъ, достигающихъ $5\frac{1}{2}$ —7 вершк., они сидятъ разбѣнно, а на нецвѣтущихъ побѣгахъ они тѣсно сближены въ шаровидныя розетки. Долей чашечки 12; вѣнчикъ о 12 лучеобразно расходящихся мохнато-пушистыхъ розовыхъ лепесткахъ, вдвое длиннѣе чашечки. Тычинокъ вдвое больше. Плодолистиковъ столько-же, сколько лепестковъ, заканчивающихся короткими столбиками и расположенныхъ кольцомъ. Плодъ—сложная листовка; сѣмена мелкія. Молодилъ кровельный цвѣтетъ въ іюль и августѣ. Растетъ на каменистыхъ мѣстахъ и на крышахъ, гдѣ поселяне нерѣдко разводятъ его въ предположеніи, что молнія не ударитъ въ крышу, на которой есть это растеніе.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Употребленіе молодила кровельнаго въ народной медицинѣ довольно обширно. Трава содержитъ въ себѣ яблочную кислоту. Свѣже-измятая она прикладывается къ геморроидальнымъ шишкамъ и мозолямъ, а сокъ ея употребляется отъ лѣтнихъ прыщей, отъ укушенія пчелъ и отъ ожога.

Сокомъ, смѣшаннымъ съ медомъ, мажутъ во рту молочницу, трещины на языкѣ и воспаленіе десенъ; этимъ-же сокомъ примачиваютъ трещины на соскѣ и припухшія грудныя железы съ начинающеюся въ нихъ грудницею; для прикладыванія на соски и на грудь сокъ смѣшиваютъ со сливками. Выжатый сокъ дается по 1 унцу (30,0 грм.) нѣсколько разъ въ день. Молодые листья растенія употребляются въ пищу вмѣсто шпината.

Молодилъ сайгачій, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).

Молодильная трава } см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).

Молодильникъ

Молодильникъ, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).

Молодильникъ

Молодильца } см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).

Моложай

Молоканъ, см. Латукъ дикій, или дикій салатъ (*Lactuca Scariola* L.).

- Молоканка.** см. Молочай обыкновенный (*Euphorbia Esula* L.).
- Молоканка.** см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).
- Молокитникъ.** см. Осотъ огородный (*Sonchus oleraceus* L.).
- Молоко волчье.** см. Вехъ ядовитый (*Cicuta virosa* L.).
- Молоко птичье** } см. Итицемлечникъ (*Ornithogalum* L.).
- Молоко пѣтушье** }
- Молокоѣдъ.** см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).
- Молонецъ.** см. Ястребинка зонтичная (*Hieracium umbellatum* L.).
- Молосная трава.** см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).
- Молотаникъ.** см. Луговикъ дернистый (*Aira caespitosa* L.).
- Молочай.** см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).
- Молочай.** см. Молочай кипарисный (*Euphorbia Cyparissias* L.).
- Молочай.** см. Молочай обыкновенный (*Euphorbia Esula* L.).
- Молочай.** см. Молочай высокий (*Euphorbia procerà* M. B.).
- Молочай.** см. Латуку дикій (*Lactuca Scariola* L.).
- Молочай.** см. Горлица ястребинковая (*Pieris hieraciodes* L.).
- Молочай.** см. Осотъ огородный (*Sonchus oleraceus* L.).
- Молочай.** см. Осотъ полевой (*Sonchus arvensis* L.).
- Молочай.** см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).
- Молочай высокий** (*Euphorbia procerà* M. B.). Звѣробой высокий (Сарат.), Купрій, Кура (Екат., Вор.), Ланушка (Пенз.), Молочай, Молочка, Нетинырь (Уфимск.), Одолѣй или Приворотная трава. Многолѣтнее травянистое полое или нѣсколько пушисто-мохнатое растение изъ семейства «молочайныхъ» (*Euphorbiaceae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, довольно обыкновенное въ средней и южной Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ и въ Туркестанѣ. Корневище толстое, стебли высокіе, вѣтвистые; листья спиральныя, продолговато-ланцетные, мелко-пильчатые; соцвѣтіе метельчатое; вѣтви соцвѣтія выходятъ изъ угловъ листьевъ и верхнія сближены зонтикомъ, окруженнымъ при основаніи покрываломъ. Цвѣтки безъ околоцвѣтника: одинъ женскій цвѣтокъ, состоящій изъ пестика, находящагося на ножкѣ и нѣсколько однотычиночныхъ мужскихъ цвѣтковъ образуютъ небольшія частичныя соцвѣтія, похожія на цвѣтки и окруженныя спайнолепестною оберткою. Обертка колокольчатая, съ 4—5-ю лопастями, чередующимися съ отогнутыми наружу округлыми медниковыми железками, выделяющими сладкій сокъ. Завязь 3-хгнѣздная; столбикъ 3-храздѣльный; рыльца 2-хлопастныя. Плодъ—коробочка гладкая, рѣже мохнатая, распадающаяся при созрѣваніи на три плодика, которые отдѣляются отъ срединнаго столбца и растрескиваются на-двое. Цвѣтетъ въ первой половинѣ лѣта. Растетъ на дугахъ, въ рощахъ и между кустарниками. Въ части растения содержатъ млечный сокъ, отличающійся наркотическими свойствами.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ молочая распространено въ народѣ. Въ Подоли, Волыни и Галиціи уже цѣлыя столѣтія его употребляютъ отъ водобоязни. Профессоръ Роговичъ сообщаетъ слѣдующія свѣдѣнія объ употребленіи этого растенія для излеченія водобоязни: нѣсколько горстей перемѣтыхъ свѣжихъ корней молочая толкутся въ ступкѣ, выкладываются въ глиняный сосудъ, имѣющій выѣстимость одной кварты, и наливается водою; сосудъ, прикрытый крышкою, сначала ставится въ теплое мѣсто, а потомъ на огонь, гдѣ остается, пока не выварятся корни. По истеченіи сутокъ жидкость процеживается и дается натошакъ больному черезъ каждыя 3 дня по небольшой рюмкѣ. Послѣ cadaго приѣма у больныхъ обнаруживается тошнота, боль въ желудкѣ, а иногда и рвота, хотя не у всѣхъ; корни опять наливается водою, снова кипятятся и идутъ для примочекъ къ укушеннымъ ранамъ по 3 раза въ день. Гг. Зѣновичъ и Бесеръ употребляли слѣдующій способъ леченія: свѣжіе корни молочая разрывали на куски и, взявши горсть ихъ, клали въ небольшой обыкновенный горшокъ, накрывали его крышкою, замазывали и ставили въ истопленную печь, въ которой держали до тѣхъ поръ, пока жидкость не испарялась черезъ стѣнки горшка почти до половины, потомъ ее процеживали и давали больному натошакъ по полу-рюмкѣ; послѣ cadaго приѣма у больного обнаруживалась тошнота и рвота пѣною; по замѣчанію сказанныхъ ученыхъ, тошнота и рвота съ каждымъ днемъ становились меньше и совершенно пропадали, когда больной выздоравливалъ. Раны на укушенныхъ бѣшенными собаками мѣстахъ промывались водою и прижигались каленымъ желѣзомъ*). Въ настоящее время, когда существуютъ предохранительныя прививки отъ собачьяго бѣшенства, всѣ эти способы леченія почти оставлены. Въ Волынской губерніи молочай, кромѣ того, употребляется отъ клоповъ, въ Казанской губерніи отъ боли въ животѣ и сердцѣ, а знахари даютъ корень его отъ порчи зломѣренными людьми.

Молочай дикий, см. Скерда кровельная (*Crepis tectorum* L.).

Молочай желтый, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).

Молочай кипарисный (*Euphorbia Cyparissias* Scop.). Фармацевтическое назв.: *Esula minor* s. *Euphorbia cypressina* (Herba, Radix et Cortex). Молочай, Молочай, Молочакъ, Похидия, Сосенка малая, Фонарь, Метелка (Под.). Молочай кипарисный есть многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «молочайныхъ» (*Euphorbiaceae* Juss.), распространенное въ средней Европѣ, въ средней и юго-западной Россіи и въ Сибири. Стебель выш. всего 3½—7 вершк., съ густо-облиственными, безплодными вѣтвями. Листья узко-линейные. Общее соцвѣтіе зонтикообразное. Зонтикъ полушаровидный, съ многочисленными главными лучами, виллообразно развѣтвляющимися; при каждомъ развѣтвленіи 2 яйцевидно-ромбическихъ желтыхъ или красныхъ при-

*) Ботаническій словарь Н. Анненкова.

цвѣтника. Цвѣты однодомные; тычиночные состоятъ всего изъ одной тычинки, а пестичные—изъ одного пестика, сидящаго на длинной ножкѣ. Нѣсколько тычиночныхъ цвѣтковъ и одинъ пестичный собраны вмѣстѣ и окружены спайнолепестной оберткой, образуя такимъ образомъ маленькое соцвѣтіе, напоминающее обоеполой цвѣтокъ. Обертка колокольчатая, съ 4—5 лопастями, чередующимися съ отогнутыми наружу серповидными медниковыми железками, выделяющими сладкій сокъ. Завязь верхняя, 3-хгнѣздная, столбикъ 3-храздѣльный. Плодъ—мелко-бугорчатая 3-хгнѣздная коробочка, распадающаяся на 3 плодика, отдѣляющихся отъ срединнаго столбца и растрескивающихся надвое. Молочай кипарисный цвѣтетъ обыкновенно весною и растетъ въ степяхъ и сосновыхъ лѣсахъ. Всѣ части выделяютъ млечный сокъ, обладающій наркотическими свойствами.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Прежде этотъ видъ молочая былъ въ большомъ употребленіи въ народной медицинѣ, теперь его иногда употребляютъ отъ водобоязни.

Молочай обыкновенный (*Euphorbia Esula* L.). Фармацевтическое назв.: *Esula s. Thymalus* (Radix et Cortex.). Молочакъ, Молочай, Молеканка, Прогонъ (Алт.). (Т а б л. XXIX, ф и г. 160.) Многолѣтнее травянистое сѣровато-зеленое растение изъ семейства «молочайныхъ» (*Euphorbiaceae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ и почти во всей Россіи. Стебель немного вѣтвистый, выпш. отъ $6\frac{1}{2}$ —11 вершковъ. Листья сѣровато-зеленые, ланцетно-линейные, при основаніи суженные, спереди мелко-зубчатые. Общее соцвѣтіе зонтикообразное о 8—12 и болѣе главныхъ лучахъ, видообразно развѣтвляющихся; при каждомъ развѣтвленіи 2 широко-сердцевидныхъ, обыкновенно желтыхъ прицвѣтника. Цвѣты однодомные; тычиночные—состоятъ всего изъ одной тычинки, а пестичные—изъ одного пестика, сидящаго на длинной ножкѣ. Нѣсколько тычиночныхъ цвѣтковъ и одинъ пестичный собраны вмѣстѣ и окружены спайнолепестной оберткой, образуя такимъ образомъ маленькое соцвѣтіе, напоминающее обоеполой цвѣтокъ. Обертка колокольчатая, съ 4—5 лопастями, чередующимися съ отогнутыми наружу медниковыми серповидными железками, выделяющими сладкій сокъ. Завязь верхняя, 3-хгнѣздная; столбикъ 2-храздѣльный. Плодъ—3-хгнѣздная мелко-бугорчатая коробочка, распадающаяся на 3 плодика, отдѣляющихся отъ срединнаго столбца и растрескивающихся надвое. Цвѣтетъ съ мая до конца юля. Растетъ на лугахъ, между кустарниками и около дорогъ.

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Сокъ растения употребляется крестьянами для пестребленія бородавокъ и мозолей.

Всѣ виды молочаевъ выделяютъ весьма острый сокъ, который имѣетъ слабительное и рвотное свойство; всѣ они употреблялись для пестребленія бородавокъ мозолей и пятенъ на лицѣ. Въ настоящее время молочай былъ предложенъ врачами для леченія

раковыхъ опухолей, но опыты надъ его дѣйствиємъ не привели еще ни къ какимъ положительнымъ результатамъ.

Молочайникъ, см. Ведренецъ обыкновенный (*Pimpinella Saxifraga* L.).

Молочайникъ, см. Козлобородникъ луговой (*Tragopogon pratensis* L.).

Молочайникъ козій, см. Расторопша лютиковая (*Chondrilla juncea* L.).

Молочайникъ козлобородный, см. Козлобородникъ луговой (*Tragopogon pratensis* L.).

Молочайникъ круглолистный (*Euphorbia Perplus* L.). Это есть однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «молочайныхъ» (*Euphorbiaceae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ средней и юго-западной Россіи. Стебель выш. 2½—5½ вершковъ, прямостоячій или лежалій, съ самаго основанія вѣтвистый. Листья коротко-черешковые, обратно-яйцевидные, тупые; нижніе—почти круглые. Зонтикъ о 2—3 главныхъ лучахъ, нѣсколько разъ развѣтвляющихся вилкообразно. Прицвѣтниковъ нѣтъ. Во всемъ дальнѣйшемъ сходенъ съ молочаемъ кипариснымъ (описание см. выше). Плодъ—гладкая коробочка съ двумя слегка крылатыми ребрышками на спинѣ каждого плодика. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на поляхъ и огородахъ.

Молочайникъ круглолистный—крайне ядовитое растение; сокъ его очень ѣдкій; приложенный на кожу, онъ разѣдаетъ глубже испанской мушки; въ горлѣ онъ вызываетъ чувство жженія, принятый внутрь дѣствуетъ, какъ сильное слабительное; даже небольшія количества сока могутъ повлечь за собою судороги, обморокъ и даже смерть. Въ особенности опасно это растение для беременныхъ. Въ случаѣ отравленія до прибытія врача больному даютъ пить молоко, теплую воду съ густымъ медомъ и какимъ-нибудь постнымъ масломъ, а потомъ, когда больной придетъ въ сознаніе, ему даютъ наливку изъ маковыхъ цвѣтовъ. (Рис. 185.)

Молочайникъ малый (*Euphorbia exigua* L.). Молочайникъ малый есть однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «молочайныхъ» (*Euphorbiaceae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ запад. Россіи, въ Крыму и на Кавказѣ. Стебель тонкій, съ самаго основанія вѣтвистый, выш. 2—4½ вершк. Листья линейные. Зонтичное соцвѣтіе большею частью о 3-хъ главныхъ лучахъ, нѣсколько разъ развѣтвляющихся вилкообразно. Прицвѣтниковъ нѣтъ. Во всемъ остальномъ сходенъ, подобно и предыдущему виду—съ молочаемъ кипариснымъ (описание см. выше). Плодъ—гладкая коробочка. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на поляхъ и сорныхъ мѣстахъ. (Рис. 186.)

Молочайникъ простой, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).

Молочакъ, см. Осотъ полевой (*Sonchus arvensis* L.).

- Молочакъ**, см. Осоть огородный (*Sonchus oleraceus* L.).
Молочакъ, см. Молочай кипарисный (*Euphorbia Cypressias* Scop.).
Молочакъ, см. Молочай обыкновенный (*Euphorbia Esula* L.).
Молочая, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).
Молочка, см. Молочай кипарисный (*Euphorbia Cypressias* Scop.).
Молочка, см. Молочай высокий (*Euphorbia procera* L.).
Молочка
Молочко } см. Латуку дикій (*Lactuca Scariola* L.).
Молочная трава } см. Млечникъ морской (*Glaux*
Молочная морская трава } *maritima* L.).
Молочникъ, см. Чертополохъ огородный (*Cirsium oleraceum* Mill.).
Молочникъ, см. Млечникъ морской (*Glaux maritima* L.).
Молочникъ, см. Горлица ястребинковая (*Pteris hieracioides* L.).
Молочникъ, см. Осоть огородный (*Sonchus oleraceus* L.).
Молочникъ, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).
Молочникъ, см. Козлобородникъ луговой (*Tragopogon pratensis* L.).
Молочникъ, см. Ласточникъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* Moench.).
Молочъ, см. Скерда кровельная (*Crepis tectorum* L.).
Молошникъ, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).
Молошничекъ, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).
Мольная трава, см. Донникъ лекарственный (*Melilotus officinalis* Lam.).
Монгольскій чай, см. Чагырскій чай (*Saxifraga crassifolia* L.).
Моръ куриный, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).
Моръ куриный, см. Мокрица (*Stellaria media* Smith.).
Моралка, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).
Моралки, см. Марь цѣльнолистн. (*Chenopodium Bonus Henricus* L.).
Моральки, см. Марь цѣльнолистная (*Chenopodium Bonus Henricus* L.).
Морва, см. Шелковица черная (*Morus nigra* L.).
Морда козья, см. Вероника ручейная (*Veronica Beccabunga* L.).
Морда собачья, см. Львиный зѣвъ большой (*Antirrhinum majus* L.).
Мордашка, см. Клеверъ краснобѣлый (*Trifolium hybridum* L.).
Мордвинъ
Мордвинъ-царь } см. Чертополохъ курчавый (*Carduus crispus* L.).
Мордвинникъ }
Мордвинникъ, см. Чертополохъ ланцетолистный (*Cirsium lanceolatum* Scop.).
Мордвинникъ, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).
Мордовникъ, см. Борецъ желтый (*Aconitum Lycoctonum* L.).
Мордовникъ, см. Собачья петрушка (*Aethusa Cynapium* L.).
Мордовникъ, см. Чертополохъ курчавый (*Carduus crispus* L.).
Мордовникъ, см. Чертополохъ ланцетолистный (*Cirsium lanceolatum* Scop.).

- Мордовникъ, см. Бѣлена черная (*Hyosclamus niger* L.).
 Моревникъ, см. Подмаренникъ сѣверный (*Galium boreale* L.).
 Морелла } см. Абрикосъ (*Armeniaca vulgaris* Lam.).
 Морель }
 Моржовки, см. Борщевикъ сибирскій (*Heracleum sibiricum* L.).
 Моримордъ, см. Борецъ синій (*Aconitum Napellus* L.).
 Моригъ, см. Гречиха-споришъ, или Гречиха птичья (*Polygonum aviculare* L.).
 Морква, см. Морковь огородная (*Daucus Carota* L.).
 Морква боровая, см. Икотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa in-
 sana* DC.).
 Морква гадюча } см. Петрушка горная (*Peucedanum Oreoseli-*
 Морква лѣсная } *pum* Moench.).
 Морквица, см. Морковь огородная (*Daucus Carota* L.).
 Морквица, см. Бутень клубненосный (*Chaerophyllum bulbosum* L.).
 Морквица лѣсная, см. Бутень клубненосный (*Chaerophyllum
 bulbosum* L.).
 Моркова }
 Моркова дыка } см. Морковь огородная (*Daucus Carota* L.).
 Моркова польная }
 Морковецъ }
 Морковецъ, см. Бедренецъ обыкновенный (*Pimpinella Saxi-
 fraga* L.).
 Морковка, см. Морковь огородная (*Daucus Carota* L.).
 Морковникъ, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea mil-
 lefolium* L.).
 Морковникъ, см. Рупыръ лѣсной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.).
 Морковникъ, см. Бутень клубненосный (*Chaerophyllum bulbo-
 sum* L.).
 Морковникъ, см. Вехъ ядовитый (*Cicuta virosa* L.).
 Морковникъ, см. Морковь огородная (*Daucus Carota* L.).
 Морковникъ, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).
 Морковникъ, см. Петрушка собачья (*Peucedanum Oreoselinum*).
 Морковникъ, см. Горичникъ болотный (*Peucedanum palustre
 Moench*.).
 Морковникъ, см. Морковникъ луговой (*Silaus pratensis* Bess.).
 Морковникъ болотный, см. Випица болотная (*Pedicularis
 palustris* L.).
 Морковникъ водяной, см. Укропъ конскій (*Oenanthe Phellan-
 drium* Lam.).
 Морковникъ луговой (*Silaus pratensis* Bess.). Фармацевтиче-
 ское назв.: *Silaus v. Seseli pratensis*, s. *Saxifraga anglica*. (*Herba*,
Rad. et Semen.). Бѣлоголовецъ (Екат.), Горичникъ луговой, Дуб-
 ницки (Уф.), Копръ свиный, Морковникъ, Смодъ, Пріемка трава,
 Ракитникъ горный или Черногловъ горный. Это есть мно-
 гочлѣнное травянистое растение изъ семейства «зонтичныхъ»
 (*Umbelliferae* Juss.), распространенное въ средней Европѣ,
 встрѣчающееся въ Прибалтійскихъ и Привислянскихъ губер-
 ніяхъ и кое-гдѣ въ средней Россіи. Стебель угловато-борозд-

чатый, выш. 14—22½ вершк. Верхніе листья перистые, нижніе тройко-перистые или мелкоразсѣченные: зеленовато-желтые цвѣты образуютъ сложные зонтики о 6—8-ти лучахъ. Обверточ-ки, т. е., прицвѣтники, находящіеся при частныхъ зонтикахъ, маленькія, узкія, по краямъ перепончатые. Чашечка 5-тизубчатая, зубцы ея незамѣтные; лепестковъ и тычинокъ по 5. Завязь нижняя, двугнѣзная, на верхушкѣ несетъ железистый дискъ, выделяющій сладкій сокъ. Столбиковъ 2. Плодь—продолговатая двусѣмянка, распадающаяся на 2 плодика съ 5-ю острыми, почти крылатыми ребрами. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ на лугахъ. Скотъ охотно ѣстъ эту траву. Прежде растение употреблялось въ медицину, теперь совсѣмъ оставлено. (Рис. 187.)

Морковь, см. Морковь огородная (*Daucus Carota* L.).

Морковь дикая, см. Бутень клубненосный (*Chaerophyllum bulbosum* L.).

Морковь дикая, см. Бедренець обыкновенный (*Pimpinella Saxifraga* L.).

Морковь огородная (*Daucus Carota* L.). Барканъ, Барканная трава, Барканница (Пек.), Борканъ (Повг.), Морковь (Вел. Росс.), Морква, Морковецъ, Морковица (Бесс.), Морковникъ (Екат., Хар.), Мorkва (Малор.), Морква польная (Гродн.), Морква дыка (Умань), Морквина, Моркова; стволы наз. Быліе (Курск.), Сузыкъ. Морковь огородная есть общезвѣстное двулѣтнее травянистое растение, разводимое ради толстаго мясистаго корня, изъ семейства «зонтичныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ средней, южной, западной Россіи и въ Туркестанѣ. Стебель жестковолосый, выш. 7—14 вершк. Нижніе листья двояко или тройко-перистые, съ узкими, надрѣзанными или перисто-раздѣльными долями. Сложные зонтики многолучистые, плоскіе, снабжены многочисленными обертками, состоящими, какъ и обертки подъ частыми зонтиками, изъ перисто-раздѣльных прицвѣтниковъ. Цвѣты бѣлые. Чашечка 5-тизубчатая, лепестковъ и тычинокъ по 5; лепестки у красивыхъ цвѣтовъ крупнѣе, чѣмъ у внутреннихъ. Завязь нижняя, двугнѣзная, несетъ на верхушкѣ железистый дискъ, выделяющій сладковатый сокъ; столбиковъ 2. Плодь—продолговато-овальная двусѣмянка, въ цѣлеречномъ разрѣзѣ почти круглая, распадающаяся на 2 плодика, у которыхъ главные ребра нитевидныя, со щетинками, вторичныя ребра усажены шипами. Цвѣтеть съ іюня до поздней осени. Растетъ на поляхъ и между кустарниками. Разводится, какъ овощъ, на огородахъ. Всѣ разводимые сорта дѣлятся на 2 группы: морковь и каротель; къ первой относятся всѣ сорта съ длиннымъ веретенообразнымъ корнемъ, а ко второй—всѣ сорта съ короткимъ, на концѣ притупленнымъ корнемъ. (Табл. XXX, фиг. 169.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Морковь имѣетъ обширное применение въ домашней медицинѣ. Сырую морковь и морковныя семена даютъ ѣсть дѣтямъ натошакъ отъ глистовъ.

Вареная морковь считается здоровою пищею для худосоч-

ныхъ больныхъ, страдающихъ одышкою, кашлемъ, чахоткою, за-
морами и геморроемъ; морковный отваръ даютъ людямъ, страдаю-
щимъ болями при мочеиспускани; также отваръ и сѣмена моркови
хвалить, какъ мочегонное, при каменной болѣзни мочевого пузыря.
Изъ моркови варятъ съ сахаромъ густой сиропъ, который отлично
успокаиваетъ горловой простудный кашель, помогаетъ отъ охрип-
лости голоса; въ особенности охотно морковный сокъ принимаютъ
дѣти. Этимъ-же сокомъ смазываютъ ротъ отъ молочницы; также
отваръ сока служитъ для полосканія во всѣхъ случаяхъ заботъ-
ванія слизистой оболочки рта, даже и при раковыхъ опухоляхъ.

Тертая морковь прикладывается въ видѣ припарки къ рако-
вымъ, золотушнымъ и цинготнымъ язвамъ. Скобленая морковь
или тертая прикладывается къ свѣжимъ обжогамъ. Свѣже-выжатый
морковный сокъ принимается столовыми ложками нѣсколько разъ
въ день.

Морковь полевая, см. Жгунъ корень ядовитый (*Cnidium veno-
sum* Koch.).

Моровой дивій, см. Зимовникъ осенній (*Colchicum autom-
nale* L.).

Морожокъ, см. Гречи́ха-спори́шъ, Гречи́ха пти́чья (*Polygonum
aviculare* L.).

Морозъ-травa, см. Цминъ (*Helýchrisum arenarium* Dc.).

Морозъ травa, см. Хрустальная травка (*Mesembrianthemum cris-
tallinum* L.).

Морозникъ, см. Морозникъ бѣлоцвѣтный *Helleborus niger* L.).

Морозникъ бѣлоцвѣтный (*Helleborus niger* L.). Горечивъ, Го-
рецытъ (Малор.), Морозникъ, Стародубка (Малор.). Смертоѣдъ, Че-
мери́чникъ, Чемери́ца, Чемери́цы, Черный геллеборъ или Черная
чемерица. Морозникъ есть вѣчнозеленое многолѣтнее расте-
нiе, выш. $3\frac{1}{2}$ —7 вершк., изъ семейства «лютиковыхъ» *Ranunculaceae*
Juss.), распространенное въ средней Европѣ, попадающееся
изрѣдка въ западной Россiи. Листья прикорневые, кожистые,
раздѣленные на 7—9 долей. Цвѣточный стебель безлистный, съ
нѣсколькими цѣльными прицвѣтниками и 1—2 крупными бѣло-
ватыми цвѣтками. Чашечка изъ 5 болѣе или менѣе окрашенныхъ
листочковъ. Лепестковъ 5, мелкихъ, трубчатыхъ. Тычинокъ и
плодолистиковъ много. Плодъ состоитъ изъ 3-хъ листовокъ съ
длиннымъ столбикомъ. Цвѣтетъ зимою и раннею весною. Растетъ
въ горахъ, разводится въ садахъ. Принадлежитъ къ числу ядови-
тыхъ остро-наркотическихъ растений. (Табл. XXX, фиг. 169.)

Морозникъ зеленый (*Helleborus viridis* L.). Многолѣтнее вѣчно-
зеленое травянистое растение изъ семейства «лютиковыхъ»
(*Ranunculaceae* Juss.), произрастающее въ средней и западной
Европѣ; изрѣдка встрѣчаются разновидности съ красноватыми
цвѣтами въ юго-западной Россiи. Прикорневые листья тонкие,
раздѣленные на 7—12 цѣльныхъ, иногда 2—3-храздѣльныхъ до-
лей. Стеблевые листья трехраздѣльные. Стебель несетъ 2—4
крупныхъ пониклыхъ желтовато-зеленыхъ цвѣтка. Чашечка
состоитъ изъ 5 остающихся листочковъ; лепестковъ 5, мелкихъ

трубчатыхъ. Плодъ состоитъ изъ 3 листовокъ съ длиннымъ столбикомъ. Цвѣтетъ раннею весною. Ядовитое и вмѣстѣ съ тѣмъ лекарственное растение. (Рис. 188.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Чемерица черная и зеленая были извѣстны уже въ глубокой древности. Растенія эти крайне ядовиты, принадлежать къ числу ядовъ, дѣйствующихъ на сердце; кромѣ того, они сильно раздражаютъ стѣнки желудка и кишекъ, потому дѣйствуютъ, какъ сильное проносное. Въ настоящее время оба эти вида черемичы въ медицинѣ совершенно оставлены.

Морозка, см. Морошка (*Rubus Chamaemorus* L.).

Морошка (*Rubus Chamaemorus* L.). Вахлакъ, Вахлачка, Глажевина (ягоды), Глажевникъ (Пск., Курск.), Глажи (Новг., Олон.), Глыжи (Пск.), Глажинникъ (Пск., Курск.), Глажинина, Глажина (Пск., Новг.), Глазовникъ, Глазовье (Новг.), Каменица, Команица, Куманица (Тв.), Куманиха, Куманика (Тв.), Куманичина (Новг.), Малинникъ желтый, Медвѣжаникъ, Моклаки, Мохлаки (Костр.), Морозка (Твер.), Морошникъ, Морошка, Смородина моховая, Роѣкачи (незрѣл. морошка въ Арх. г.). Низкая, вып. 1½—3½ вершк., трава изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Носк et Benth.), распространенная въ сѣверной Европѣ, въ сѣверной и средней Россіи и въ Сибири, съ ползучимъ корневищемъ. Прямостоящій простой стебель несетъ на верхушкѣ одиночный бѣлый цвѣтокъ. Листья округло-почковидные, большей частью 5-тилопастные. Чашечка простая, о 5 чашелистникахъ; вѣнчикъ 5-тилепестный, лепестки сердцевидные; многочисленныя тычинки вмѣстѣ съ лепестками прикрѣплены къ краямъ вынуклаго цвѣтоложа. Пестикъ состоитъ изъ многихъ плодололистиковъ; плодъ—сложная костянка: краснаго цвѣта въ незрѣломъ видѣ и оранжево-желтаго—въ зрѣломъ состояніи. Цвѣтетъ въ маѣ и въ іюнѣ; созрѣваетъ въ концѣ іюля и августѣ. Растетъ на торфяныхъ болотахъ. Плоды съѣдобны.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Морошка употребляется въ домашней медицинѣ, какъ мочегонное средство, и за послѣднее время употребленіе ея принято и врачами. Кромѣ того, она считается прекраснымъ противоцынготнымъ средствомъ. Ягоды морошки ѣдятъ сырыми, изъ нихъ готовятъ салатъ, варенье и сиропъ. Какъ мочегонное средство, употребляютъ также корень и сушенныя листья морошки.

Морошка красная, см. Мамура (*Rubus arcticus* L.).

Морошникъ, см. Морошка (*Rubus Chamaemorus* L.).

Морская капуста, см. Катранъ морской (*Crambe maritima* L.).

Морская капуста, см. Капуста морская (*Laminaria digitata* Lam.).

Морская трава, см. Зостера морская (*Zostera marina* L.).

Морской латукъ, см. Латукъ морской (*Ulva Lactuca* L.).

Мотодилъ, см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).

Мотылекъ, см. Аютины глазки (*Viola tricolor* L.).

Мохъ, см. Торфяной мохъ (*Sphagnum squarrosum* Pers.).

Мохъ березовый, см. Исландскій мохъ (*Cetraria islandica* Ach.).

Мохъ болотный, см. Рокетъ блестящій (*Hypnum splendens* Hedw.).

Мохъ боровой болотный, см. Кукушкинъ ленъ (*Polytrichum commune* L.).

Мохъ бурый } см. Олений мохъ (*Cladonia rangiferina* L.).

Мохъ бѣлый } см. Олений мохъ (*Cladonia rangiferina* L.).

Мохъ бѣлый, см. Торфяной мохъ (*Sphagnum squarrosum* Pers.).

Мохъ желѣзный, см. Кукушкинъ ленъ (*Polytrichum commune* L.).

Мохъ жесткій, см. Исландскій мохъ (*Cetraria islandica* Ach.).

Мохъ-карагенъ, см. Карагенъ, фукусъ курчавый (*Fucus crispus* L.).

Мохъ красный, см. Кукушкинъ ленъ (*Polytrichum commune* L.).

Мохъ легочный, см. Стикта, или легочный мохъ (*Sticta pulmonaria* Hoffm.).

Мохъ лѣсной } см. Олений мохъ (*Cladonia rangiferina* L.).

Мохъ олений } см. Олений мохъ (*Cladonia rangiferina* L.).

Мохъ плющевый, см. Стикта, или легочный мохъ (*Sticta pulmonaria* Hoffm.).

Мохъ рябчиковый, см. Исландскій мохъ (*Cetraria islandica* Ach.).

Мохъ собачій, см. Пельтигера, или щитовоска (*Peltigera venosa* L.).

Мохъ сухоборный, см. Исландскій мохъ (*Cetraria islandica* Ach.).

Мохъ сухой, см. Олений мохъ (*Cladonia rangiferina* L.).

Мохъ сучковатый, см. Рокетъ блестящій (*Hypnum splendens* Hedw.).

Мохъ фіалковый, см. Фіалковый мохъ (*Byssus Jolithus* L.).

Мохъ шведскій, см. Лишай лакмусовый шведскій (*Lecanora tartarea* Ach.).

Мохъ шлевскій, см. Исландскій мохъ (*Cetraria islandica* Ach.).

Мохаръ, см. Росичка (*Panicum sanguinale* L.).

Мохвицы, см. Анютины глазки (*Viola tricolor* L.).

Мохлаки, см. Морошка (*Rubus Chamaemorus* L.).

Мохна, см. Лапчатка ползучая (*Potentilla reptans* L.).

Мохнатикъ, см. Горичѣтъ весенній (*Adonis vernalis* L.).

Мохнатка, см. Сладкій корень (*Scorzonera hispanica* L.).

Мохнатый цвѣтъ } см. Рябчикъ обыкновенный (*Fritillaria*

мохначъ } *Meleagris* L.).

Моховикъ, см. Звѣздчатка злачная (*Stellaria graminea* L.).

Мохунка } см. Вишня жидовская (*Physalis Alkekengi* L.).

Мохурка } см. Вишня жидовская (*Physalis Alkekengi* L.).

Мочальникъ, см. Липа мелколистная (*Tilia parvifolia* Ehrh.).

Мочегонъ, см. Кадило пахучее (*Melittis melissophyllum* L.).

Мочегонная трава, см. Бѣлозоръ болотный (*Parnassia palustris* L.).

Моченецъ, см. Ленъ посѣвной (*Linum usitatissimum* L.).

Мошка-дерево, см. Пузырное дерево (*Colutea arborescens* L.).

Мошки, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).

Мошна, см. Пузырное дерево (*Colutea arborescens* L.).

- Мошна**, см. Вишня жидовская (*Physalis Alkekengi* L.).
Мошна, см. Лапчатка ползучая (*Potentilla reptans* L.).
Мошначъ, см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).
Мошнуха, см. Вишня жидовская (*Physalis Alkekengi* L.).
Мошонъ } см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa Pastoris*
Мошовочникъ } Moench.).
Мугри, см. Ослинникъ двулѣтній (*Oenothera biennis* L.).
Мудки, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).
Му...ръзъ, см. Тѣлорѣзъ сабуровидный (*Stratiotes aloides* L.).
М...ушки котовы трава, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).
М...е котова, см. Черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris* L.).
М...ки котовы, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).
Муд...ки котовы, см. Клеверъ пашенный, или кошачій (*Trifolium arvense* L.).
М...ки кошачьи, см. Гравилатъ водяной (*Geum rivale* L.).
М...и коце, см. Костяника (*Rubus saxatilis* L.).
Муд...ки заячьи, см. Клеверъ пашенный, или кошачій (*Trifolium arvense* L.).
Мудрень } см. Лиственница европейская (*Larix europaea* L.).
Мудрикъ }
Мудрія, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).
Мудрость } см. Гулявникъ струйчатый (*Sisymbrium*
Мудрость лекарская } *Sophia* L.).
Муеранъ, см. Душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.).
Муженекъ } см. Подмаренникъ желтый (*Gallium verum* L.).
Мужичокъ }
Мужичокъ, см. Божье дерево (*Artemisia procera* Willd.).
Мужжунникъ, см. Можжевельникъ обыкновенный (*Juniperus communis* L.).
Мунгалскій чай, см. Гравилатъ городской (*Geum urbanum* L.).
Мурава, см. Мятликъ однолѣтній (*Poa annua* L.).
Мурава-трава, см. Гречиха-спорышъ, или Гречиха птичья (*Polygonum aviculare* L.).
Муровецъ, см. Дивала однолѣтняя (*Scleranthus annuus* L.).
Мурогъ, см. Луговикъ дернистый (*Aira caespitosa* L.).
Мурогъ, см. Овсяница высокая (*Festuca elatior* L.).
Мурухъ, см. Гречиха-спорышъ (*Polygonum aviculare* L.).
Мурышка, см. Дивала однолѣтняя (*Scleranthus annuus* L.).
Мурушка, см. Морошка (*Rubus Chamaemorus* L.).
Мусгой, см. Люцерна посѣвная (*Medicago sativa* L.).
Мутки, см. Трясушка средняя (*Brisa media* L.).
Мутная трава, см. Колокольчикъ жестковолосый (*Companula cervicularis* L.).
Мutowое коренье, см. Горлецъ, раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).
Мutowочная трава, см. Подмаренникъ мягкій (*Gallium Mol-lugo* L.).

Мухоловъ, см. Девясилъ растопыренный (*Inula Conyza* DC.).

Мухоловъ, см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).

Мухоловка, см. Рыжикъ полевнй (*Camelina sativa* Crantz.).

Мухоловка (*Arosynum androsaemifolium* L.). Растеніе, произрастающее въ Сѣверной Америкѣ и обладающее весьма острыми, ядовитыми свойствами. Цвѣты выделяютъ клейкій сокъ, такъ что мухи и прочія мелкія наѣдомыя, садясь на нихъ, приклеиваются къ нимъ и умираютъ, становясь такимъ образомъ какъ-бы добычей растенія, которое считается продуктами разложенія своихъ жертвъ.

Мухоморъ (*Agaricus muscarius* L.). Маремуха, Маремухъ. Мухоморъ есть весьма ядовитый грибъ изъ семейства шляпныхъ грибовъ—«гименомицетовъ» (*Hymenomycetes*), распространенной въ сѣверной и средней Россіи. Шляпка его яркочерная, съ бѣлыми бородавками; ненокъ, пластинки, лучеобразно расположенныя на нижней поверхности шляпки, и пленчатое кольцо, закрывающее въ молодомъ возрастѣ пластинки со спорами, бѣлые. Растетъ въ сосновыхъ и березовыхъ лѣсахъ. Отваръ его употребляется, главнымъ образомъ, для отравленія мухъ; инородцы восточной Сибири (Камчатка и Анадырскій край) употребляютъ мухоморъ внутрь, какъ опьяняющее средство, ввидѣ напѣтка или просто кусками. (Таб. XXX, фиг. 168.)

МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Мухоморъ принадлежитъ къ числу сильно ядовитыхъ грибовъ; прежде онъ употреблялся врачами противъ нервныхъ страданій и противъ опухолей железъ, затѣмъ былъ совершенно оставленъ и только за послѣднее время нѣкоторые заграничные врачи стали рекомендовать его отъ чахотки и исхуданія, для чего высушиваютъ нижнюю часть ножки гриба и даютъ ее въ порошокъ или въ спиртной настойкѣ. Какихъ-либо особенно хорошихъ результатовъ отъ такого леченія не наблюдалось. Чаще мухоморами пользуются для истребленія мухъ: грибъ разрѣзаютъ на кусочки, обливаютъ водой или молокомъ и ставятъ на окна въ тарелкахъ; мухи гибнутъ отъ самыхъ маленькихъ дозъ. Грибы развариваютъ въ жидкую кашу и смазываютъ ею щели въ кроватяхъ отъ клоповъ, для того-же употребляютъ и свѣжій сокъ мухомора.

Въ гомеопатіи спиртная настойка мухомора употребляется при судорогахъ, энцефаліи. Витковой шляпкѣ, отъ сильныхъ кожныхъ сыпей, отмораживаній конечностей, носовыхъ кровотеченій, зубной боли, начинающагося заболѣванія спинного мозга, которое выражается въ боляхъ въ крестцѣ и легкомъ параличѣ нижнихъ конечностей. Даютъ 1—2 капли 2-го или 3-го разведенія, такіе приемы повторяютъ отъ 1—2-хъ разъ въ день.

Мухоморъ, см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.)

Мухоморъ, см. Бутень клубненосный (*Chaerophyllum bulbosum* L.).

Мухоморъ, см. Качимъ метельчатый (*Gypsophilla paniculata* Led.).

Мухоморникъ, см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.).

Мухопалъ, см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).

Мухурка, см. Вишня жидовская (*Physalis Alkekengi* L.).

Мушій, см. Щетинникъ зеленый (*Setaria viridis* Beauv.).

Мушка, см. Черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris* L.).

Мушкатница, см. Адокса мускусная (*Adoxa Muschatellina* L.).

Мушкатный орѣхъ (*Myristica fragrans* Houtt.). Мушкатный цвѣтъ. Высокое дерево изъ семейства «мускатовыхъ» (*Myristicaceae*), произрастающее на Молуккскихъ островахъ, обладающее во всѣхъ частяхъ сильнымъ ароматическимъ запахомъ. Главнымъ образомъ цѣнятъ его плоды—«мушкатные орѣхи». Освобожденные отъ вѣшной зеленой оболочки они содержатъ черноватые, овальной формы, зерна,—то, что и называется мушкатными орѣхами, оклеенныя въ мясистую шафрановаго цвѣта оболочку, называемую ошибочно «мушкатнымъ цвѣтомъ».

Изъ орѣховъ выжимается маслянистое жирное вещество,—«мушкатное масло»: кромѣ того, они содержатъ эфирное масло, отличаются прянымъ вкусомъ, почему употребляются ввидѣ приправы къ кушаньямъ, а также въ кондитерскомъ и парфюмерномъ производствахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ маломъ количествѣ мушкатный орѣхъ хорошо дѣйствуетъ на человѣка. Онъ улучшаетъ пищевареніе, поднимаетъ дѣятельность нервной системы. Злоупотребленіе имъ можетъ вызвать раздраженіе слизистой оболочки желудка и кишокъ. Вообще растеніе это само по себѣ крайне рѣдко назначается врачами; оно идетъ только, какъ прибавленіе къ нѣкоторымъ болѣе энергично дѣйствующимъ средствамъ; чаще мушкатный орѣхъ идетъ для наружнаго употребленія, для чего служатъ добываемое въ Индіи мушкатное масло, мушкатный бальзамъ и мушкатная мазь; они употребляются для втираній при боляхъ въ нижней части живота у женщинъ; дѣтямъ мушкатное масло втираютъ въ животъ отъ скопленія газовъ, отъ болей въ подложечной области, слабаго пищеваренія, также его втираютъ въ парализованныя части и отъ отмораживаній. Противъ поносовъ, какъ домашнее средство, рекомендуется отваръ овсянки съ растертымъ мушкатнымъ орѣхомъ.

Въ гомеопатіи готовится спиртная настойка изъ растолченныхъ мушкатныхъ орѣховъ; она дается при боляхъ во время менструацій.

Мушкатный цвѣтъ, см. Мушкатный орѣхъ (*Myristica fragrans* Houtt.).

Мушлица, см. Мыльница лекарственная (*Saponaria officinalis* L.).

Мушмула, см. Мушмула обыкновенная (*Mespilus germanica* L.).

Мушмула обыкновенная (*Mespilus germanica* L.). Аронье дерево, Аронье яблоко, Кизиль, Кизиль дикій, Кизильникъ нѣмецкій, Мисель нѣмецкій, Мушмула, Чашки, Чашковое дерево, Шипки, Шипковое дерево, Шипковникъ. Мушмула обыкновенная есть колючій кустарникъ, выш. 3—7 аршинъ, изъ семейства «яблоневыхъ» (*Romaceae* Lindl.), распространенный въ средней и южной Европѣ, встрѣчающійся въ Крыму и на Кавказѣ. При

хорошемъ уходѣ легко теряетъ иглы и становится деревцомъ. Листья большіе, ланцетовидные, почти цѣльнокрайніе, съ нижней стороны войлочные. Цвѣты бѣлые, одиночные. Чашечка 5-тираздѣльная; 5 лепестковъ и многочисленныя тычинки сидятъ на кольцѣ, находящемся на краю вогнутого цвѣтоложа; завязь 5-тигубная, съ 5-ю столбиками; она срастается съ цвѣтоложемъ и, разрастаясь вмѣстѣ съ нимъ, даетъ крупный, буроватый, шаровидный, костяковый плодъ, содержащій 5 односѣмянныхъ косточекъ, и на верхушкѣ имѣетъ широкій дискъ, надъ которымъ выступаютъ сохраняющіеся длинные листовидные чашелистики. Цвѣтетъ весною. Плоды, долго-пролежавшіе или тронутые морозомъ, съѣдобны и имѣютъ пріятный кисловатый винный вкусъ. Кора, листья и вѣтки употребляются для дубленія. (Табл. XXX. фиг. 166 и 167.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Отваръ листьевъ мушмулы хорошо помогаетъ отъ кроваваго поноса; также имъ полощатъ горло.

Мушмула обыкновенная, см. *Prunella (Amelanchier vulgaris Moench.)*.

Мушникъ, см. Девясилъ растопыренный (*Inula Conuza* Dc.).

Мушнякъ, см. Горошекъ мышиный (*Vicia Cracca* L.).

Мыколайки } см. Синеголовникъ равнинный (*Eryngium saff-*

Мыколайчики } *pestre* L.).

Мыло гусяное, см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).

Мыло дикое, см. Колокольчикъ развѣстный (*Campanula patula* L.).

Мыло дикое, см. Мыльнянка лекарственная (*Saponaria officinalis* L.).

Мыло земляное, см. Кудри царскія (*Lilium Martagon* L.).

Мыло калмыцкое, см. Смола (*Lychnis Viscaria* L.).

Мыло киргизское, см. Зольникъ калийный (*Salsola Kali* L.).

Мыло кошачье, см. Чернокорень обыкновенный (*Cynoglossum officinale* L.).

Мыло кукушкино } см. Мыльнянка лекарственная (*Saponaria*

Мыло собачье } *officinalis* L.).

Мыло собачье, см. Мыльнянка лекарственная (*Saponaria officinalis* L.).

Мыло сорочье, см. Дрема кукушкина цвѣтъ (*Lychnis flos cuculi* L.).

Мыло татарское, см. Мыльнянка лекарственная (*Saponaria officinalis* L.).

Мыловка, см. Хлопушка (*Silene inflata* Smith.).

Мыловка } см. Звѣздчатка злачная (*Stellaria graminea* L.).

Мыловникъ } *Stellaria graminea* L.).

Мыльная трава, см. Чина весенняя (*Orobus vernus* L.).

Мыльная трава, см. Зольникъ калийный (*Salsola Kali* L.).

Мыльная трава, см. Мыльнянка лекарственная (*Saponaria officinalis* L.).

Мыльная трава, см. Звѣздчатка злачная (*Stellaria graminea* L.).

Мыльникъ, см. Мыльнянка лекарствен. (*Saponaria officinalis* L.).

Мыльникъ } см. Заячья капуста (*Sedum Tele-*
 Мыльникъ кустоватый } *phium* L.).
 Мыльница } см. Мыльнянка лекарственная (*Sapona-*
 Мыльный корень } *ria officinalis* L.).
 Мыльный цвѣтъ }
 Мыльнянка, см. Мыльнянка лекарственная (*Saponaria officina-*
lis L.).

Мыльнянка восточная (*Leontice Leontopetalum* L.). Листъ лиловый, Львиное копыто, Рѣна свиная. Растеніе, родомъ изъ Греціи и малой Азіи. Корни его служатъ для очищенія и мытья самыхъ тонкихъ кашемировыхъ тканей, откуда и названіе растенія—восточная мыльнянка. Служитъ туркамъ также, какъ противоядіе отъ вредныхъ послѣдствій опиума.

Мыльнянка лекарственная (*Saponaria officinalis* L.). Фармацевтическое назв. *Saponaria* s. *Saponaria rubra* (Rad.). Арапка, Бобовникъ (Вол.), Гвоздика бѣлая, Гвоздички полевая, большія, Жасминъ воздушный (Вят.), Жасминъ полевой, Кокель (Екат. изм. Куколь), Купена (Смол.), Мульница (Малор.), Мыльникъ, Мыльница, Мыльный корень, Мыльная трава, Мыльный цвѣтъ, Мыльнянка, Мыло дикое, Мыло кукушкино, Мыло собачье, Мыло собаче (Малор.), Мыло татарское, Натягачи, Натягъ (Малор.), Стягачъ (Малор.), Пузырникъ (Вил.), Перелетъ соколий, Сорокопуджикъ (Сарат.), Суставникъ (Нижег.), Фіалка, Фіалокъ полевой (Минск.), Чистуха, Шведка. Лекарствен. мыльнянка представляетъ многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «гвоздичныхъ» (*Sagurphyllaceae*), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ средней и южной Россіи, выш. 7—12 вершковъ. Корневище ползучее, вѣтвистое, стебель прямой, простой или наверху немного вѣтвистый, гладкій или нѣсколько шероховатый. Листья эллиптическіе или продолговатые, острые, съ 3-мя жилками, на краю остро-шероховатые. Душистые розоватые или бѣлые цвѣты собраны пучками на верхушкахъ вѣтвей. Чашечка трубчатая, 5-тизубчатая; лепестковъ 5, съ ноготками; тычинокъ 10; завязь одногнздная; столбиковъ 2. Плодъ—коробочка, раскрывающаяся на верхушкѣ 10 зубцами. Сѣмена почковидныя. Цвѣтетъ съ іюня по октябрь. Растетъ около дорогъ, на берегахъ рѣкъ, на опушкѣ лѣсовъ, на лугахъ. Любимый цвѣтокъ ночныхъ бабочекъ. Въ садахъ иногда разводится съ махровыми цвѣтками. Корневище ядовитое. (Табл. XXXI, фиг. 170.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Корни мыльнянки лекарственной имѣютъ слабый запахъ, при разжевываніи ихъ въ первую минуту вкусъ кажется сладковатымъ, затѣмъ онъ дѣлается сладкогорькій; по химическому анализу корень содержитъ въ себѣ мыльное вещество—сапонинъ и слизь. Разрѣзанный и растираемый въ холодной водѣ корень сильно пѣнится, почему употребляется бѣдными людьми вмѣсто мыла, также онъ хорошо выводитъ пятна и служитъ для мытья шелковыхъ тканей. Листья, собираемые до цвѣтенія, обладаютъ тѣми-же свойствами. Растеніе это принадлежитъ къ числу слабительныхъ средствъ, поддѣмняющихъ обмѣнъ

веществъ въ организмѣ. Врачи назначаютъ его крайне рѣдко, въ домашнемъ-же обиходѣ отваръ корня и листьевъ употребляется, какъ слабительное средство, при застояхъ крови въ полости таза, обусловливающихъ заботливанія органовъ нижней части живота. также отъ долго длящихся сыпей, опухолей, подагры и сифилиса. Для отвара берутъ $\frac{1}{2}$ унціи (15 грм.) корня, наливаютъ его фунтомъ воды и кипятятъ, пока не останется 8 унцъ (240,0 грм., т. е., 16 стол. л.); отваръ этотъ принимаютъ по чайной чашкѣ нѣсколько разъ въ день. Для отвара изъ листьевъ послѣднихъ берутъ цѣлую горсть на фунтъ воды; отваръ листьевъ идетъ для обмываній нечистыхъ язвъ. Также изъ отвара корней или листьевъ дѣлаютъ ванны, которыя помогаютъ отъ чесотки и другихъ упорныхъ сыпей.

Мыльце, см. Истодъ обыкновенный (*Polygala vulgaris* L.).

Мыльце полевое, см. Грызнякъ голый (*Herniaria glabra* L.).

Мыльцій, см. Жасминъ полевой (*Lycium Barbarum* L.).

Мытная, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).

Мытникъ, см. Вишвица (*Pedicularis* L.).

Мышакъ, см. Горошекъ заборный (*Vicia sepium* L.).

Мышатникъ, см. Мышехвостникъ маленький (*Myosorus minimus* L.).

Мышатникъ } см. Мышехвостникъ маленький (*Myosorus mini-*
Мышьякъ } *mus* L.).

Мышей, см. Щетинникъ зеленый (*Setaria viridis* Beauv.).

Мышей, см. Щетинникъ сизый (*Setaria glauca* Beauv.).

Мышей береговой, см. Просо колосистое (*Panicum Crus Galli* L.).

Мышехвостникъ маленький (*Myosorus minimus* L.). Фармацевтическое названіе: *Cauda murina*. Мышнякъ, Хвостъ мышиный, Мышатникъ. Низенькое однолѣтнее и двулѣтнее растение изъ семейства «лютиковыхъ» (*Ranunculaceae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи, съ однолѣтними стрѣлками и прикорневыми узко-линейными листьями. Цвѣты желтовато-зеленые, съ длиннымъ цилиндрическимъ цвѣтоломъ, на которомъ спирально расположены многочисленные плодники. Цвѣтетъ весной. Произрастаетъ на поляхъ и на необработанныхъ мѣстахъ.

Въ медицинѣ это растение совсѣмъ не употребляется.

Мышинный духъ, см. Чернокорень обыкновенный (*Cynoglossum officinale* L.).

Мышиная трава, см. Колокольчикъ сборный (*Campanula glomerata* L.).

Мышій, см. Просо колосистое (*Panicum Crus Galli* L.).

Мышій, см. Щетинникъ сизый (*Setaria glauca* Beauv.).

Мышій степовой, см. Люцерна посѣвная (*Medicago sativa* L.).

Мышій духъ, см. Чернокорень обыкновенный (*Cynoglossum officinale* L.).

Мышка трава, см. Гречиха-вьюнокъ (*Polygonum Convolvulus* L.).

Мышки } см. Чина клубненосная (*Lathyrus tube-*
Мышки земляныя } *rosus* L.).

Мышнякъ, см. Мышехвостникъ маленький (*Myosorus minimum* L.).

Мышья трава, см. Погremoкъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista Galli* L.).

Мышья трава, см. Щетинникъ зеленый (*Setaria viridis* Beauv.).

Мышьякъ, см. Чина луговая (*Lathyrus pratensis* L.).

Мышьякъ, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.).

Мышьякъ, см. Горошекъ мышиный (*Vicia Cracca* L.).

Мѣдянка, см. Желтуха (*Senecio Jacobea* L.).

Мѣла дубовая, см. Омела обыкновенная (*Viscum album* L.).

Мѣсячиха трава } см. Селезеночникъ очереднолистный (*Chrysosplenium alternifolium* L.).

Мѣсячная трава }

Мѣсячникъ, см. Можжевельникъ казакій (*Juniperus sabina* L.).

Мѣсячникъ, см. Лунникъ многолѣтний (*Lunaria biennis* Moench.).

Мѣсячникъ, см. Вахта трилистная (*Menyanthes trifoliata* L.).

Мѣткая трава, см. Иванъ да Марья (*Melampyrum Nemorosum* L.).

Мѣхунки, см. Вишня жидовская (*Physalis Alkekengi* L.).

Мѣшалка, см. Базиликъ душистый (*Ocimum Basilicum* L.).

Мѣшей, см. Щетинникъ сизый (*Setaria glauca* Beauv.).

Мѣшей, см. Щетинникъ зеленый (*Setaria viridis* Beauv.).

Мягкая трава, см. Гусиная лапка (*Potentilla anserina* L.).

Мякушка бѣлая, см. Клеверъ бѣлый ползучій (*Trifolium repens* L.).

Мянда, см. Сосна обыкновенная (*Pinus silvestris* L.).

Мясная трава, см. Дрема кукушкинъ цвѣтъ (*Lychnis flos cuculi* L.).

Мята англійская, см. Мята перечная (*Mentha piperita* L.).

Мята блошница }

Мята боровая } см. Мята полевая (*Mentha arvensis* L.).

Мята глухая }

Мята глухая, см. Душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.).

Мята дикая, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).

Мята дикая, см. Чистецъ лѣсной (*Stachys silvatica* L.).

Мята дикая, см. Мята полевая (*Mentha arvensis* L.).

Мята дикая, см. Мята лѣсная (*Mentha silvestris* L.).

Мята душистая, см. Мята квасная (*Mentha aquatica* L.).

Мята желтая, см. Девясилъ растопыренный (*Jnula Conyza* DC.).

Мята квасная (*Mentha aquatica* L.). Фармацевтическое названіе:

Mentha aquatica s. *Balsamum palustre* s. *Sisymbrium officinarum* (Herba). Душица полевая, Мята душистая, Мята водяная,

Мята клева (Умань), Полій (Малор.). Квасная мята представляетъ многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «губо-

цвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ, въ средн. и южн. Россіи и въ Сибири, обыкновенно шер-

шавое. Стебель выш. 7—22½ вершк. Листья черешковые, яйце-

видные, супротивные, пильчатые. Розовые или лиловые цвѣты

сгущены почти шаровидными, верхушечными головками. Ча-

шечка 5-зубчатая, трубчатая; вѣнчикъ 4-лопастный, ворончатый,

почти правильный; тычинокъ 4, равныхъ, съ расходящимися

параллельными гнѣздами пыльниковъ. Завязь верхняя, 4-гнѣзд-

ная, 4-хлопастная, съ однимъ столбикомъ, заканчивающимся двураздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ по созрѣваніи распадается на 4 овальныхъ гладкихъ орѣшка. Цвѣтеть во второй половинѣ лѣта. Растетъ на сырыхъ мѣстахъ, по берегамъ и по болотамъ. По своему дѣйствию занимаетъ первое мѣсто, уступая только въ пряности запаха мятѣ перечной. (Табл. XXXI. флг. 172).

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Листья мяты обыкновенно собираются передъ цвѣтеніемъ, высушиваются и сохраняются въ хорошо закупоренныхъ банкахъ. Листья имѣютъ сильный пряный запахъ, жгучій вначалѣ и затѣмъ охлаждающій вкусъ и содержатъ въ себѣ эфирное масло и желѣзистое дубильное вещество.

Отваръ мяты употребляется какъ снаружи, такъ и внутрь, какъ средство, слегка возбуждающее нервную систему и успокоивающее судорожное состояніе мышцъ, и какъ вѣтрогонное средство. Особенно часто въ домашнемъ быту мята употребляется при разстройствахъ дѣятельности кишечника, при боляхъ отъ скопленія вѣтровъ, при поносахъ. Снаружи отваръ мяты примѣняютъ для обмываній и ваннъ. Изъ фармацевтическихъ препаратовъ чаще другихъ употребляются мятное масло, мятная вода и мятная эссенція. Мятныя лепешки приготовляются изъ сахара съ мяснымъ масломъ. Мята входитъ въ составъ ароматическаго укуса и ароматическаго сбора. Отваръ мяты заваривается, какъ чай: на фунтъ воды берутъ горсть мяты и пьютъ ее чашками; кромѣ успокоенія желудочной боли, отваръ мяты увеличиваетъ отдѣленіе мочи. Изъ свѣжихъ листьевъ выжимается сокъ, который принимается столовыми ложками съ бѣлымъ виномъ и считается хорошимъ мочегоннымъ средствомъ, помогающимъ отъ каменной болѣзни. Мятные листья ѣдятъ сырые вмѣстѣ съ салатомъ.

Въ ветеринарной мѣдѣцинѣ мята употребляется также при боляхъ въ животѣ и скопленіи вѣтровъ, и при слабости животныхъ. Лошадямъ и рогатому скоту даютъ отъ 15,0—45,0 грм. ($\frac{1}{2}$ ун. до $1\frac{1}{2}$ ун.), овцамъ и свиньямъ—7,5—15,0 грм. (2 драхм. до $\frac{1}{2}$ унц.), собакамъ—отъ 0,5—2,0 грм. (8 гр. до $\frac{1}{4}$ драхмы); предпочтительнѣе давать въ отварѣ, хотя даютъ и въ порошокъ ввидѣ кашекъ.

Мята конская, см. Шандра обыкновенная (*Marrubium vulgare* L.).

Мята конская, см. Мята полевая (*Mentha arvensis* L.).

Мята котовая, см. Черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris* L.).

Мята кошачья, см. Живучка ползучая (*Ajuga reptans* L.).

Мята кошачья, см. Пахучка обыкновенная (*Calamintha Clinopodium* Benth.).

Мята кошачья, см. Жабникъ пашенный (*Filago arvensis* L.).

Мята кошачья, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).

Мята кошачья, см. Котовикъ кошачій (*Nepeta Cataria* L.).

Мята кошачья, см. Чистецъ болотный (*Stachys palustris* L.).

Мята кудрявая (*Mentha crispa* Valerii Cordi et Lin.). Фармацев-

тическое название: *Mentha crispa vera*. Мята пѣмецкая, кучерявая (Курск.), лѣсная (Минск.), луговая (Черн.), огородная (Полт.). Мята кудрява (Малор.), Мята кучерява. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное на югѣ Европы и Россіи. Корень ползучій, длинный, волокнистый; стебель волосистый, вѣтвистый, выс. до 2 футъ. Листья супротивные, почти сидячіе, темно-зеленые, снизу пушистые, бѣловатые, пильчатые, волосистые, кудрявые. Небольшие пурпуровые или фіолетовые цвѣты скучены почти шаровидными верхушечными головками. Чашечка трубчатая, 5-тизубчатая, волосистая; вѣнчикъ вдвое длиннѣе чашечки, правильный, 4-хлопастный. Тычинокъ 4, равныхъ, съ расходящимися гнѣздами пыльниковъ. Завязь верхняя, 4-хлопастная, 4-хгнѣздная, съ однимъ столбикомъ, оканчивающимся 9-тираздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ распадается по созрѣваніи на 4 овальныхъ гладкихъ орѣшка. Цвѣтетъ съ іюня по августъ. Растетъ на сырыхъ мѣстахъ, около заборовъ. Обладаетъ пріятнымъ, сильнымъ запахомъ. Вкусъ холодный, ароматный. При высушиваніи почти не теряетъ своихъ физическихъ свойствъ. Для употребленія ее срѣзаютъ до цвѣта; сушатъ ее чаще всего на солнцѣ; хранить ее нужно въ сухомъ мѣстѣ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Кудрявая мята по своимъ свойствамъ очень близка къ мятѣ душистой. Употребленіе ея было извѣстно въ глубокой древности. Родина мяты, по всей вѣроятности, Китай, откуда она была перевезена въ другія азіатскія и европейскія государства. Во времена римскихъ императоровъ мята, кромѣ лекарственныхъ цѣлей, служила еще для косметическихъ и кухонныхъ цѣлей. Вслѣдствіе многочисленныхъ злоупотребленій римлянкамъ подѣ страхомъ смерти запрещалось пить вино, а потому конфеты изъ меда и мяты въ случаѣ нарушенія закона служили имъ спасеніемъ, такъ какъ отбивали запахъ вина изъ рта. (Мятными лепешками и досихъ поръ пользуются люди съ этою цѣлью.)

Римляне перенесли мяту въ Іудею, и Спаситель упрекалъ фарисеевъ въ роскоши за то, что они шекотали свой носъ и небо частымъ употребленіемъ мяты, аниса и тмина.

Древніе врачи прописывали мяту противъ многихъ болѣзней. Въ настоящее время чистая мята, именно листья ея, употребляется только въ домашнемъ обиходѣ, врачи-же прописываютъ только мятную воду, мятное масло и добываемое изъ него вещество, называемое ментоломъ. Ментолъ обладаетъ сильною способностью при прикосновеніи вызывать чувство холода. Изъ него дѣлаютъ, такъ называемый, мигренный карандашъ (*Migraen-Stift*). Ментолъ входитъ въ составъ противовоспалительныхъ мазей для слизистыхъ оболочекъ, напр., очень часто его кладутъ специалисты по носовымъ болѣзнямъ въ носовую мазь. Мятная спиртная настойка входитъ въ составъ противохолерныхъ капель, которыя состоятъ изъ слѣдующихъ веществъ: настойки стрихнина (пос. чопіс.) и опія по 1 драхмѣ (4,0 грм.), настойки мяты и про-

стой валеріаны по 2 драхмы (8,0 грм.). Такую смѣсь даютъ по 15-ти—20-ти капель 4—6 разъ въ день. Очень хорошая домашняя мятная эссенція, употребляемая отъ всѣхъ вышеупомянутыхъ болѣзней, готовится слѣд. обр.: берутъ горсть тмина, двѣ горсти кудрявой мяты и мелко-нарезанной высушенной померанцевой корки и все это всыпаютъ въ литръ чистой, хорошей водки, хорошо закупориваютъ и оставляютъ настаиваться въ теченіе 3—4 недѣль на солнцѣ. Потомъ фильтруютъ черезъ чистое полотно, хорошо выжимаютъ, доливаютъ недостающую водку и все подслащаютъ сахаромъ, котораго берутъ 500 грм. (1 фунтъ). Лучше всего начать настаивать эссенцію въ июль, когда мята всего крѣпче. Пьютъ такую эссенцію по рюмкѣ.

Мяту кладутъ въ кислые щи и квасъ для улучшенія ихъ вкуса. Ее настаиваютъ въ укусуѣ, которымъ окуриваютъ комнаты. Отваренная въ простомъ винѣ мята употребляется въ домашнемъ быту видѣ примочки отъ ушибовъ.

Мятное масло принимаютъ внутрь на кусочкѣ сахара отъ 3-хъ до 4-хъ капель въ тѣхъ-же случаяхъ, при которыхъ принимаютъ мятный чай. По отнятіи отъ груди кормилицы натираютъ себя этимъ масломъ подъ мышками для уменьшенія молока. Мятная вода прибавляется для вкуса въ эмульсіи изъ миндального и касторового масла, также дается и чистая по столовой ложкѣ для уменьшенія боли въ животѣ отъ скопленія вѣтровъ.

Въ ветеринарной медицинѣ кудрявая мята дается въ томъ-же количествѣ и при тѣхъ-же болѣзняхъ, какъ и мята квасная.

Мята кучерявая, см. Мята кудрявая (*Mentha crispa* Val.).
Мята лимонная, см. Мелисса лекарственная (*Melissa officinalis* L.).

Мята лісова, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).

Мята луговая, см. Мята кудрявая (*Mentha crispa* Val. C. et Lin.).

Мята лѣсная, см. Душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.).

Мята лѣсная (*Mentha silvestris* L.). Фармацевтическое названіе: (*Mentha silvestris* s. *longifolia*. s. *equina*. s. *Menthastrum*. Мята дикая, простая, полевая, русская. Расперстница (Вор.). Материнка. Мята лѣсная есть многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ средней и южной Россіи. Стебель выш. 7—17 вершк.; листья почти сидячіе, яйцевидные или ланцетные, пильчатые. Красноватые цвѣты въ густыхъ цилиндрическихъ колосьяхъ, съ шиловидными прицвѣтниками. Чашечка 5-тизубчатая, трубчатая, съ шиловидными, длинными зубцами; вѣнчикъ почти правильный, 4-хлопастный. Тычинокъ 4, съ расходящимися гнѣздами пыльниковъ. Завязь верхняя, 4-гнѣздная, 4-хлопастная; столбикъ съ 2-раздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ распадается по созрѣваніи на 4 гладкихъ овальныхъ орѣшка. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на влажныхъ мѣстахъ и по берегамъ. (Рис. 189.)

Мята нѣмецкая } см. Мята кудрявая (*Mentha crispa* Val. C. et
Мята огородная } Ltn.).

Мята перечная (*Mentha piperita* L.). Фармацевтическое названіе: *Mentha piperita* s. *anglicana*, s. *piperitis*. Англійская мята, Мята холодянка, Мята холодная. Мята-холодка. Мята перечная есть многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), въ дикомъ состояніи неизвѣстна, но всюду воздѣлывается въ Россіи. преимущественно въ средней полосѣ. Стебель выш. 7—14 вершк.; листья черешковые, продолговато-яйцевидные, остролищчатые. Красноватые цвѣты въ продолговатыхъ, прерванныхъ вѣтви, колосьяхъ; чашечка 5-тизубчатая, съ шиловидными зубцами; вѣнчикъ 4-хлопастный, почти правильный. Тычинокъ 4 равныхъ, съ расходящимися гнѣздами пыльниковъ. Завязь верхняя, 4-хгнѣздная, 4-хлопастная; столбикъ съ 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Прицвѣтники шиловидные. Плодъ по созрѣваніи распадается на 4 гладкихъ овальныхъ орѣшка. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Имѣетъ сильный ароматическій запахъ, во рту производить ощущеніе холода. Разводить ее можно легкими отсадками корней. Любитъ она рыхлую, нѣсколько песчаную, сыроватую, хорошо удобренную землю. Такъ какъ мята боится мороза, то на зиму слѣдуетъ укрывать гряды ея соломой и полунерегнившимъ лошадинымъ навозомъ. Собирается она въ іюль и августѣ; сушить—въ умеренномъ теплѣ. Употребляется въ медицинѣ, въ косметическомъ и кондитерскомъ производствахъ, при приготовленіи ликеровъ и т. п. (Табл. XXXI, фиг. 171.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Медицинское употребленіе мяты перечной—то-же, что и двухъ другихъ сортовъ мяты. Масло перечной мяты особенно рекомендуется въ народѣ при хронической слабости глазъ и ревматическихъ боляхъ зубовъ и ушей.

Мята полевая (*Mentha argens* L.). Фармацевтическое названіе: *Mentha equina*, vel. *silvestris*. Бѣжава (Каз.), Глушнякъ (Арх.), Драголюбъ (Малор.), Душица (Иск.), Душица дикая (Смол.), Материвка (Орл.), Мята дикая (Вел. Росс.), глухая (Вор., Тар.), конская (Полт.), Мята блошница (Тавр.), Мята боровая, копча (Смол.), собачья (Арх.), лѣсная (Гродн.), Мята кінська, Мачихинъ листъ (Олон.). Плодовая (Олон.). Подгрудникъ (Гродн.), Подусентъ Марія (Екат.). Переконъ (Вятск.), Шипковинная (Мог.). Это есть многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное почти по всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель выш. 7—22½ вершк. Листья округлые, эллиптическіе, черешковые. Цвѣты розовые или лиловые сидятъ въ пазухахъ листьевъ удаленными другъ отъ друга мутовками. Чашечка 5-тизубчатая; вѣнчикъ 4-хлопастный, почти правильный; тычинокъ 4; гнѣзда пыльниковъ расходящіеся. Завязь верхняя, 4-хлопастная, 4-хгнѣздная. Столбикъ съ 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ при созрѣваніи распадается на 4 гладкихъ овальныхъ орѣшка. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на поляхъ и по берегамъ. (Рис. 190.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Полевая мята употребляется отъ кашля, удушья, отъ поноса; отъ боли глотки даютъ отваръ мяты съ медомъ. Отъ укушенія бѣшеной собакой на мѣсто укуса прикладываютъ листья полевой мяты.

Мята полевая, см. Живучка мохнатая (*Ajuga genevensis* L.).

Мята полевая, см. Душевикъ остролиственный (*Calamintha Asinos* Benth.).

Мята полевая, см. Котовикъ кошачій (*Nepeta Cataria* L.).

Мята полевая, см. Душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.).

Мята полевая, см. Чистецъ болотный (*Stachys palustris* L.).

Мята ползучая, см. Котовикъ голый (*Nepeta nuda* L.).

Мята простая, см. Мята лѣсная (*Mentha silvestris* L.).

Мята пташья } см. Мокрица (*Stellaria media* Smith.).

Мята птичья }

Мята рубчатая, см. Пахучка обыкновенная (*Calamintha Clinopodium* Benth.).

Мята русская, см. Мята лѣсная (*Mentha silvestris* L.).

Мята собачья, см. Чернокудренникъ черный (*Ballota nigra* L.).

Мята собачья, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).

Мята собачья, см. Мята полевая (*Mentha arvensis* L.).

Мята холодная } см. Мята перечная (*Mentha piperita* L.).

Мята холодянка }

Мята чертова, см. Василистникъ голубковый (*Thalictrum aquilegifolium* L.).

Мятка, см. Melissa лекарственная (*Melissa officinalis* L.).

Мятлика, см. Мятликъ однолѣтній (*Poa annua* L.).

Мятлика, см. Мятликъ луговой (*Poa pratensis* L.).

Мятликъ, см. Мятликъ обыкновенный (*Poa trivialis* L.).

Мятликъ луговой (*Poa pratensis* L.). Метла (Моск.), Мятлика, Мликотина (Подол.), Лидзка чупрынка (Умань), Смогранецъ. Многолѣтняя трава изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенная во всей Европѣ и во всей Россіи. Корневище съ длинными ползучими подземными побѣгами. Стебли и влагалища листьевъ гладкіе. Листья мягкіе, свѣтло-зеленые. Пластинка верхняго листа значительно короче влагалища. Язычекъ листа короткій, тугой. Нижнія вѣтви раскидистой метелки сидятъ на главной оси по 5, рѣже по 3—4. Колоски 3-хвѣтные, сплюснутые съ боковъ, продолговато-яйцевидные, зеленые или слегка фиолетовые. Створки (двѣ нижнія чешуи у колоска) короче колоска и даже непосредственно слѣдующихъ за ними пленокъ (т. е., цвѣточныхъ чешуй, или 2 пленки у каждаго изъ цвѣтковъ въ колоскѣ); тѣ и другія—килевидныя, безъ остей. Тычинокъ 3; завязь одногнѣздная, односѣмянная, съ 2-мя столбиками. Плодъ—зерновка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на поляхъ и между кустарниками. Принадлежитъ къ числу лучшихъ кормовыхъ травъ. (Рис. 191.)

Мятликъ лѣсной (*Poa nemoralis* L.). Волосница (Хар.), Гусятникъ (Хар.), Стоногъ, Свистушка (Балта), Тонконогъ, Тонко-

ножка, Хитрѣйникъ (Нижег.). Многолѣтняя трава изъ семейства «злаковыхъ» (Gramineae Juss.), распространенная почти во всей Россіи. Ее легко отличить отъ мятлика лугового (описаніе см. выше) по верхнему листу, пластинка котораго длиннѣе влагалища, а отъ мятлика обыкновеннаго (описаніе см. ниже)—по тупому, очень короткому (короче ширины) язычку. Растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками. Принадлежитъ къ числу кормовыхъ травъ.

Мятликъ обыкновенный (*Poa trivialis* L.). Гусятникъ, Внипа (Ниж.), Костерь лѣсной, Метлико, Мятликъ, Мятлина, Шырей (Смол.), Стоногъ, Тонконогъ (Новорос.). Мятликъ обыкновенный есть многолѣтняя трава, выш. 7—22½ вершк., изъ семейства «злаковыхъ» (Gramineae Juss.), распространенная по всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель и влагалища листьевъ остро-першавые. Пластинка верхняго листа значительно короче влагалища; язычекъ длинный, острый. Метелка раскидистая, нижнія ея вѣтви сидятъ на главной оси по 5, иногда по 3—4. Колоски большей частью 3-хъвѣтные: зеленые или фіолетовые. Створки колоска или его двѣ нижнія чешуи, значительно короче колоска и непосредственно слѣдующихъ за ними пленокъ (цвѣточныхъ чешуй); тѣ и другія—килевидныя, безъ остей. Тычинокъ 3. Завязь одностыльная, одноосѣмянная. Столбиковъ 2. Плодъ—зерновка. Растетъ на сырыхъ лугахъ, по болотамъ, по берегамъ рѣкъ. Хорошая кормовая трава. (Табл. XXXI, фиг. 173.)

Мятликъ однолѣтній (*Poa annua* L.). Гусинникъ (Сарат.), Мятлика, Мурава. Однолѣтняя травка выш. 2½—7 вершк., изъ семейства «злаковыхъ» (Gramineae Juss.), распространенная почти во всей Европѣ и во всей Россіи, съ слегка сплюснутымъ колѣчато-приподнимающимся стеблемъ и свѣтло-зелеными мягкими плоскими листьями. Язычекъ листа продолговатый. Метелка большей частью односторонняя; вѣтви ея гладкія и сидятъ на главной оси по одной или по двѣ. Колоски 3—7-михъвѣтные, сплюснутые съ боковъ, продолговато-яйцевидные, зеленые или слегка фіолетовые. Створки, т. е., двѣ нижнія чешуи у каждаго колоска, короче колоска и непосредственно слѣдующихъ за ними цвѣточныхъ пленокъ; тѣ и другія килевидныя, безъ остей. Тычинокъ три. Завязь одностыльная, одноосѣмянная, съ 2-мя столбиками. Плодъ—зерновка. Цвѣтетъ съ весны до осени. Встрѣчается на поляхъ, около дорогъ, въ садахъ и огородахъ, (Рис. 192.)

Мятлина, см. Мятликъ обыкновенный (*Poa trivialis* L.).

Мяточникъ, см. Чернокудренникъ черный (*Ballota nigra* L.).

Мятчникъ, см. Будра килевидная (*Glechoma hederacea* L.).

Мяунъ аптечный, см. Валериана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

Мячка, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).

Н.

Навозная трава, см. Марь вонючая (*Chenopodium vulvaria* L.).

Навротичъ, см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.).

Нагидки полівые, см. Пунавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).

Нагидникъ, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).

Наітки, см. Ноготки (*Calendula officinalis* L.).

Нагозка, см. Ноготки (*Calendula officinalis* L.).

Нагодки, см. Клеверъ темноцвѣтный, хмелекъ (*Trifolium spadi-
ceum* L.).

Наголоватень, см. Чертополохъ полевой (*Cirsium arvense* Scop.).

Наголоватець, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba
officinalis* L.).

Наголоватки, см. Василекъ луговой (*Centaurea jacea* L.).

Наголоватки, см. Чертополохъ полевой (*Cirsium arvense* Scop.).

Наголоватки, см. Наголоватокъ красный (*Jurinea cyanoides*
Rich.).

Наголоватокъ, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arven-
sis* L.).

Наголоватокъ красный (*Jurinea cyanoides* Rich.), Вилка (Малор.), Вѣлка, Грозникъ мужской (Черн.), Наголоватки (Малор.), Огникъ (Подол.), Пижмо (Кіев.), Подбѣлъ (Черн.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное въ южной и въ юго-западной Россіи и на югѣ Германіи. Стебель простой или немного вѣтви-
стый, мало-олиственный, паутинисто-войлочный; листья лан-
цетные, сверху немного паутинистые, темнозеленые, снизу гу-
сто-бѣло-войлочные, съ завороченными краями, обыкновенно
глубоко-перисто-раздѣльные, съ продолговато или линейно-лан-
цетными, рѣже линейными долями, рѣдко цѣльными; нижніе листья
собранные розеткой, снабжены черешками, верхніе—стеблевые
линейные; корзинки цвѣтовъ одиночныя, на длинныхъ ножкахъ
рѣдко немногія сближены, съ бѣловато-шерстистой оберткой
листочекъ послѣдней линейно-ланцетные, наружныя—травянистые
съ острою отвороченною верхушкой, внутренніе немного длиннѣе
съ вверхъ-стоячею пленчатой и окрашенной верхнею частью
Цвѣты всѣ одинаковые—обоеполовые. Тычинокъ 5; пыльники
снабжены при основаніи цѣльными или рѣсничато-бахромчаты-
ми придатками. Завязь нижняя, одногнѣздная, односѣмянная
Столбикъ съ короткими и туповатыми долями. Плодь—клино-
видная 4-хгранная съ продольными ребрышками голыя сѣмян-
ки. Цвѣтетъ лѣтомъ и осенью. Растетъ на песчаныхъ и степ-
ныхъ мѣстахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Наголоватокъ красный извѣ-
стенъ только въ народной медицинѣ. Листья растенія считаются
предохранительнымъ средствомъ и средствомъ леченія скарлатины

Употребляется растение также отъ грыжи (въ Черниговской губ.), отчего произошло названіе грызникъ. отъ сыпи, называемой крестьянами огникъ (въ Подольской губ.). Въ Малороссіи растение освящаютъ на Маковея (1-го августа). Его даютъ въ кормъ коровамъ, чтобы у нихъ было больше молока.

Наголоватокъ фіолетовый, см. Васплекъ перистый (*Centaurea Scabiosa* L.).

Надсадникъ, см. Випища болотная (*Pedicularis palustris* L.).

Надсадникъ, см. Пестецъ обыкновенный (*Polygala vulgaris* L.).

Надтинникъ } см. Пасленъ сладко-горькій (*Solanum dulca-*

Надтынникъ } тара L.).

Надушей-цвѣтъ, см. Колокольчикъ крапиволистный (*Campanula Trachelium* L.).

Накамникъ черный, см. Ерникъ обыкновенный (*Empetrum nigrum* L.).

Наперстникъ, см. Наперстянка крупноцвѣтная (*Digitalis grandiflora* Lam.).

Наперстница, см. Плаунъ булавистый (*Lycopodium clavatum* L.).

Наперстянка, см. Наперстянка крупноцвѣтная (*Digitalis grandiflora* Lam.).

Наперстянка крупноцвѣтная (*Digitalis grandiflora* Lam.).

Дзвончикъ (Гродн.), Колокольчикъ жовтй (Малор.), Наперстникъ, Наперсточная трава, Наперстянка, Натягачъ (Черн., Волын.), и изм. Стягачъ, Рюмочникъ (Курск.), Сбаночки (Бесс.), Ползко-цвѣтъ (Мал.). Ядовитое многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «поричниковыхъ» (*Scrophulariaceae* R. Br.), распространенное въ средней Европѣ, въ средней полосѣ Россіи, въ юго-западномъ краѣ и на Уралѣ. Корневище короткое; стебель прямой, выш. 11—27 вершк., обыкновенно простой. Листья пальчатые, слегка пушистые, нижніе при основаніи суженные, стеблевые сидячіе, спиральныя. Крупныя сѣрно-желтыя цвѣты расположены по 10—15 длинною кистью въ углахъ верхушечныхъ листьевъ; чашечка 5-тираздѣльная; вѣнчикъ тусклый, сѣрно-желтаго цвѣта, на внутренней поверхности съ буроватыми жилками, трубчато-колокольчатый, двугубый, съ болѣе короткою верхнею губой и болѣе длинною и широкою средней лопастью нижней губы. Тычинокъ 4, изъ которыхъ 2-длиннѣе двухъ другихъ, съ двугубными пыльниками и вверхъ согнутыми нитями. Завязь верхняя, двугубная, съ однимъ длиннымъ столбикомъ, заканчивающимся 2-хлопастнымъ рыльцемъ. Плодъ—яйцевидная, двугубная, железисто-пушистая коробочка, влвое превращающаяся чашечку, по перегородкѣ двустворчатая, съ многочисленными овальными морщинистыми сѣменами. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ между кустарниками и въ лѣсахъ.

МЕДИЦИНОКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Наперстянка крупноцвѣтная употребляется въ народной медицинѣ отъ поврежденія и лома суставовъ; листья прикладываются на раны.

Наперстянка пурпуровая (*Digitalis purpurea* L.). Фармацевтическое названіе: *Digitalis s. Virga regia* (Herba). Наперсточная

травя. Ядовитая двулѣтняя или многолѣтняя трава. выш. 7—27 вершк., изъ семейства «норичниковыхъ» (*Scrophulariaceae* R. Br.), распространенная въ средней и западной Европѣ. Стебель войлочно-волосистый. Листья очередные, длинно-черешковые, яйцевидно-ланцетные, городчатые, снизу-войлочные. Довольно крупные цвѣты собраны длинною одностороннею кистью; чашечка 5-тираздѣльная; вѣнчикъ двугубый, 5-тилопастный, пурпуровый, внутри испещренный темно-пурпуровыми пятнами. Тычинокъ 4, двусильныхъ, съ двугнѣздными пыльниками; завязь верхняя, двугнѣздная, съ длиннымъ столбикомъ, оканчивающимся 2-хлопастнымъ рыльцемъ. Плодь—яйцевидная, двугнѣздная, двустворчатая, железисто-пушистая коробочка съ многочисленными овальными морщинистыми сѣменами. Разводится въ садахъ ради красивыхъ цвѣтовъ. (Табл. XXXII, фиг. 176.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Наперстнянка пурпуровая, какъ лекарственное средство, извѣстна давно и очень цѣнится врачами. Она дѣйствуетъ, главнымъ образомъ, на сердце, уравнивая замедленія и вообще поднимая его дѣятельность, почему полезна во многихъ страданіяхъ сердца. Но трава эта очень ядовита, злоупотребленіе ею можетъ вызвать какъ разъ обратное явленіе, именно: параличъ сердца, потому она должна употребляться только по назначенію врача и подъ его строгимъ контролемъ.

Листья наперстнянки собираются въ началѣ цвѣтенія въ гористыхъ мѣстахъ на Альпахъ съ растеній, цвѣтущихъ второй годъ, и высушиваются на солнцѣ. Каждый годъ собираютъ новые листья; старые выбрасываются, какъ потерявшіе свою силу. Свѣжее растеніе при растираніи между пальцами развиваетъ острый, не-пріятный запахъ, который пропадаетъ при высушиваніи; вкусъ листьевъ острый и горькій. Изъ растенія врачами добыто въ чистомъ видѣ дѣйствующее начало наперстнянки, которое наз. дигиталиномъ. Наперстнянка назначается врачами: при болѣзняхъ сердца, когда сердце слабѣетъ и наступаютъ расстройства его дѣятельности, выражающіяся въ одышкѣ, кашлѣ, сердцебиеніи, отекахъ на ногахъ, затѣмъ въ острыхъ лихорадочныхъ заболѣваніяхъ легкихъ и плевры, при крупозномъ воспаленіи легкихъ и остромъ сывороточномъ плевритѣ, при остромъ сочленовномъ ревматизмѣ, который грозитъ воспаленіемъ внутренней оболочки сердца, при кровотеченияхъ изъ легкихъ и матки и въ нѣкоторыхъ душевныхъ болѣзняхъ. Наперстнянка не выдѣляется сразу изъ организма, часть ея задерживается въ тѣлѣ, и при новыхъ приемахъ продолжаютъ накапливаться новыя и новыя количества ея, которыя уже дѣйствуютъ на сердце, какъ ядъ. Вотъ почему за дѣйствіемъ наперстнянки всегда долженъ слѣдить врачъ, и при малѣйшихъ указаніяхъ на ея ядовитое необходимо дѣйствіе сейчасъ же оставить лекарство.

Врачи большею частію прописываютъ наперстнянку въ видѣ настоя: взрослому человѣку изъ 6—8 или 10-ти гранъ (0,4, 0,5, 0,6 грм.) на 6 унцъ (180,0 грм.) воды черезъ 2 часа по столовой ложкѣ; дѣтямъ дается настой изъ 2-хъ гранъ (0,15 грм.) на 2 унца (60,0 грм.) тоже че-

резь 2 часа по чайной ложкѣ. Если наперстнянка дѣйствуетъ удачно, то уже черезъ 2—3 дня больные, въ особенности страдающіе разстройствомъ дѣятельности сердца, чувствуютъ облегченіе: сердце ихъ бьется ровнѣе, одышка становится меньше, отеки опадаютъ, количество выделяющейся мочи увеличивается, появляются аппетитъ и бодрость духа. Въ такомъ состояніи больной долженъ оставить лекарство. Если онъ будетъ продолжать принимать его долгое время, то количество лекарства, накапливающееся въ организмѣ, начнетъ дѣйствовать, какъ ядъ. При отравленіи наперстнянкою у больного наступаютъ рвота и поносъ, слабость, сонливость, одышка, уменьшеніе количества мочи, рѣдкій пульсъ, обмороки и иногда судороги, у беременныхъ—преждевременные роды. Смерть наступаетъ при явленіяхъ общаго упадка силъ, въ особенности отъ развивающейся слабости сердца. До прихода врача больного укладываютъ въ постель, что необходимо при склонности больныхъ къ обморокамъ. Если отравленіе сопровождается рвотою, обильное питье запрещается. Для поднятія дѣятельности сердца даютъ вино. Кромѣ воднаго настоя листьевъ наперстнянки даютъ также спиртную настойку и изрѣдка порошокъ. Спиртную настойку наперстнянки принимаютъ отъ 3-хъ до 10-ти капель 2—3 раза въ день; порошокъ листьевъ наперстнянки идетъ для приготовленія пилюль. на приемъ не болѣе $\frac{1}{4}$ —2 грм. (0,01—0,1). Листья дѣйствуютъ сильнѣе настоя, но раздражаютъ пищеварительные органы.

Въ гомеопатіи наперстнянка дается при подагрическихъ припадкахъ, желтухѣ скопленіяхъ жидкости въ грудной и брюшной полости, при гастрическихъ лихорадкахъ, тифѣ, головной водянкѣ, меланхоліи, ослабленіи памяти, при опуханіи лимфатическихъ железъ, при натуральныхъ и золотушныхъ воспаленіяхъ глазъ, при хроническихъ воспаленіяхъ печени, плевры, при кровохарканіи, одышкѣ, сердцебіеніи, хроническихъ порокахъ сердца и больныхъ кровеносныхъ сосудовъ, сопровождающихся отекомъ на ногахъ. Даютъ 1—2 капли чистой настойки, которую готовятъ, собирая ежегодно листья наперстнянки въ юнѣ мѣсяцъ передъ ея цвѣтеніемъ. Также наперстнянку даютъ разведенною, 1-го и 2-го разведенія, по 1—2 капли и повторяю т приемы, смотря по обстоятельствамъ, черезъ 4, 6, 8 и 12 часовъ.

Въ ветеринарной медицинѣ наперстнянка дается животнымъ въ случаяхъ остраго воспаленія легкихъ, легочной плевры и суставовъ, когда надо замедлить дѣятельность сердца; собакамъ дается отъ хроническаго порока сердца. Какъ и у человека, употребленіе наперстнянки у животныхъ должно быть строго наблюдаемо ветеринаромъ. Большихъ приемовъ наперстнянки слѣдуетъ вообще избѣгать. Лошадямъ и рогатому скоту даютъ отъ 8-ми гранъ до 1 драхмы (0,5—2,0 грм.), овцамъ, свиньямъ и собакамъ отъ 1 до 8-ми гранъ (0,1—0,5 грм.) въ о варѣ, пилюляхъ или кашкахъ, въ соединеніи съ другими мочегонными веществами или со слабительными, напр., съ глауберовой солью, каломелемъ, нашатыремъ, рвотнымъ корнемъ и такъ далѣе. Если у животныхъ одновременно замѣчается разстройство кишечника, наперстнянку

даютъ въ слизистомъ отварѣ или съ отваромъ горечавки. Водный настой наперстянки и для животныхъ предпочитается чистому порошку. Для приготовления воднаго раствора для лошади берутъ отъ 6-ти до 8-ми гранъ (0.4—0.5 грам.) травы, которую завариваютъ, процеживаютъ и даютъ лошади за одинъ приемъ, повторяя его раза два, три въ день.

Ветеринары-гомеопаты даютъ животнымъ наперстянку также при порокахъ сердца, при ускоренномъ слабомъ и неровномъ пульсѣ, ускоренномъ и короткомъ дыханіи, при гриппѣ, при воспаленияхъ околосердечной сумки, при слабой, начинающейся походкѣ, при долго длящихся бронхіальныхъ катаррахъ, при начинающейся чахоткѣ легкихъ, при первой астмѣ у лошадей, при хроническомъ воспаленіи мозговыхъ оболочекъ и начинающемся бѣшенствѣ. Даютъ 3—6-го настояку разведенія.

Наперстчатая т; аза, см. Наперстянка крупноцвѣтная (*Digitalis grandiflora* Lam.).

Наперстчатая трава, см. Наперстянка пурпуровая (*Digitalis purpurea* L.).

Наперстянка, см. Наперстянка крупноцвѣтная (*Digitalis grandiflora* Lam.).

Напоръ коровій, см. Купальница европейская (*Trollius europaeus* L.).

Нардъ (*Nardostachys Jatamansi*, sin. *Valeriana Spica* Vahl.). Корень въ фармацевтич. наз.: *Radix Nardi vera* s. *Nardus indica*, *Spica Nardi*, *Nardus Gangitis*. Нардъ, Нардъ благовонный, восточный, настоящий, Спиканардъ, Валеріана индѣйская, Нардъ индѣйскій. Благовонное растеніе, произрастающее въ Индіи около Ганга. У древнихъ оно было извѣстно, и корень его особенно цѣнился, какъ благовонное и какъ лекарственное средство, отъ истерики и коликъ.

Настоечная трава, см. Горечавка крупная (*Gentiana Pneumonanthe* L.).

Нарциссень, см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).

Нарциссъ бѣлый (*Narcissus poeticus* L.). Нарциссъ садовый, Нарцица бѣлая. Многолѣтнее луковичное травянистое душистое растеніе изъ семейства «амариллисовыхъ» (*Amaryllidaceae* Dc.), произрастающее въ южной Европѣ, съ прикорневыми, линейными, тупыми, сизо-зелеными, въ числѣ 2—3, листьями почти одинаковой длины со стеблемъ. Двугранная, безлистная, внутри полая, выш. 7—11 вершк., стрѣлка несетъ одиночный снѣжно-бѣлый душистый цвѣтокъ. Лепестковидный околоцвѣтникъ его состоитъ изъ 6 листочковъ и снабженъ колокольчатою желтой, съ ярко-краснымъ городчатымъ краемъ, коронкой. Тычинокъ 6; завязь 3-хлѣбная, съ 1 столбкомъ. Плодь—кор. обочка, раскрывающаяся гнѣздоразрывно. Цвѣтетъ весною. Разводится въ садахъ.

Нарциссъ желтый (*Narcissus Pseudonarcissus* L.). Фармацевтическое наз.: *Pseudonarcissus* s. *Narcissus major*, s. *Bulbocodium* (Rad. et Flores.). Многолѣтнее травянистое луковичное расте-

не изъ семейства «амариллисовыхъ» (*Amaryllidaceae* R. Br.), распространенное въ южной Европѣ и Закавказьѣ, съ прикорневыми линейными сизо-зелеными, въ числѣ 2—3, листьями. Двугранная цвѣточная безлистная стрѣлка, вып. $3\frac{1}{2}$ —7 вершк., несетъ одиночный желтый цвѣтокъ. Околоцвѣтникъ 6-раздѣльный, снабженъ колокольчатою, на краю надрѣзанною, коронкою (придаточный вѣнчикъ). Тычинокъ 6; завязь нижняя, 3-хлѣбзидная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—гнѣздоразрывная коробочка. Цвѣтетъ весною. Разводится въ садахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Употребленіе этого растенія въ медицинѣ крайне ничтожно. Въ народѣ употребляютъ настойку изъ корня растенія отъ запоровъ и скопленія слизи въ желудкѣ и кишкахъ. Для настойки берутъ 2 драхмы корня на фунтъ жидкости.

Нарциссъ садовый } см. Нарциссъ бѣлый (*Narcissus poeti-*
Нарцица бѣлая } *cus* L.).

Нарывная трава, см. Рѣдка дикая (*Raphanus Raphanistrum* L.).

Нарывъ, см. Лютикъ ядовитый (*Ranunculus sceleratus* L.).

Нарыжная, см. Желтоцвѣтъ пахучій (*Barbarea vulgaris* R. Br.).

Нарыжная, см. Желтушникъ левкойный (*Erysimum cheiranthoides* L.).

Нарышникъ, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).

Нарѣзная трава, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gärtn.).

Насонъ, см. Макъ самосѣйка (*Papaver Rhoeas* L.).

Настовица, см. Вѣтренна тѣнистая (*Anemone nemorosa* L.).

Настояшникъ, см. Синякъ красный (*Echium rubrum* L.).

Настурція, см. Крессъ водяной (*Nasturtium officinale* Rech.).

Настурція (*Tropaeolum majus* L.). Фармацевтическое назв.:

Nasturtium indicum s. *Cardamin majus* (Herba et Flores.). Вороти-солнце, Зузулька (Даль), Капунитъ (въ садов.), Капунцыны (Малор.), Кастулки (Бѣлов. Пуща), Красоля, Красульки (Малор.), Парасоля панова, Красавица, Красотка, Красноха (Даль), Крессъ индѣйскій, Крессъ цвѣтной, Кресса (Ниж.), Рѣзуха индѣйская, Салатъ цвѣтной. Однолѣтнее совершенно голое травянистое растеніе изъ семейства «настурціевыхъ» (*Tropaeoleae* Juss.), родомъ изъ Перу. Стебель вѣтвистый, немного вьющійся; листья спиральные, съ длинными черешками, щитовидные; цвѣты оранжевые, съ кровяно-красными полосками; чашечка окрашенная, увядающая, 5-раздѣльная, снабженная шпорой при основаніи; лепестковъ 5, прикрѣпленныхъ къ основанію чашечки, изъ нихъ 2 верхніе крупнѣе, передніе три—при основаніи бахромчатые; тычинокъ 8, свободныхъ; столбикъ одинъ, нитевидный, на верхушкѣ 3-храздѣльный; завязь 3-хлопастная, 3-хлѣбзидная, съ однимъ яичкомъ въ каждомъ гнѣздѣ. Плодъ—распадающійся на 3 односѣмянныхъ участка, имѣющихъ нѣсколько мясистый морщинистый околоплодникъ. Разводится въ садахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Листья и цветы настурции обладают противоцинготными свойствами, въ народѣ они также употребляются отъ каменной болѣзни. Отваръ, подслащенный медомъ, служить хорошимъ полосканіемъ отъ молочницы.

Свѣжую молодую траву и цвѣты примѣниваютъ въ салатъ, который даютъ цынготнымъ больнымъ ежедневно. Также хвалятся отъ цинги свѣже-выжатый сокъ изъ всего растенія, смѣшанный съ сокомъ шавеля, вахты и одуванчика: сокъ принимаютъ вмѣстѣ съ молочной сывороткою отъ 2-хъ до 6-ти столовыхъ ложекъ ежедневно.

Почка настурции и нераспустившіеся цвѣты заготавливаются на зиму съ уксусомъ и солью. По вкусу они похожи на каперсы.

Насѣдникъ, см. Хвойникъ обыкновенный (*Ephedra vulgaris* Rich.).

Насѣнье, см. Подсолнечникъ однолѣтній или обыкновенный (*Helianthus annuus* L.).

Натыльникъ, см. Пасленъ сладко-горькій (*Solanum dulcamara* L.).

Натягъ, см. Вороній глазъ (*Paris quadrifolia* L.).

Натягъ, см. Мыльнянка лекарственная (*Saponaria officinalis* L.).

Натягачъ, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).

Натягачъ, см. Насеретиянка крупноцвѣтная (*Digitalis grandiflora* Lam.).

Натягачъ, см. Вороній глазъ (*Paris quadrifolia* L.).

Натягачъ, см. Лютикъ золотистый (*Ranunculus Lingua* L.).

Натягачъ, см. Горошекъ мышиный (*Vicia cracca* L.).

Натягачъ луговой, см. Смолевка почечковатая (*Silene noctiflora* L.).

Натягачи, см. Мыльнянка лекарственная (*Saponaria officinalis* L.).

Натяжъ, см. Лютикъ золотистый (*Ranunculus Lingua* L.).

Наугодки, см. Петрушка (*Calendula officinalis* L.).

Нафалія, см. Копачья лапка (*Antennaria dioica* Gärtn.).

Нашатырка, см. Девясилъ шершавый (*Inula hirta* L.).

Нашатырное дерево, см. Аммоніаковое дерево (*Rhus Metopium* L.).

Нашетинецъ, см. Сиякъ красный (*Echium rubrum* L.).

Невейка, см. Трясунка средняя (*Briza media* L.).

Невстаниха, см. Кукушкины слезки (*Orchis maculata* L.).

Негла, см. Лственница европейская (*Larix europaea* L.).

Негніючка, см. Тиссъ обыкновенный (*Taxus baccata* L.).

Негніючка, см. Жизненное дерево (*Thuja occidentalis* L.).

Негніющее дерево | см. Тиссъ обыкновенный (*Taxus baccata* L.).

Негодная трава, см. Ширей (*Amaranthus Blitum* L.).

Негритянка, см. Дурра (*Sorghum vulgare* Pers.).

Недозрѣль } см. Ястребинка волосистая (*Hieracium Pilosella* L.).
Недозрѣлка }
Недозрѣлокъ }

Недомоцѣтушая, см. Зимовникъ осенній (*Colchicum autumnale* L.).

Недоспѣлокъ, см. Ястребинка волосистая (*Hieracium Pilosella* L.).

Недотрога, см. Недотрога желтая (*Impatiens noli me tangere* L.).

Недотрога желтая (*Impatiens noli me tangere* L.). Фармацевтическое назв.: *Impatiens s. Balsamina lutea* (Herba). Бальсамина и искаж. Бельсамина, Бельсамина луговая (Минск.), Глушокъ, Глушецъ (Курск.), Коровникъ, Коровошникъ (Ниж.), Недотрога, Недотыка, Не замай меня. Не тронь меня, Не рунѣ мене (Малор.), Прыгунъ (Вол., Вят., Сиб. и др.), Прыговка (Мог.), Плътникъ (Орл.), Разрыкъ трава (Великор.), Розривъ (Малор.), Розопасъ (Вятск.), Черевички Божіи Матери (Малор.). Однолѣтняя трава изъ семейства «бальзамниковыхъ» (*Balsaminaceae* A. Rich.), распространенная почти во всей Европѣ и въ большей части Россіи; выш. 7—14 вершк. Стебель сочный, при сочлененіяхъ утолщенный; листья продолговато-яйцевидные, крупно-зубчатые; повислые лимонно-желтые цвѣты въ 3—5 цвѣтковыхъ кистяхъ, согнутыхъ подъ листьями. Цвѣты неправильные съ чашелистиками и лепестками, рано опадающими; изъ чашелистиковъ одинъ, находящійся вслѣдствіе скручиванія цвѣтоножки на нижней сторонѣ цвѣтка, болѣе крупный и снабженъ шиорцемъ, загнутымъ на верхушкѣ крючкомъ; два супротивные ему чашелистника обыкновенно не развиты. Изъ лепестковъ 2, находящіяся со стороны противоположной крупному чашелистику, крупнѣе прочихъ, сросшихся попарно; тычинокъ 5, сросшихся между собою верхними концами нитей, открывающихся при основаніи и выносимыхъ на верхушкѣ молодого плода. Рыльце сидячее; завязь 5-гнѣздная, съ осевымъ стмыносцемъ. Плодъ—линейно-продолговатая коробочка, при созрѣваніи мгновенно раскрывающаяся створками, которыя эластично закручиваются, разбрасывая при этомъ стмена во все стороны. Цвѣтетъ съ іюня до сентября. Растетъ на влажныхъ, тѣнистыхъ мѣстахъ. Цвѣты и листья недотроги красятъ въ желтый цвѣтъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ. Растеніе это прежде употреблялось въ медицинѣ съотъ водянки, при камняхъ въ почкахъ и мочевомъ пузырьѣ, а наружи на раны и геморроидальныя шишки. Теперь врачи его совсѣмъ не назначаютъ. Растеніе ядовитое, ни одно животное не трогаетъ его. Въ народной медицинѣ оно еще употребляется. Въ Орловской губ. его прикладываютъ при вывихѣ ввидѣ припарки, изъ него дѣлаютъ ванны отъ ломоты въ ногахъ, отваромъ также обмываютъ раны (въ Воронежской губ.). Отваръ, принятый внутрь, вызываетъ рвоту.

Недотыка, см. Недотрога желтая (*Impatiens noli me tangere* L.).

Недужная трава, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Недужная трава, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).

Недужная трава, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).

Неежа, см. Василистникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).

Незабудка, см. Дубровка (*Veronica Chamaedrys* L.).

Незабудка, см. Румянка лекарственная (*Anchusa officinalis* L.).

Незабудка, см. Незабудка болотная (*Myosotis palustris* With.).

Незабудка болотная (*Myosotis palustris* With.). Фармацевтическое название: *Auricula muris* (Herba). Волосовая горлянка (Вят.), Духовка, Измодень полевой, Катимъ (Костр.), Тихорадочная трава, Мышье ухо, Незабудка, Незабудка настоящая, Незабудины (Могил.), Жаби очки (Гродн.), Павани вички (Подол.), Пацерачка (Гродн.), Порѣчная (Олон.), Пригожница (Тв., Ост., Пул.), Полевая розета (Минск.), Собачки. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «бурачниковыхъ» (*Boraginaceae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и весьма обыкновенное въ Россіи, съ ползучими подземными побѣгами, покрытое прижатыми волосками. Стебель выш. $3\frac{1}{2}$ —7 вершковъ, узловатый, приподнимающійся, при основаніи ползучій. Листья ланцетные, заостренные, нижніе—при основаніи суженные, верхніе—островатые. Цвѣты большіе, въ длинныхъ завиткахъ. Чашечка колокольчатая болѣе, или менѣе глубоко 5-лопастная, усажженная прямыми прижатыми лепестками, при плодахъ раскрытая; вѣнчикъ голубой колесовидный, съ 5 желтыми тупыми чешуйками въ зѣвѣ; тычинокъ 5; завязь верхняя, 4-хлѣздная, 4-лопастная; столбикъ съ 2-раздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ сухой, распадающійся при созрѣваніи на 4 треугольно-яйцевидныхъ гладкихъ блестящихъ орѣшка. Цвѣтетъ съ мая до сентября. Произрастаетъ по капавамъ, болотамъ, берегамъ рѣкъ и сырымъ лугамъ. Въ медицинѣ совсѣмъ не употребляется. (Таб. XXXI, фиг. 185.)

Незабудка дикая, см. Дубровка (*Veronica Chamaedrys* L.).

Незабудка лѣсная (*Myosotis silvatica* Hoffm.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «бурачниковыхъ» (*Boraginaceae* Juss.), распространенное въ средней Европѣ, въ средней Россіи, въ Малороссіи, на Кавказѣ и въ Сибири, выш. $3\frac{1}{2}$ —7 вершковъ, покрытое оттопыренными волосками. Стебель прямой, простой или наверху вѣтвистый. Прикорневые листья ложковидные, собраны розеткой, верхніе—продолговато-ланцетные. Цвѣты мелкіе, сперва красные, потомъ голубые, рѣдко бѣлые. Чашечка 5-раздѣльная, при плодахъ полуоткрытая, съ прямостоящими зубцами, усажженная крючковатыми волосками. Вѣнчикъ колесовидный, снѣжнолепестный, съ 5-раздѣльнымъ плоскимъ отгибомъ. Тычинокъ 5; завязь верхняя, 4-лопастная; столбикъ съ 2-раздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ сухой, распадающійся при созрѣваніи на 4 треугольно-яйцевидныхъ гладкихъ блестящихъ орѣшка. Цвѣтетъ въ маѣ и въ іюнь. Растетъ на лугахъ, между кустарниками и въ рощахъ. (Рис. 194.)

Незабудка средняя (*Myosotis intermedia* Link.). Фармацевтическое название: *Auricula muris* (Herba.). Кожушка (Вор.), Лн-

пучка (Вор.), Лозиница (Могил.), Литтеръ (Орл.), Синявки (Черн.), Цинговая (Олон.). Шершаво-мохнатое отъ оттопыренныхъ волосковъ двулѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «бурачниковыхъ» (*Boraginaceae* Juss.), весьма обыкновенное въ Европѣ и въ Россіи. Стебель вышиною $5\frac{1}{2}$ —7 вершк., прямой, вѣтвистый; листья ланцетные, заостренные, сѣро-зеленые. Цвѣтоножки вдвое длиннѣе чашечки. Цвѣты мелкіе голубые, въ завиткахъ. Чашечка 5-раздѣльная, при плодахъ замкнута сходящимися зубцами и при основаніи усажена оттопыренными крючковатыми волосками. Вѣнчикъ колесовидный, съ вогнутымъ 5-раздѣльнымъ отгибомъ. Тычинокъ 5; завязь верхняя, 4-хлѣздная, 4-хлопастная; столбикъ съ 2-раздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ сухой, распадающійся при созрѣваніи на 4 треугольно-яйцевидныхъ гладкихъ блестящихъ орѣшка. Цвѣтетъ въ маѣ и въ іюнѣ. Растетъ на поляхъ, между кустарниками и въ лѣсахъ. (Табл. XXXI, фиг. 174.)

Не замай меня, см. Недотрога желтая (*Impatiens noli me tangere* L.).

Незамайникъ, см. Жасминъ полевой (*Lycium Barbarum* L.).

Незелень, см. Заразиха красноватая (*Orobanche rubens* L.).

Некерко, см. Травянка лекарственная (*Dianthus deltoides* L.).

Некленъ, см. Кленъ полевой или пакленъ (*Acer campestre* L.).

Нелинь, см. Дубъ лѣтній (*Quercus pedunculata* Ehrh.).

Нелумбіумъ, см. Бадма (*Nelumbium caspicum* Fisch.).

Нелынь, см. Дубъ лѣтній (*Quercus pedunculata* Ehrh.).

Немиця, см. Бѣлена черная (*Hyosciamus niger* L.).

Немочная, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).

Ненадычка, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Ненасытець, см. Астрagalъ солодколистный (*Astragalus glycyphyllos* L.).

Неродимецъ, см. Дымянка лекарственная (*Fumaria officinalis* L.).

Неродица, см. Воронецъ колосистый (*Actaea spicata* L.).

Не рушъ мене, см. Недотрога желтая (*Impatiens noli me tangere* L.).

Неслея метельчатая (*Neslea paniculata* Desv.). Круглецъ (Уф.), Нивянка (Горл.), Рѣзуха, Рѣзь, Рѣжица, Рѣжуха коровья. Однолѣтнее травянистое, выш. 7—14 вершк., растеніе изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Листья ланцетовидные, нижние — суженные въ черешокъ, верхніе — сидячіе при основаніи, стрѣловидные. Цвѣты золотисто-желтые. Чашечка 4-листная. Лепестковъ 4, на-крестъ расположенныхъ. Тычинокъ 6. Плодъ — орѣхообразные маленькіе шаровидные однохлѣздные односѣмянные пераскрывающіеся стручочки. Цвѣтетъ въ маѣ и въ іюнѣ. Растетъ на поляхъ.

Нетипырь, см. Молочай высокій (*Euphorbia procera* M. B.).

Нетрепа, см. Дурнишникъ колючій (*Xanthium spinosum* L.).

Не тронь меня, см. Недотрога желтая (*Impatiens noli me tangere* L.).

3258

1922



Рис. 66. Дубровникъ
чеснотный.



Рис. 67. Душеникъ
остролистный



Рис. 68. Дягиль лѣсной.



Рис. 69. Дѣбныкъ.



Рис. 70. Ерникъ обыкновенный.



Рис. 71. Жабникъ пашенный



Рис. 72. Желтолозникъ.



Рис. 73. Желтуха.



Рис. 74. Жеруха лісна.



Рис. 75. Живучка пірамідалісна.



Рис. 76. Жидовник німецький.



Рис 77. Жимолость вьющаяся.



Рис. 78. Жимолость
обыкновенная.



Рис. 79 Жирянка
обыкновенная.



Рис. 80. Жминда лозная.



Рис. 81. Занихеллия
болотная.



Рис. 82. Звѣздчатка лѣсная



Рис. 83. Звѣробой горный.



Рис. 84. Земляные орѣшки.




Рис. 85. Зольникъ калинный.



Рис. 86. Зостера морская.



Рис. 87. Зюзникъ европейскій.



Рис. 88. Ива бѣлая.



Рис. 89. Ива миндальная.



Рис 90 Ива ползучая.



Рис. 91. Ива белая.



Рис. 92. Ива ушастая.



Рис. 93. Ирга обыкновенная.



Рис. 94. Камышъ болотный.



Рис 95. Камышъ лѣсной



Рис. 96. Канарейникъ
тростниковій.



Рис. 97. Канарейное сѣмг.



Рис. 98. Капуста
брюссельская.



Рис. 99. Кардобенедиктъ



Рис. 100. Капуста
савойская.



Рис. 101. Касатикъ
низкій.



**Рис. 102. Капуста
кочанная.**



**Рис. 103. Катранъ
морской.**



**Рис. 104. Капуста
цветная.**



Рис. 105. Кедръ сибирскій.



Рис. 106. Кервель гребневидный.



Рис. 107. Кермекъ
лимонный.



Рис. 108. Кизильникъ
обыкновенный.



Рис. 109. Кипрей
волосистый.



Рис. 110. Кипрей горный.



Рис. 111. Кислица рогатая.



Рис. 112. Кишнецъ огородный.



Рис. 113. Клеверъ бѣлый ползучий.



Рис. 114. Клеверъ средний



Рис. 115. Кленъ полевой
(пакленъ).



Рис. 116. Ключевикъ.



Рис. 117. Кнафликъ.



Рис. 118. Ковыль волосистый.



Рис. 119. Кокушникъ.



Рис. 120. Колокольчикъ крапиволистный.



Рис. 121. Кольникъ колосистый.



Рис. 122. Кольраби



Рис. 123. Колосникъ
обыкновенный.



Рис. 124. Конопля посѣвная.



Рис. 125. Коровякъ
бѣлоцвѣтный.



Рис. 126. Коровякъ
черный.



Рис. 127. Костенецъ
зонтичный.



Рис 128. Костерь безплодный.



Рис. 129. Костерь шеро-
ховатый.



Рис. 130. Котовикъ кошачій.



Рис. 131. Крапива водяная.



Рис. 132. Крапива жгучая,
или мелкая.



Рис. 133. Крапива двудомная,
или большая.



Рис. 134. Кресъ нълевой.




Рис. 135. Крестовникъ лѣсной.



Рис. 136. Кровохлебка лекарственная.



Рис. 137. Крушина слабительная.



Рис. 138. Куколь



Рис. 139. Кульбаба осенняя.



Рис. 140. Куманика.



Рис. 141. Купена лекар-
ственная.



Рис. 142. Купыр' лѣсной.



Рис. 143. Куропаточная трава



Рис. 144. Ладьянъ
обыкновенный.



Рис. 145. Лавровое дерево.



Рис 146. Лакричникъ
обыкновенный.



Рис. 147. Лапчатка ползучая.



Рис. 148. Лапчатка
серебристая.



Рис. 149. Лапчатка—узикъ.



Рис 150. Латукъ дикій.



Рис. 151. Латукъ стѣнной.



Рис. 152. Лебеда садовая.




Рис. 153. Ленъ слабительный.



Рис. 154. Ленець ленолистий



Рис. 155. Лилія водяная.



Рис. 156. Линнея сѣверная.



Рис. 157. Литучка ренейчатая.



Рис. 158. Лиственница европейская.



Рис. 159. Лобелия водяная.



Рис. 160. Лоза (ива корзиночная).



Рис 161. Луговикъ дернистый.



Рис. 162. Лукъ
огородный.



Рис. 163. Лучевка
обыкновенная.



Рис. 165. Лютикъ
водяной.



Рис. 164. Лянка малая.



Рис. 166. Лютикъ клубне-
носный.



Рис. 167. Люцерна
серповидная



Рис. 168. Люцерна
хмелевидная.



Рис. 169. Майникъ
двулистный.



Рис. 170. Макъ сно-
творный.



Рис. 171. Манникъ обыкновенный.



Рис. 172. Марь вонючая



Рис. 173 Марь городская.



Рис. 174. Марь многосѣмянная.



Рис. 175. Марь обыкновенная.



Рис 176. Марь стѣнная.



Рис. 177. Марьянникъ
гребенчатый.



Рис. 178. Медовникъ.



Рис. 179. Метлица полевая.



Рис. 180. Млечникъ морской.




Рис 181. Можжевельникъ
обыкновенный



Рис. 182. Многоножка
тройчатая.




Рис. 183. Можжевельникъ
казацкій.



Рис. 184. Мокрица.



Рис. 185. Молочайникъ
круглолистный.



Рис. 186. Молочайникъ
малый.



Рис. 187. Морчovníкъ луговой.



Рис. 188. Морозникъ зеленый.



Рис. 189. Мята лѣсная.



Рис. 190. Мята полевая.



Рис. 191. Мятликъ
луговой.



Рис. 192. Мятликъ
однолѣтній.



Рис. 193. Низмянка
маленькая.



Рис. 194. Незабудка
лѣсная.



Фигуры: 92) Кадило пахучее. 93 и 94) Калина обыкновенная. 95) Камнеломка супротиволистная 96) Камышь озерный. 97) Каприфоль (жимолость душистая).



Фигуры: 98) Каштанъ настоящій. 99) Картофель. 100) Каштанъ конскій. 101) Капуста огородная. 102) Касатикъ водяной.



Фигуры: 103) Кервель. 104) Клеверъ краснѣющій. 105 и 106) Кизиль настоящій. 107) Кирказонъ. 108) Кладонія красноголовая (боровыя трубки). 109) Кислица обыкновенная.



Фигуры: 110) Клеверъ луговой, или посѣвной. 111) Кленъ остролистный. 112) Клеячка перистая. 113 и 114) Клюква. 115) Ковлобородникъ луговой.



Рисунки: 116) Кококольчикъ боровой. 117) Колчакъ желтый. 118) Короставникъ. 119) Колокольчикъ сборный. 120) Колючникъ безстебельный.



121



122



123



124

Фигуры: 121) Кочедыжникъ обыкновенный. 122) Копытень европейскій
123) Крапива глухая. 124) Конопля.



Фигуры: 125) Крушина ломкая. 126) Кранъ (марена). 127—129) Красикъ.
 130) Кровохлебка маленькая. 131 и 132) Крыжовникъ.



Фигуры: 133) Кукуруза. 134) Кувшинка желтая. 135) Ландышъ. 136) Латук ядовитый.

с 221-120

1898

а

Залесова, Е. Н.

Полный рус. иллюстр.
словарь - травник...

т. 2 (Ж-Н)

СПб, 1899